



# **Ghid de recuperare a sănătății MMS**

**Jim Humble**

**cu Cari Lloyd**

Ghid de recuperare a sănătății MMS,  
prima ediție de Jim Humble cu Cari  
Lloyd

Drepturi de autor © 2016 de James V. Humble și  
Cari Lloyd

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau prin orice sistem de recuperare a stocării informațiilor fără permisiunea scrisă a autorilor. Singura excepție este făcută de un recenzent care dorește să citeze pasaje scurte în legătură cu o recenzie scrisă pentru includere într-o revistă, ziar, site web, blog sau difuzare. Paginile individuale pot fi copiate cu credit acordat autorilor sau, uneori, mai multe pagini pot fi copiate atunci când este necesar pentru a ajuta pe cineva să-și revină sănătatea. În cazul morții (sau dispariției a mai mult de 2 luni) a oricărui autor enumerat mai sus, drepturile de autor sunt atribuite în totalitate autorului rămas. În cazul morții sau dispariției ambilor autori menționați mai sus, această carte devine domeniu public și oricine o poate copia, vinde sau da. În cazul morții ambilor autori, fiecare persoană care a beneficiat de MMS este încurajată să cumpere, să tipărească, să copieze sau să împartă într-un fel cât mai multe exemplare cu prietenii și familia.

Publicat de

James V. Umil

[sales@jhbooks.org](mailto:sales@jhbooks.org)

ISBN: 978-0-9908945-2-0

Prima ediție pre-lansare:

A doua ediție pre-  
lansare:

Prima ediție:

Lansat iunie 2015  
Lansat octombrie  
2015 Lansat  
octombrie 2016

Emailul de contact: [healthrecovery@jimhumble.is](mailto:healthrecovery@jimhumble.is)

Design de copertă: Rev. Paul Beaudry și Cindy Stoe

De-a lungul acestei cărți veți găsi link-uri către site-uri web externe pe care vi le-am oferit ca o comoditate pentru dvs., cititorului. Deși am depus toate eforturile pentru a ne asigura că aceste link-uri sunt corecte, actualizate și relevante, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru paginile menținute de furnizori externi.

# **Declinare de responsabilitate**

Această carte este plină de protocoale alternative de restaurare a sănătății, care s-au dovedit a funcționa din experiența eforturilor de bază de către mulți oameni din întreaga lume. Fiecare persoană este personal responsabilă de decizia sa dacă folosește sau cum folosește aceste informații sau dacă solicită sau nu asistență medicală recunoscută oficial.

Informațiile conținute în această carte sunt strict cu scop educativ. Nimic din această carte nu este destinat să constituie sfaturi sau tratament medical. Protocoalele descrise aici nu au fost aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA). Aceste protocoale sunt sacramente oficiale ale Bisericii Genesis II of Health and Healing. Dacă doriți să aplicați protocoalele din această carte, vă asumați întreaga responsabilitate pentru acțiunile dvs. Acceptați 100% responsabilitatea pentru orice utilizare făcută a oricărei informații din prezentul document.

Nu pretindem și nici nu credem că aceste protocoale vindecă corpul uman. MMS1, MMS2, argila bentonitică (argilă aztecă), Aloe vera, DMSO și toate celelalte substanțe, naturale sau de altă natură, menționate în această carte nu vindecă sau vindecă în niciun fel corpul. MMS1 și MMS2 sunt oxidanți care distrug otrăvurile și ucid agenții patogeni prin oxidare. MMS2 (acidul hipocloros [HOCl]) este același oxidant pe care îl generează sistemul imunitar uman pentru a distruge agenții patogeni și otrăvurile. Argila bentonitică nu este un agent de vindecare, ci mai degrabă absoarbe otrăvurile și agenții patogeni și îi scoate din corp. O mulțime de dovezi furnizate de FDA, EPA și diverse corporații industriale dovedesc științific că MMS1 (dioxid de clor) ucide sau oxidează agenții patogeni și otrăvurile din alimente, sistemele publice de apă, spitale și chiar abatoare.

Dovezile anecdotice de la mii de oameni din întreaga lume indică faptul că MMS1 (dioxid de clor) și MMS2 (atunci când sunt

dizolvate în apă se transformă în acid hipocloros [HOCl]) au capacitatea de a ucide agenții patogeni și / sau de a oxida otrăvurile în corpul uman. Regulamentele FDA specifică faptul că dioxidul de clor (MMS1) și hipocloritul de calciu (MMS2) pot fi utilizate în sistemele publice de apă pentru purificarea apei, iar dioxidul de clor este utilizat pentru conservarea legumelor, a cărnii și a altor articole. În medie, corpul uman este de 60-75% apă. Este evident că dioxidul de clor poate purifica și apa din corp la fel ca în sistemele publice de apă. Odată ce apa corpului este purificată și multe dintre otrăvurile oxidate, corpul poate vindeca corpul.

Nu susținem că există dovezi medicale că oricare dintre afirmațiile de aici sunt adevărate. Există totuși dovezi pentru cei cărora le pasă să verifice și să observe. Facem aluzie la faptul că avem dovezi anecdotice. Unii oameni instruiți științific încearcă să ne reducă dovezile deoarece sunt anecdotice. Când unul are trei sau patru confirmări anecdotice care pot fi oarecum discutabile, dar când confirmările sunt în mii și mii, atunci acest lucru schimbă cazul. Chiar și știința ne spune că atunci când există mii de cazuri de dovezi anecdotice este probabil să existe o anumită corelație.

A lua sau nu a lua MMS este o decizie personală. Fiecare individ trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria sănătate. Autorul și coautorul acestei cărți nu își pot asuma responsabilitatea pentru efectele sau consecințele negative de detoxifiere rezultate din utilizarea oricăror sugestii sau proceduri descrise în aceste pagini. Vă rugăm să citiți secțiunea „Este sigur să luați MMS?” la pagina 12.

Din nou, niciunul dintre protocoalele din această carte nu poate vindeca o boală sau chiar furniza nutrienți pentru vindecarea corpului uman. Nu pretindem că aceste metode vindecă. Protocoalele prezentate în această carte vor ucide majoritatea agenților patogeni ai bolii și vor oxida diferite otrăvuri din corpul uman. Atunci corpul este capabil să se vindece singur.

This book is dedicated to the  
many suffering people  
of this world.

Jim Humble





## **Mulțumiri**

Ar fi nevoie de pagini pentru a-mi exprima în mod adecvat recunoștința sinceră față de toți cei care au contribuit într-un fel la această carte - indiferent dacă știu sau nu. Nu găsesc cuvintele pentru a exprima suficient de multă apreciere, dar sunt încrezător că fiecare va primi într-un fel sau altul la un moment dat - va primi rambursare. Când faci ceea ce trebuie, întotdeauna îți revine. Cu toate acestea, aici vreau să subliniez câteva persoane care merită mulțumiri speciale.

Mii și mii de oameni care au nevoie de recuperare a sănătății au fost forța motrice pentru mine pentru a documenta această informație. Vreau să le mulțumesc în mod special tuturor celor care au participat la seminarii și care v-au contribuit cu energia și zelul, cunoștințele și experiența voastră și inspirația voastră. Aceeași mulțumire se adresează nenumăraților oameni care au scris din întreaga lume cu întrebări, sugestii, idei și mărturii despre ceea ce ați făcut, care a funcționat - cea mai profundă recunoștință și apreciere a mea se adresează tuturor.

Multe mulțumiri celor care au citit această carte în starea de pre-închiriere și au oferit sugestii. Și foarte mulțumiri deosebite corectorilor principali: DD, Jan Wallace, Daniel

Bender, episcopul Manuel Catedra și Charlotte Lackney. Vă mulțumim pentru toate orele depuse - fiecare dintre voi a adus contribuții importante în modul dvs. unic.

Mulțumesc, arhiepiscop Mark Grenon și fiii, episcopul Jon Grenon și episcopul Joe Grenon, pentru contribuția la procedura de vaccinare pentru depășirea leziunilor cauzate de vaccin. În plus, Mark a dezvoltat și Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO. Vei continua să fii recompensat pentru munca ta extraordinară în această viață și în cea viitoare.

Mulțumesc, Andreas Ludwig Kalcker, pentru că mi-ai împărtășit ideea de a începe cu o dozare foarte mică de MMS, care m-a inspirat să dezvolt Procedura de pornire - o etapă importantă pentru utilizarea MMS.

Clara Beltrones a creat pentru prima dată ceea ce este acum cunoscut sub numele de Protocolul 6 și 6 pentru a-și salva fiica dintr-o operațiune de anexă care poate i-a luat viața. După această experiență, ea a folosit Proto-col 6 și 6 pentru a ajuta sute de oameni. Acum alții din întreaga lume au ajutat mii folosind Protocolul 6 și 6. Mulțumesc, Clara, pentru această contribuție extraordinară.

Un mulțumire deosebită Rev. Paul Beaudry și Cindy Stoe care au creat coperta cărții. Și o mulțumire extra specială lui Cindy Stoe pentru că a prezentat această carte așa cum am dorit-o. Sper că nu am fost prea exigenți cu tine, Cindy. Vă mulțumim că ne-ați purtat.

Vă mulțumim, Daniel Bender și Rev. Paul Beaudry, pentru contribuția la ilustrațiile din această carte.

Este de la sine înțeles, mulțumită lui Matt, pentru tot sprijinul tehnic.

Și în cele din urmă, dar cu siguranță nu în ultimul rând, un mare „zikomo kwambiri” pentru Cari, coautorul meu, care a lucrat ceea ce părea a fi ore nesfârșite, asigurându-mă că ceea ce am vrut să spun este prezentat într-un mod clar și de înțeles, ca să nu mai vorbim gestionând toate reglajele fine și atâtea detalii! Fără Cari această carte nu ar fi. Sunt încrezător că, peste ani, mii de oameni își vor recupera sănătatea - și nu s-ar fi întâmplat fără Cari.

# Cuprins

<b>Mulțumiri.....</b>	<b>VII</b>
<b>Prefață.....</b>	<b>XV</b>
<b>Introducere.....</b>	<b>1</b>
<b>Capitolul 1 - Noțiuni introductive.....</b>	<b>5</b>
Definitia termenilor.....	5
Clarificare.....	8
Măsurători utilizate în această carte.....	10
CDS și CDH.....	12
Este sigur să luați MMS?.....	12
Ce nu este MMS.....	13
Înțelegerea oxidării.....	15
Oxidare.....	15
MMS și oxidare.....	15
Alte procese oxidante.....	16
Un Cuvânt pentru Înțelepți.....	17

## **Capitolul 2 - Măsurile de siguranță.....19**

MMS / MMS1.....19

Hipoclorit de calciu (MMS2).....22

Acid citric / acid clorhidric (HCl).....24

DMSO.....25

## **Capitolul 3 - Elementele esențiale de bază MMS...29**

Activarea MMS.....30

Acid citric și acid clorhidric (HCl).....30

Unii acizi alternativi.....30

Amestecarea unei doze de bază de MMS1.....32

Doze orare.....34

Importanța dozelor consecutive.....35

Sticlă cu doză zilnică.....36

Cum să testați dacă MMS-ul dvs. este bun.....39

Apă - Lichidul ideal pentru amestecarea unei doze  
MMS141.....

Factor de gust / Cum se poate îmbunătăți gustul MMS1  
.....42

MMS1 într-o capsulă (pentru a elimina gustul).....45

Pur și simplu nu mai pot lua o picătură.....47

Stocarea MMS.....	49
Simtindu-se bolnav.....	50
Femeile gravide și MMS.....	50
Mâncare în timp ce pe protocoale MMS.....	51
Suplimentele nutriționale și HRP.....	53
Alimente și băuturi de evitat atunci când utilizați un protocol MMS.....	

#### **Capitolul 4 - DMSO (dimetil sulfoxid).....57**

DMSO - Unde și ce să cumpăr.....	58
DMSO — Test de alergie.....	59
DMSO — Măsurile de siguranță.....	60

#### **Capitolul 5 - Planul de recuperare a sănătății (HRP) ..... 63**

fundal.....	63
Cum funcționează.....	63
Prezentare generală a protocoalelor cheie / planului de recuperare a sănătății.....	64
Principii fundamentale.....	66



Aliniere de protocoale pentru planul de recuperare a sănătății.....	67
Excepție de la regulă.....	70
Protocoale suport - Când să le adăugați.....	71
Un cuvânt despre protocoalele suplimentare.....	72
Două proceduri fundamentale de sănătate pentru HRP .....	73
1. Spălându-vă dinții.....	73
2. Stropirea pielii tale.....	76
<b>Capitolul 6 - Protocoalele cheie.....</b>	<b>79</b>
Procedura de pornire.....	79
Trei reguli de aur ale MMS.....	83
Protocolul 1000.....	84
Protocolul 1000 Plus.....	87
Protocolul 2000.....	89
Protocolul 3000.....	95
Protocolul de mușgai / ciuperci.....	99
O revizuire importantă.....	108
<b>Capitolul 7 - HRP și diverse boli.....</b>	<b>109</b>

Utilizarea HRP împreună cu suportul

Protocoale pentru diferite boli.....109

Boli considerate în general incurabile.....117

## **Capitolul 8 - Verificarea realității.....121**

Motive pentru care este posibil să nu fiți complet

Succes cu MMS.....121

## **Capitolul 9 - Protocoale de sprijin.....131**

Protocolul de tuse.....131

Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO.....135

Protocoale pentru ochi, urechi și nas.....136

Protocol de baie și baie de picioare.....142

Protocol de clismă.....148

Colonici.....152

Protocolul Douche.....153

Protocol MMS Bag.....156

Protocolul pulmonar (Cupa).....159

## **Capitolul 10 - Planta indiană - Sănătatea supremă**

### **Efort de recuperare.....165**

Black Salve.....167

## **Capitolul 11 - Protocoale suplimentare.....169**

Protocolul 6 și 6.....	169
Protocolul 4000.....	171
Procedura de vaccinare.....	173
Protocolul asupra malariei.....	180
Acțiuni suplimentare / doză de bază a malariei.....	182
Ajutarea maselor să se refacă după malarie.....	185
Microscop.....	185
Mai slab decât tulpinile normale de malarie.....	187
Mai puternică decât tulpinile normale de malarie...	188
Copii (și malarie).....	189
Chikungunya și febra Dengue.....	190
Virusul Ebola.....	195
Virusul Zika.....	195
Mușcăături de țânțar.....	196
Protocolul MRSA.....	196
Doza zilnică de întreținere MMS1.....	200
<b>Capitolul 12 - Protocoale de urgență.....</b>	<b>203</b>
Înțepături și mușcăături.....	204

Scorpion Stings.....	204
Înțepături de albină și viespe.....	206
Mușcături de păianjen.....	210
Protocolul Brown Recluse.....	213
Protocolul văduvei negre.....	217
Protocolul de mușcătură de șarpe.....	219
Protocolul de otrăvire a alimentelor.....	223
Protocolul de comotie cerebrală.....	226
Protocolul accident vascular cerebral.....	227
Protocolul de atac de cord.....	236
Protocol de ardere.....	245
Protocolul One Week to Live.....	249
<b>Capitolul 13 - Reglarea dozelor pentru copii.....</b>	<b>255</b>
Un cuvânt pentru părinți.....	255
Procedura de pornire pentru copii.....	256
Protocolul 1000 pentru copii.....	257

Protocol 1000 Plus pentru copii.....	258
Protocolul 2000 pentru copii.....	258
Protocol 3000 pentru copii.....	260
Protocolul 6 și 6 pentru copii.....	264
Patch Protocol pentru bebeluși, copii și persoane cu	
Piele sensibilă.....	265
Doza zilnică de întreținere MMS1 pentru copii.....	266
Cum se ajustează protocoalele de sprijin și suplimentare	
pentru copii.....	266

## **Capitolul 14 - Informații importante suplimentare 273.....**

Biofilme.....	273
MMS2 — Detalii.....	274
Testarea dacă lichidele sunt compatibile cu MMS1...	278
Analgezic.....	282
Paraziți.....	283
Purificarea apei cu MMS.....	287

## **Capitolul 15 - Animale.....289**

Protocol pentru animale.....289

Dozarea orală a MMS pentru un animal.....290

General Malaise / Boală.....	291
Dacă animalul a fost diagnosticat.....	292
Calculul dozelor / Explicația măsurătorilor.....	293
Protocol pentru legenda animalelor.....	294
Explicație despre modul de utilizare a diagramelor de dozare.....	294
Diagramele de dozare a protocolului animal.....	300
Bând apă.....	302
Protocolul 3000.....	303
Ochi.....	303
Gură și dinți.....	303
Probleme de piele.....	304
Protocole suplimentare și de sprijin.....	304
Trei reguli de aur pentru animale.....	305
<b>In concluzie.....</b>	<b>306</b>
<b>Anexa A - CDS / CDH.....</b>	<b>307</b>



<b>Anexa B - Biserica Geneza II.....</b>	<b>313</b>
<b>Anexa C - Dieta acid-alcalină.....</b>	<b>315</b>
<b>Link-uri de interes.....</b>	<b>319</b>
<b>Despre autor.....</b>	<b>325</b>



## **Prefață**

De la descoperirea soluției Master Mineral, conștientizarea MMS a continuat să crească în întreaga lume. Există un motiv foarte simplu pentru aceasta: sănătatea este un atu foarte prețios. Tot mai mulți oameni au descoperit că MMS poate fi soluția la o problemă de sănătate atunci când nimic altceva nu a funcționat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că persoanele care au avut rezultate pozitive cu MMS își împărtășesc povestea cu prietenii, familia și chiar în mod public. Deci, cuvântul se învâрте.

Din păcate, există multe dezinformări care plutesc în jurul MMS. O mare parte din această dezinformare provine din povești mediatice false care atacă intenționat MMS și alte metode alternative.

Cu toate acestea, o parte din dezinformare provine și de la oameni bine intenționați. Acest lucru se datorează multor motive. Unii oameni zeloși au răspândit vestea, dar nu au reușit să se țină la curent cu noile evoluții; prin urmare, ele transmit informații învechite. Alte posibile autorități și / sau proprietari de site-uri web, din mai multe motive, pur și simplu greșesc. Oricare ar fi cazul, există suficientă confuzie și dezinformare în jurul MMS, iar acesta a fost un factor major care m-a obligat să scriu această carte.

Am scris acest ghid pentru a vă ajuta să învățați fundamentele Master Solution Mineral (MMS) într-un mod clar și concis. Din experiența mea, știu că

majoritatea oamenilor pot recupera de la majoritatea oricărei boală care există. Nu trebuie să cunoașteți fiecare detaliu despre modul în care funcționează MMS. Trebuie doar să știți cum să utilizați MMS.

Această carte, de exemplu, nu vă va învăța cum să vă creați propriul MMS. Seamănă puțin cu electricitatea. Nu trebuie să cunoaștem toată știința din spatele modului în care funcționează electricitatea pentru a beneficia de aceasta. Tot ce trebuie să știți este cum să răsuciți un comutator și voila - lumina se aprinde. Scopul meu este să fac cât mai simplu posibil pentru orice nou-venit la MMS să își asume responsabilitatea pentru propria sa recuperare a sănătății - să se vindece și să rămână bine.

Este foarte important să înțelegem un principiu de bază aici și anume: simplul nu este sinonim cu că nu există nici o muncă implicată. Vreau să fiu foarte clar, dacă doriți recuperarea sănătății, va fi nevoie de un efort din partea dvs. Vă va cere să vă asumați responsabilitatea pentru propria sănătate și bunăstare.

Luati în considerare faptul că, dacă aveți o stare de sănătate precară, probabil că v-a trebuit puțin timp, poate ani, pentru a ajunge acolo. Așadar, vă puteți aștepta să dureze ceva timp și, cu siguranță, să lucreze, pentru a reveni la o sănătate bună. Uneori spun că MMS poate fi ca un glonț magic, dar trebuie să faceți pașii necesari pentru a pune glonțul în mișcare. Dacă alegeți așa calea sănătății, o marfă foarte prețioasă, vă pot garanta că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-l face să nu fie lipsit de muncă, ci cât de simplu poate fi. Dacă veți urma Planul de recuperare a sănătății, așa cum este prezentat în aceste pagini, puteți începe să urmați instrucțiunile din această carte astăzi și, probabil, să începeți să vedeți rezultate pozitive imediat ce mâine.

În plus, vreau să subliniez faptul că, deși așa cum sugerează titlul acestei cărți, acest ghid abordează recuperarea sănătății, în sine, este, de asemenea, foarte important despre prevenire și, prin urmare, longevitate. Iată câteva elemente de gândire: în lumea de astăzi suntem bombardați cu toxine zilnic - există

aproape că nu i-a scăpat. Am descoperit de-a lungul anilor că mulți oameni cred că fac „OK” în departamentul de sănătate. Nu au nicio boală majoră și nici o stare de sănătate specială care să fie îngrijorată de faptul că sunt conștienți. Cu toate acestea, odată ce includ MMS în rutina lor de zi cu zi, descoperă adesea o lume cu totul nouă a bunăstării! Ei descoperă că încep să-și scape greutatea nedorită, iar gândirea lor se dovedește a fi - ceața creierului, gândirea neclară și concentrarea slabă ies pe ușă. Au mai multă energie, pielea lor devine mai fină și capătă o strălucire nouă specială. Pe scurt, o varietate de mici probleme dureroase cu care au învățat să trăiască ani de zile dispar. Deși făceau „OK” din punct de vedere al sănătății, acum se descurcă cu atât mai bine! Deci, vedeți, MMS oferă mult mai mult decât s-ar putea crede.

Dacă aveți o problemă gravă de sănătate de un fel sau altul de care trebuie să vă recuperați - această carte este pentru dvs. La fel, dacă sănătatea dumneavoastră pare să fie „OK”, dar doriți să obțineți totuși o sănătate optimă, această carte este și pentru dvs. Indiferent de categoria în care vă încadrați - o rutină de bază continuă cu MMS vă poate ajuta să vă sănătos, să vă mențineți sănătoși și să vă ajutați să mențineți o bună calitate a vieții în anii de aur.

Pentru aceia dintre voi care au deja o anumită înțelegere a MMS, este posibil să observați că există unele variante ale celor publicate deja în celelalte cărți ale mele sau postate pe site-urile mele web. Acest volum conține cele mai recente informații actualizate, precum și o serie de informații complet noi. Include îmbunătățiri recente pe care eu și alții le-am determinat prin utilizarea continuă a MMS în întreaga lume. Lumea MMS este vastă și învățăm tot

timpul lucruri noi, așa că asigurați-vă că verificați periodic actualizări la:

<http://www.mmswiki.is>



Dacă doriți să vă creați propriul MMS, decât să comandați online, vă rugăm să cumpărați cartea mea The Master Mineral Solution of the 3rd Millennium, care conține instrucțiuni detaliate și multe alte formule. Cu toate acestea, utilizați această carte pentru instrucțiunile de recuperare a sănătății.

Pentru sănătatea ta,

A handwritten signature in black ink, reading "Jim Humble". The script is fluid and cursive, with a large, stylized initial "J" and a long, sweeping underline.

Jim Humble

# Introducere

Această carte este un ghid pentru utilizarea uneia dintre cele mai uimitoare soluții minerale sănătoase din timpul nostru, Master Mineral Solution sau MMS pe scurt. Se produce atunci când o substanță simplă luată dintr-un mineral este amestecată cu oricare dintre acizii de calitate alimentară. Atunci când cele două sunt combinate corespunzător, produce MMS1, care este extrem de eficient în eliminarea toxinelor și a patogenilor bolii din organism.

În 1996, în timp ce făceam o expediție de extracție a aurului în America de Sud, am descoperit că MMS a redat rapid sănătatea victimelor malariei. De atunci, s-a dovedit a restabili sănătatea parțială sau completă a sutelor de mii de persoane care suferă de o gamă largă de boli, inclusiv cancer, diabet, hepatită A, B, C, boala Lyme, MRSA, scleroză multiplă, Parkinson, Alzheimer, HIV / SIDA, malarie, autism, infecții de tot felul, artrită, reflux acid, boli de rinichi sau ficat, dureri, alergii, infecții ale tractului urinar, probleme digestive, hipertensiune arterială, obezitate, paraziți, tumori și chisturi, depres -siune, probleme ale sinusurilor, boli oculare, infecții ale urechii, febra dengue, probleme ale pielii, probleme dentare, probleme cu pros-tate (PSA ridicat), disfuncție erectilă și multe altele. Protocoalele MMS din această carte au fost, de asemenea, utilizate pentru a depăși dependența de alcool și droguri, cum ar fi heroina și altele, fără efecte

secundare, iar lista continuă. Aceasta nu este de departe o listă cuprinzătoare. Știu că sună prea bine pentru a fi adevărat, dar conform rezultatelor pe care le-am văzut din întreaga lume, cred că este sigur să spunem când sunt utilizate corect, MMS are potențialul de a depăși majoritatea bolilor cunoscute de omenire.

Procedurile de recuperare a sănătății prezentate în această carte sunt rezultatul a 20 de ani de învățare a oamenilor cum să folosească MMS pentru a-și recupera sănătatea. Câteva persoane din toată lumea au folosit și au aplicat principiile prezentate în primele mele cărți sau au predat în seminarii. Drept urmare, de-a lungul anilor am primit o mulțime de feedback, dintre care o mare parte a contribuit la această carte. Succesele, chiar și la început, au fost cu mult peste orice am auzit vreodată. Cu toate acestea, ceea ce am realizat de-a lungul drumului ne-a ajutat să ajungem la ceva atât de fantastic încât foarte puțini îl pot crede la început, dar cei care îl încearcă în curând îl descoperă singuri.

Cheia este să utilizați corect MMS. Vreau să subliniez că, înainte de acest moment, au circulat diferite liste de boli, cu sfaturi date despre cum să utilizați protocoalele MMS pentru oricare dintre numeroasele boli specifice. Informațiile din aceste liste sunt inadecvate, învechite și uneori greșite.

De-a lungul anilor de experiență, am ajuns la concluzia că, cu MMS, există de fapt, așa cum spun uneori, doar un singur protocol MMS. Acest protocol este Planul de recuperare a sănătății (HRP), așa cum este dat în această carte. Aceasta este o descoperire importantă și un nou concept pentru utilizarea MMS. Am ajuns să realizez că, dacă cele 50 de protocoale ciudate prezentate în această carte sunt reunite corect și utilizate în ordinea corectă, se vor obține cele mai bune rezultate. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să utilizați toate protocoalele din această carte. Planul de recuperare a sănătății (vezi capitolul 5) explică pașii și secvența adecvată de urmat pentru recuperarea sănătății - și acest lucru se aplică practic tuturor bolilor și bolilor. MMS nu este alb sau negru. Dar dacă veți învăța și aplica principiile pe care le-am subliniat în HRP, sunt încrezător că aveți o bună posibilitate de a vă recupera sănătatea. Indiferent care

este problema dvs., începeți cu Planul de recuperare a sănătății. Dacă urmați aceste instrucțiuni și acordați o atenție deosebită semnalelor pe care vi le dă corpul, este posibilă recuperarea sănătății.

Ceva de o importanță semnificativă în această carte este lista celor trei reguli de aur ale MMS (vezi paginile 66, 83, 84, 130). Aceste reguli sunt absolut esențiale pentru Planul de recuperare a sănătății și aș putea adăuga, aceleași reguli pot fi aplicate oricărui alt program de recuperare a sănătății pe care s-ar putea încerca. Planul de recuperare a sănătății, împreună cu

**Trei reguli de aur ale MMS sunt concepute noi în lumea MMS la care toată lumea ar trebui să acorde o atenție deosebită.**

Vreau să clarific un punct foarte important. Mulți oameni spun în mod natural „MMS vindecă” acest lucru sau altul. Am făcut aceeași afirmație din când în când, în anumite situații, când sunt puse la față locului sau când cuvintele mi-au fost puse în gură sau ca o chestiune de a merge cu fluxul de terminologie pe care îl folosesc alții. În discursul nostru și în societatea noastră globală, adesea estompăm liniile cu cuvinte și semnificațiile lor. Dar, pentru înregistrare, vreau să clarific aici, MMS nu vindecă boala. MMS ucide agenții patogeni și distruge (oxidează) otrăvurile. Când agenții patogeni și otrăvurile din corp sunt reduse sau eliminate, atunci corpul poate funcționa corect și, prin urmare, se poate vindeca. Spun adesea „Corpul vindecă corpul”. MMS ajută la alinierea lucrurilor, astfel încât corpul să poată face exact asta.

Dacă decideți să puneți în practică ceea ce ne învață această carte, atunci mă aștept să aud despre recuperarea sănătății dumneavoastră. Aș aprecia (și și omenirea ar) să vă audă mărturia când v-ați revenit. Vă

rugăm să împărtășiți experiența dvs., astfel încât și alții să poată beneficia. Mergi la:

<http://genesis2church.org/write-new-mms-testimonial>





# Capitolul 1

## Noțiuni de bază

Bine ați venit la Ghidul de recuperare a sănătății MMS. Sper cu adevărat că această carte vă va fi de ajutor, indiferent de starea dumneavoastră de sănătate. Am petrecut multe ore lungi încercând să punem aceste informații într-o ordine adecvată și un limbaj ușor de înțeles. Înainte de a începe, există câțiva termeni pe care trebuie să îi cunoașteți pentru a înțelege lumea MMS. Vă rugăm să vă familiarizați cu definiția termenilor de mai jos și să consultați această listă de câte ori este nevoie în călătoria dvs. către recuperarea sănătății.

### Definiția termenilor

**Activare:** Adăugarea unei substanțe la a doua substanță pentru a produce o schimbare chimică (reacție) de un fel. Când un acid alimentar este adăugat la clorit de sodiu pentru a elibera dioxid de clor, se spune că este activat.

**Culoare chihlimbar:** Când se adaugă acid citric sau clorhidric la clorit de sodiu (în procente menționate în această carte), după 30 de secunde picăturile ar trebui

să devină de culoare chihlimbar. În această carte, când spunem chihlimbar, ne referim la o culoare maro. Acest lucru poate fi de oriunde de la maro deschis la maro închis, dar nu galben. Culoarea chihlimbar a picăturilor activate MMS înainte de a adăuga apă, seamănă mult cu culoarea unei sticle de chihlimbar de sticlă (cum ar fi folosită pentru uleiuri esențiale, diverse potțiuni medicinale sau pentru sticle de bere), atunci când este ținută la lumină.

**Dioxid de clor:** Un compus chimic ( $\text{ClO}_2$ ) prelevat dintr-un mineral natural. Este folosit în programul de recuperare a sănătății din această carte pentru a distruge agenții patogeni și a neutraliza otrăvurile.

**DMSO (dimetil sulfoxid):** O substanță naturală provenită din pulpa de lemn. Este un solvent care dizolvă multe lucruri pe care apa nu le poate dizolva, inclusiv cheaguri de sânge și, prin urmare, se știe că oprește accidentele vasculare cerebrale. Se știe că are multe alte calități vindecătoare proprii, precum și îmbunătățirea eficacității MMS, ajutând la transportarea acestuia mai adânc în țesuturi.

**Reacția Herxheimer:** Oricând cantități mari de agenți patogeni sunt uciși în organism mai repede decât organismul este capabil să elimine toxinele pe care le produce patogenică moartă, poate provoca greață, vărsături, dureri de cap, diaree sau alte suferințe, cum ar fi oboseala excesivă. Aceasta se numește reacție Herxheimer și este frecventă atunci când treceți printr-un program de detoxifiere, cum ar fi respectarea protocoalelor din această carte. Vă rugăm să rețineți că, deși experiența s-ar putea să nu vă facă să vă simțiți deosebit de bine, experiența unei reacții Herxheimer este de obicei un semn că are loc vindecarea. Această carte conține linii directoare cu privire la modul de a facilita procesul de detoxifiere și speranța ajută pe deplin la minimizarea efectelor unei reacții Herxheimer.

**Soluție Master Mineral (MMS):** Numele unei soluții minerale / chimice folosite pentru a ajuta oamenii bolnavi să-și recupereze sănătatea.

**Mineral:** Definiția cuvântului mineral așa cum este utilizată în această carte este preluată din a treia definiție din Random House Dictionary și a patra definiție din Dicționarul Merriam-Webster, care sunt ambele similare. Un mineral este „orice substanță care nu este nici animală, nici vegetală”.

**MMS:** MMS neactivat, care este o soluție de 22,4% de clorit de sodiu ( $\text{NaClO}_2$ ) în apa. (Acesta este fabricat din 80% pulbere de clorit de sodiu sau fulgi.)

**MMS1:** De asemenea, denumit MMS activat. (Rețineți „1” adăugat la MMS.) Este MMS (clorit de sodiu) plus un activator (acid alimentar). Când cele două sunt amestecate, ele produc MMS1 (dioxid de clor [ $\text{ClO}_2$ ]).

**Notă:** *Deși formula chimică pentru **clor** este „Cl”, formula chimică Cl se găsește și în formula chimică pentru dioxidul de clor ( $\text{ClO}_2$ ), și se găsește și în formula chimică a sării de masă ( $\text{NaCl}$ ). Dioxidul de clor este total diferit de înălbitorul obișnuit (hipoclorit de sodiu, care are și Cl în formula chimică,  $\text{NaClO}$ ), care este toxic și se știe că este cancerigen. Dioxid de clor ( $\text{ClO}_2$ ) nu cauzează cancer și are o capacitate uimitoare de a distruge (prin oxidare) microorganismele cauzatoare de boli care ar putea fi pe sau în corpul uman, în timp ce nu dăunează corpului. Datorită naturii chimice a dioxidului de clor, acesta distruge aceste microorganisme în așa fel încât este, de asemenea, distrus în același timp, lăsând în urmă doar câteva boabe de sare simplă de masă, atomi de oxigen descărcați și microorganisme moarte, pe care corpul se poate spăla cu ușurință din sistem.*

**Picături de dozare MMS1:** Oricând în această carte în care ne referim la „picături” de MMS1 (MMS activat), numărăm doar picăturile reale de MMS (clorit de sodiu). Astfel, deși adăugăm picături suplimentare de activator la o doză MMS1, nu contorizăm picăturile de activator adăugate atunci când ne referim la picăturile din doză. De exemplu, o doză de 3 picături de MMS1 va avea 3 picături de MMS și 3 picături de acid activator

producând de fapt 6 picături de lichid total, dar totuși spunem doar că este o doză de 3 picături.

**MMS2:** Hipoclorit de calciu,  $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ , amestecat cu apă se transformă într-o soluție de acid hipocloros, care este un acid oxidant pe care sistemul imunitar uman îl produce în mod natural pentru a distruge germenii bolii și pentru a curăța afecțiunile din sistem.

**Agenți patogeni:** Orice microorganisme care cauzează tulburări în gazda sa. Gazda poate fi umană, animală, vegetală, ciupercă sau chiar un alt microorganism.

**Clorit de sodiu:** Fabricat dintr-un produs chimic preluat din clorură de sodiu ( $\text{NaCl}$ , sare simplă), care este un mineral natural care se găsește în depozite mari din întreaga lume. Există multe procese diferite pentru fabricarea cloritului de sodiu ( $\text{NaClO}_2$ ). Nu se poate face în bucătăria ta. Trebuie făcut într-o fabrică. Când acest proces industrial este finalizat, aveți clorit de sodiu ( $\text{NaClO}_2$ ), care este materia primă pentru realizarea MMS. MMS este o soluție de 22,4% clorit de sodiu în apă.

**WPS:** Soluție de purificare a apei, aceasta este aceeași formulă ca MMS. Este de 22,4% clorit de sodiu ( $\text{NaClO}_2$ ), în apă purificată sau distilată.

## Clarificare

MMS este termenul general de acronim folosit în întreaga lume pentru a indica multe dintre diferitele utilizări ale unei soluții de clorit de sodiu în apă. Cloritul de sodiu este un mineral / chimic, care atunci

când este amestecat cu un acid alimentar generează dioxid de clor. Dioxidul de clor ucide bolile din interiorul și din exteriorul corpului uman și dioxidul de clor este ingredientul activ utilizat în majoritatea protocoalelor noastre.

Deci, uneori se pune întrebarea: Ce este MMS? Este clorit de sodiu? Sau este dioxid de clor? Raspunsul este:



Este ambele! Așa cum am spus mai sus, termenul MMS este adesea folosit ca un termen generic pentru a descrie ceea ce am numit Soluție Minerală Minune în trecut și ceea ce numesc acum Soluția Minerală Maestru. În acest context, s-ar putea spune: „Ei bine, este soluția minerală, deci este dioxid de clor”. Da, dar din nou, o soluție de 22,4% clorit de sodiu este, de asemenea, vândută de obicei sub numele de MMS și se numește MMS în această carte și în alte cărți și site-uri web.

În cărțile noastre, și așa cum s-a menționat mai sus în lista de definiții, ne referim la MMS ca o soluție de 22,4% de clorit de sodiu în apă și folosim acronimul MMS1 pentru a indica faptul că s-a adăugat un acid alimentar la MMS care generează o soluție de dioxid de clor. Tehnic MMS este clorit de sodiu (o soluție de 22,4% în apă), iar MMS1 este MMS plus un activator, care produce dioxid de clor. Cu toate acestea, în fiecare zi, ambele sunt adesea numite pur și simplu MMS. S-ar putea spune: „Este timpul pentru doza mea de MMS” (adică picăturile MMS activate în apă) sau „Dă-mi MMS-ul, astfel încât să-mi pot amesteca doza”, adică dă-mi flaconul cu soluție de clorit de sodiu 22,4% care va fi apoi amestecat cu acid alimentar pentru a produce dioxid de clor. Sau, mai departe, s-ar putea spune: „Trebuie să comand MMS”, ceea ce înseamnă că va comanda o sticlă de clorit de sodiu 22,4%,

Există unii care se referă la MMS pur și simplu ca „CD” pentru dioxid de clor. Personal, nu-mi place acest termen, deoarece adaugă mai multă confuzie subiectului. Mă duc în această explicație îndelungată, nu cu intenția de a confunda, ci, sperăm, de a clarifica, deoarece termenul MMS a mers mult și este folosit în întreaga lume în acest mod general - în opinia mea, nu există oprire. Am concluzionat că pur și simplu trebuie să mergem cu fluxul.

Gândiți-vă așa - adesea compar MMS-ul cu termenul generic pentru cafea. S-ar putea spune că le place să bea cafea. Cu excepția

se pune întrebarea: Ce tip de cafea? La urma urmei, există multe tipuri și variante de cafea și modalități de preparare. Există cafea cu picurare / filtru, cafea făcută dintr-o presă franceză, sau un percolator sau într-un aparat espresso, sau cafea instant rapidă și ușoară. Există o varietate de boabe de cafea și chiar mai multe varietăți de amestecuri de cafea. Există toate tipurile de modalități de a pregăti și bea cafea. Unul ar putea dori un Cappuccino, altul un Mocha Late, altul un Espresso simplu, un Americano, cafea turcească, cafea irlandeză, cafea Viena, Café Cubano, Caffè Latte sau o ceașcă bună de Juan Valdez. Ideea este că, adesea, atunci când faceți referire la toate acestea și la multe alte variante de cafea, dacă ați ieși cu prietenii, ați spune probabil „Să mergem la cafea”, dar când ajungeți la cafenea o varietate de s-ar comanda cafea. În acest sens,

Deci, atunci când vine vorba de amestecarea dozelor de MMS și de utilizarea acestuia pentru refacerea sănătății cuiva conform acestei cărți, vă rugăm să urmați cu diligență termenii pentru MMS așa cum sunt enumerați în definițiile de mai sus și să știți că atunci când vorbiți în termeni generali, acronimul MMS este folosit într-o varietate de moduri.

## **Măsurători utilizate în această carte**

Măsurătorile principale utilizate în această carte sunt picături, uncii de fluid, mililitri și cupe. Aceste măsurători variază ușor de la o țară la alta. De exemplu, o uncie de fluid din Marea Britanie = 28,41 mililitri, o uncie de fluid american = 29,57 mililitri.

Multe operații de gătit și chiar laboratoare completează cifrele de mai sus și fac același lucru. Din simplitate și pentru că această carte este scrisă pentru un public global, am completat următoarele: 1 fluid

uncie la 30 de mililitri; 1/2 cană la 4 uncii de fluid sau 120 de mililitri. (Oriunde găsești uncii sau uncii scrise în această carte, ne referim la o uncie fluidă sau uncii fluide.)

În plus, același lucru este valabil și pentru măsurarea picăturilor. Există diferiți factori care se referă la măsurarea unei picături. În această carte am ales să urmez o regulă generală (bazată pe sistemul metric) de 20 de picături este egal cu 1 mililitru. Este important să rețineți că dimensiunea picăturilor poate diferi în funcție de picurători, sticle cu capace de picurare etc. tind să-ți dea picături fugare - totul ar trebui să fie în regulă. Dacă sticlele dvs. cu picurătoare nu funcționează bine, luați în considerare găsirea unui alt furnizor pentru MMS și activator.

<b>Recuperarea sănătății MMS</b>	
<b>Legenda ghidului</b>	
<b>MMS</b>	<b>MMS neactivat</b>
<b>MMS1</b>	<b>MMS activat</b>
<b>MMS2</b>	<b>hipoclorit de calciu</b>
<b>acid clorhidric</b>	<b>acid clorhidric</b>
<b>ml</b>	<b>mililitru</b>
<b>1 ml</b>	<b>20 picături</b>

<b>1 uncie</b>	<b>30 ml</b>
<b>1 lingură</b>	<b>15 ml</b>
<b>1 lingurita</b>	<b>5 ml</b>
<b>1/2 cana</b>	<b>4 uncii / 120 ml</b>
<b>cc</b>	<b>centimetru cub</b>
<b>1 ml</b>	<b>1 cc</b>

---

## **CDS și CDH**

În afară de MMS1, există alte două forme de MMS - CDS (soluție de dioxid de clor) și CDH (clorură de dioxid-ide Holding). Deși toate cele trei forme funcționează în moduri ușor diferite, toate trei au reușit să ajute oamenii să-și redea sănătatea. Cu toate acestea, în acest Ghid ne vom referi doar la MMS-urile originale - aceasta este formula care până în prezent a fost cea mai încercată și dovedită pe o perioadă mai lungă de timp. Un scop al acestei cărți este acela de a vă oferi, cititorului, o bază bună în utilizarea soluției Master Mineral. Această înțelegere de bază este necesară pentru a utiliza toate formele de MMS. Dacă obțineți aceste elemente de bază, veți fi pe drumul spre o sănătate mai bună. Aceleași principii din această carte pot fi aplicate și celorlalte forme de MMS. (Vezi Anexa A.)

## **Este sigur să luați MMS?**

În 20 de ani, de la descoperirea MMS, nu suntem conștienți de nimeni care moare sau de cineva care suferă răni permanente ca urmare a utilizării MMS (dioxid de clor într-o soluție, care este modul în care este utilizat 99% din timp în întreaga lume ). Știm doar despre un deces înregistrat (un accident industrial) cauzat de dioxidul de clor gazos cu mulți ani înainte de descoperirea MMS. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că dioxidul de clor a fost utilizat pe scară largă pentru purificarea apei, pentru igienizarea podelelor spitalelor, pentru dezinfectarea abatoarelor și pentru purificarea legumelor, împreună cu alte sute de alte utilizări. Mai mult decât orice alt mineral / chimic, dioxidul de clor prin aceste și alte mijloace a îmbunătățit sănătatea și viața a un număr de milioane de

oameni din întreaga lume și încă nu au fost înregistrate decese sau răni permanente cauzate de utilizarea dioxidului de clor în 100 de ani. Aceasta include, de asemenea, multe milioane de oameni care au luat MMS pe cale orală în scopul restaurării sănătății. Comparați fără decese,



cu excepția unui singur accident industrial care nu este legat de MMS, de aproximativ 950.000 de decese cauzate anual de medicamente farmaceutice-ceutice sau de cele 15.000 de decese cauzate de Ibuprofen și Aspirină, doar în SUA. Toate lucrurile luate în considerare, dioxidul de clor este unul dintre cele mai sigure, dacă nu chiar cel mai sigur produs chimic cunoscut. Pentru mai multe detalii vezi:

<http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf>

DMSO (dimetil sulfoxid) este, de asemenea, utilizat în unele dintre protocoalele noastre. În cei 60 de ani de la introducerea DMSO în SUA, nu s-a raportat niciodată un prejudiciu permanent sau un deces cauzat de DMSO. DMSO a fost dovedit științific că are calități curative proprii, precum și îmbunătățirea eficacității MMS.

## **Ce nu este MMS**

Au existat critici care au încercat să discrediteze MMS spunând că este „înălbitor” sau că este derivat din înălbitor, prin urmare aș dori să explic câteva elemente de bază aici. Pentru a acoperi temeinic acest subiect, este necesar să se aprofundeze destul de profund în chimie. Cu toate acestea, elementele de bază sunt destul de simple și asta voi atinge aici. Deși dioxidul de clor ( $\text{ClO}_2$ ) și sarea de masă ( $\text{NaCl}$ ) au ambele elementul clor în compoziția sa (din nou, rețineți că „Cl” din ambele formule înseamnă clor), în acest caz clorul este într-o formă care nu este periculoasă și este de fapt utilă. Pe de altă parte, înălbitorul de uz casnic, care este hipoclorit de sodiu

(NaClO), are și Cl în formulă, dar în acest caz clorul (Cl) este într-o formă diferită și poate fi, în unele cazuri, foarte periculos. (Vă rugăm să rețineți că aceste trei substanțe, deși toate au „Cl” într-o anumită formă în formulă, sunt complet diferite.)

Puteți căuta pe internet fișa tehnică de securitate (MSDS) (Material Safety Data Sheet) pentru aceste informații. Această fișă cu date de securitate arată în „Date de stabilitate” că hipocloritul de sodiu ( $\text{NaClO}$ ), care din nou este înălbitor de uz casnic, poate reacționa cu produsele de curățat vasele de toaletă, îndepărtează rugină, oțetul, acizii și produsele de amoniac pentru a produce gaze periculoase care au cauzat spitalizare și chiar moarte. La fiecare subiect britanic au loc în fiecare an până la 2.200 de incidente de spitalizare. Atunci când este amestecat cu diverse ape de la robinet și adus în contact cu corpul uman, acesta poate produce substanțe chimice care sunt cauzatoare de cancer, ceea ce dioxidul de clor și sarea de masă nu pot face.

Dioxidul de clor este fabricat într-unul din mai multe procese diferite din minerale și substanțe chimice preluate din mineralul natural, clorura de sodiu ( $\text{NaCl}$ ), care este de fapt sare de masă. Deci, sarea de masă obișnuită, clorura de sodiu ( $\text{NaCl}$ ) prin diferite procese de fabricație devine clorit de sodiu ( $\text{NaClO}_2$ ). Din punct de vedere chimic, acest lucru se realizează prin adăugarea a doi atomi de oxigen ( $\text{O}_2$ ) la fiecare mol-cule de sare ( $\text{NaCl}$ ) pentru a produce ( $\text{NaClO}_2$ ) care este cloritul de sodiu. Atunci când acest clorit de sodiu este amestecat cu un acid alimentar slab, acesta devine dioxid de clor ( $\text{ClO}_2$ ) care este principalul ingredient activ din protocoalele discutate în această carte.

Dioxidul de clor are sute de utilizări în industrie și este utilizat de peste 1.000 de ori mai puternic decât soluția de recuperare a sănătății MMS din această carte. Doza noastră standard de 3 picături de soluție de clorit de sodiu (22,4% clorit de sodiu în apă) în 120 ml (1/2 cană) de apă nu face niciun fel de soluție care poate fi numită „înălbitor” referitoare la ceva suficient de puternici pentru

a curăța o toaletă, etc. Criticii care vorbesc despre MMS fiind înălbitor nu reușesc decât să sperie inutil oamenii și să îi determine pe cei pe care îi sperie să continue să sufere sau chiar să moară. Uită-te doar la formula -  $\text{NaClO}_2$  (clorit de sodiu / MMS) este

diferit de NaClO (hipoclorit de sodiu) - formulă diferită, substanțe diferite. Deci fii deștept, nu-i lăsa pe alții să te păcălească!

## Înțelegerea oxidării

### Oxidare

Micile particule ale universului sunt ținute împreună de electronii care le înconjoară. Orice acțiune care duce la schimbarea electronilor care țin materia împreună este considerată oxidare. S-ar putea să fi crezut că oxidarea este cumva adăugarea de oxigen la ceea ce se oxidează, dar nu așa. Practic, oxidarea fie elimină, fie modifică poziția electronilor care țin lucrurile laolaltă. Acest lucru fie distruge complet substanțele, fie le transformă în altceva.

### MMS și oxidare

MMS1 (dioxid de clor) distruge agenții patogeni (microorganisme cauzatoare de boli) nu prin utilizarea oxigenului, ci prin oxidarea acestora. MMS1 atrage o parte din electronii care țin agenții patogeni împreună, rezultând astfel distrugerea lor. MMS1 este, de asemenea, complet distrus în procesul distructiv, lăsând în urmă doar o cantitate foarte mică de sare de masă (clorură de sodiu [NaCl]) și oxigen neutru, care pur și simplu se spală din corp. Diferite otrăvuri create de agenții patogeni sunt, de asemenea, distruse de procesul de oxidare. Faptul este că MMS1 nu vindecă corpul de boală. Pe măsură ce are loc

procesul de oxidare a uciderii agentului patogen, corpul, eliberat de toxine, este cel care vindecă corpul. Bacteriile benefice sunt extrem de rezistente la oxidare și, prin urmare, nu sunt afectate de dioxidul de clor.

## **Alte procese oxidante**

Oxigenul este oxidantul pe care natura l-a desemnat pentru utilizare în corpul uman datorită numeroaselor sale caracteristici importante. Terapiile actuale cu oxigen implică mai mult decât simpla respirație. Într-un tip de oxigenoterapie, subiectul intră într-o cameră hiperbară presurizată umplută cu oxigen pur. Oxigenul pur sub presiune este de multe ori mai eficient decât oxigenul nepresurizat. Acest lucru are multe beneficii și, în unele cazuri, a făcut minuni. Din nefericire, presiunea crescută înmulțește și caracteristicile negative ale oxigenului, și anume creșterea capacității oxigenului de a oxida (distruge) celulele bune, precum și cele rele. Acest tratament este, de asemenea, foarte costisitor și sunt de obicei necesare mai multe tratamente; prin urmare, majoritatea omenirii pur și simplu nu își poate permite costul.

Alți doi oxidanți foarte puternici, care sunt uneori folosiți în organism, sunt apa oxigenată și ozonul. În timp ce ambele au fost și sunt utilizate pentru a ajuta la eradicarea bolilor, în același timp, ele pot deteriora corpul atunci când sunt utilizate în mod necorespunzător. Ambele sunt mai puternice decât oxigenul sau MMS1 (dioxid de clor). Peroxidul de hidrogen și ozonul pot distruge multe lucruri, inclusiv țesuturile corpului uman.

Agenții patogeni se ascund adânc în țesuturile corpului. Deoarece peroxidul de hidrogen și ozonul, la fel ca dioxidul de clor, sunt distruse atunci când oxidează ceva, ele sunt de obicei distruse prin oxidarea țesuturilor corpului înainte de a ajunge la agenții patogeni care se ascund în țesuturi. Ele pot fi, de asemenea, distruse de otrăvuri și impurități din sânge și țesături. Ozonul și

peroxidul de hidrogen pot fi uneori utile, dar nu ar trebui niciodată să fie utilizate de cineva care nu este foarte instruit în utilizarea lor.

Potențialele de oxidare ale acestor patru oxidanți sunt date mai jos. Se măsoară puterea unui anumit oxidant



în volți și după cum puteți vedea, dioxidul de clor (MMS1) este cel mai puțin puternic dintre cei patru oxidanți. Deoarece MMS1 este selectiv (agenți patogeni oxidanți și nu țesuturile corpului), poate fi atât mai eficient în oxidarea agenților patogeni, cât și mai sigur decât acești alți oxidanți.

<b>Dioxid de clor</b>	<b>0,95 volți</b>
<b>Oxigen</b>	<b>1,30 volți</b>
<b>Apă oxigenată</b>	<b>1,80 volți</b>
<b>Ozon</b>	<b>2,07 volți</b>

**Notă:** Pentru o explicație mai detaliată a înțelegerii MMS și procesul de oxidare, citiți cartea *The Master Mineral Solution of the 3rd Millennium Chapter 21, Oxidizers and Oxidation* și Anexa, Înțelegerea MMS. Citiți întreaga carte pentru o înțelegere detaliată a tuturor aspectelor MMS și a funcției sale.

## Un Cuvânt pentru Înțelepți

Din experiența mea, unii oameni vin ocazional cu motive pentru a modifica tehnicile și protocoalele Bisericii Genesis II (vezi Anexa B). Acest lucru împiedică adesea protocoalele să funcționeze sau să funcționeze cât de bine pot. Informațiile din această carte sunt rezultatul a milioane de oameni care au luat MMS pe o perioadă de 20 de ani. Miniștrii noștri ai sănătății au învățat prin

experiență că aceste protocoale funcționează cel mai bine atunci când sunt urmate așa cum sunt date aici. Deci, vă rugăm să mergeți după carte, să urmați cu atenție instrucțiunile și, pentru rezultate optime, vă rugăm să nu modificați procedurile.

Această carte este plină de detalii esențiale care sunt importante de știut pentru a-și recupera sănătatea. Dacă nu sunteți conștienți de unele dintre aceste detalii vitale, aceasta vă poate împiedica recuperarea, la fel, alte puncte importante vă pot ajuta să vă asigurați

recuperarea ta. Vă încurajez cu tărie să citiți această carte în întregime - din față în spate! Nu doriți să tăiați colțurile atunci când aflați despre MMS.

Este important să știți că, deși vă încurajez să citiți cartea completă, nu trebuie să terminați cartea înainte de a începe planul de recuperare a sănătății (capitolul 5). După ce ați citit și înțeles capitolul 1 până la capitolul 6, puteți începe drumul către recuperarea sănătății, începând cu procedura de pornire (vezi pagina 79). Nu trebuie să cunoașteți întreaga carte pe dinăuntru pentru a începe, dar continuați să citiți și să vă educați în Planul de recuperare a sănătății MMS. Citind toate acestea, veți avea o înțelegere a diferitelor moduri în care MMS poate fi folosit - și veți învăța câteva lucruri și lucruri foarte importante esențiale pentru recuperarea sănătății.



**Memorie restaurată:** Un tip în vârstă (în vârstă de 80-90 de ani), care a susținut că a fost ultimul supraviețuitor al companiei chimice (de când a fost închisă), care obișnuia să funcționeze în New Plymouth și a făcut Agent Orange și multe alte spray-uri toxice. După 50 de ani neobișnuiți de muncă acolo, el a spus că era atât de plin de

toxine încât nu-și mai amintea de lucrurile pe care le făcuse cu o zi înainte, împreună cu alte efecte asupra sănătății legate de acumularea de toxine în organism. Cineva i-a spus despre MMS, pe care l-a încercat. Mi-a sunat în a doua zi, tot entuziasmat, spunând că își amintește tot ce făcuse cu o zi înainte. El a susținut că este cu 100% mai bun în aproximativ o săptămână pe MMS. Acum este un avocat al MMS, spunând tuturor celor care sunt dispuși să asculte. —P

## capitolul 2

# Măsuri de siguranță

Dioxidul de clor este utilizat în siguranță de o sută de ani în spitale, în prepararea alimentelor, în purificarea apei și pentru multe alte lucruri. A fost folosit în ultima perioadă foarte sigur de milioane de oameni pentru a-și îmbunătăți sănătatea cu rezultate excelente. Cu toate acestea, există câteva cazuri în care trebuie aplicată precauție. Vrem să aveți cea mai plăcută experiență posibilă în timp ce vă recăpătați sănătatea. Nu vă lăsați lăsați de aceste măsuri de precauție, dar fiți conștienți de acestea înainte de a începe călătoria dvs. către o sănătate optimă.

Unele dintre măsurile de siguranță enumerate mai jos apar în alte secțiuni ale acestei cărți sub diferitele subiecte la care se referă. Le repetăm aici, pentru a vă oferi această listă compilată pentru o referință ușoară. Vă rugăm să rețineți că unele dintre măsurile de siguranță importante enumerate mai jos apar doar pe această listă.

† Nu lăsați MMS la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Până în prezent nu au existat decese, cu toate acestea, câțiva copii au fost foarte bolnavi după ce au băut accidental o doză foarte mare (nedestinată pentru un copil) de MMS.

† Nu permiteți niciodată MMS (soluție de clorit de sodiu) să stea într-o sticlă sau sticlă nemarcată. Nu are miros și este adesea dificil sau imposibil să se facă diferența dintre MMS

și apa. Unii oameni au băut până la jumătate de pahar înainte de a-și da seama că nu beau apă. Aceasta este o supradoză imensă de MMS concentrat nediluat și au fost în spital câteva săptămâni! În cazul unei supradoze, dacă o persoană bea prea mult MMS fie din greșeală, fie intenționat, ar trebui să bea imediat cât mai multă apă cu sare posibil pentru a provoca vărsături (utilizați 1 lingură de sare la 1 litru / litru de apă); apoi bea mai multă apă sărată și încearcă să vomiti din nou și fă asta de mai multe ori. Dacă se simt rău după acest proces, ar trebui să meargă la un spital.

† Asigurați-vă că toate sticlele de MMS, acid etc. sunt etichetate clar, astfel încât să puteți ști cu ușurință ce conține. În mod ideal, etichetele ar trebui să fie în culori diferite pentru a facilita diferențierea acestora. Dacă utilizați etichete de hârtie, vă ajută să le acoperiți cu bandă Scotch, pentru a evita dezintegrarea și destrămarea lor, dacă scurgerile se adâncesc în timp.

† Am sugerat utilizarea unei sticle de pulverizare pentru ochi, precum și pentru utilizare topică pentru alte părți ale corpului. Cu toate acestea, formula pentru utilizare în ochi este semnificativ diferită de formula pentru utilizarea topică a pielii. Aveți grijă să păstrați foarte bine marcate aceste două soluții de pulverizare diferite. Nu folosiți niciodată flaconul de pulverizare destinat pielii din ochi.

† Dacă luați prea mult MMS1 și aveți o reacție gravă Herxheimer (greață, vărsături, diaree excesivă) luați vitamina C ca antidot. Luați 2 grame (2.000 mg) de vitamina C simultan. Dacă simptomele persistă, puteți lua încă 1 gram de vitamina C în următoarea oră și încă 1 gram în a treia oră. Nu treceți peste această cantitate de vitamina C. Alte două opțiuni de utilizat ca antidot ar fi:

Mâncăți un măr proaspăt. Nu mușcați și nu înghițiți, acest lucru trebuie mestecat foarte bine. Sau luați 1 linguriță de nivel de bicarbonat de sodă în 1/4 dintr-o ceașcă (2



uncii / 60 ml) de apă. Mai beți câteva înghițituri de apă simplă după aceasta, dacă doriți.

† Dacă locuința dvs. are un rezervor septic, nu aruncați deșeurile MMS pe canal, deoarece pot ucide bacteriile din rezervor. Acest lucru face o mizerie și este costisitor de reparat.

† Rezistența completă a lichidului MMS din flacon (soluție de clorit de sodiu 22,4%) poate irita pielea. Dacă intră în contact direct cu pielea, clătiți-o cu apă curată. Încercați să evitați să o luați pe haine, deoarece soluția concentrată le poate decolora. O soluție diluată poate decolora și unele țesături, în funcție de concentrație și țesătură. (Există două excepții de la această regulă de a pune MMS cu rezistență maximă pe piele, puteți face acest lucru pentru perioade scurte de timp pentru a ajuta la arsuri și mușcături de țânțari, consultați paginile 245 și 196 pentru instrucțiuni adecvate.)

† Evitați respirația în concentrații mari de dioxid de clor gazos produs din amestecul de clorit de sodiu și un activator acid. Dioxidul de clor gazos scapă ușor atunci când MMS și activatorul sunt amestecate și nu se află într-un recipient sigilat. Cel mai bine este să evitați să obțineți un miros direct, deoarece ar putea provoca tuse. Nu amestecați doza direct sub nas sau gură. Dacă faceți Protocolul Bag, (a se vedea pagina 156) aveți grijă în special să nu respirați direct fumurile. Există momente în care este necesară respirația gazului în cantități mici controlate (vezi pagina 159) și poate fi foarte vindecătoare pentru plămâni și sinusuri, dar evitați acest lucru, cu excepția cazului în care vă aflați sub un protocol specific care o solicită și știți ce sunteți. face, deoarece este ușor să inhalați prea mult.

† Se știe că protocoalele MMS anulează efectul pilulelor anticoncepționale.

† Când călătoriți cu sau transportați MMS, acid activator și alte consumabile necesare pentru a face protocoalele

această carte, asigurați-vă că separați toate tipurile diferite de lichide și pulberi. MMS (cloritul de sodiu) și activatorul acid trebuie ambalate separat, niciodată în aceeași pungă, pentru a evita scurgerile și posibila activare prematură. DMSO nu ar trebui niciodată să fie ambalat niciodată în același container sau valiză ca MMS2 (a se vedea avertismentul important la pagina 26). Asigurați-vă că toate acestea sunt ambalate corespunzător, astfel încât să nu se poată vărsa. (Sugestie: Puneți în pungi de plastic, bandă, apoi puneți în pungi duble Ziploc). Dacă călătoriți pe calea aerului, asigurați-vă că cunoașteți reglementările companiei aeriene pentru transportul diferitelor tipuri de lichide și consumabile (și în ce cantități) pe transportatorul pe care îl utilizați. Fiți responsabil și sânguincios pentru a împacheta cu atenție pentru a evita orice probleme pentru dvs. sau pentru ceilalți sau reflectați negativ asupra MMS în general.

## **HIPOCLORIT DE CALCIU (MMS2)**

† Hipocloritul de calciu se poate aprinde chiar și cu o scânteie foarte mică atunci când intră în contact cu materiale organice. De exemplu: dacă cineva a îndesat o cârpă (orice tip de pânză) în borcanul cu hipoclorit de calciu și, din orice motiv, o scânteie de la o lumânare, țigară sau orice alt tip de scânteie ar fi lovit-o, ar provoca un incendiu instant și extrem de fierbinte .

† În cazul unei deversări de pulbere de hipoclorit de calciu, curățați-l cu două gropi de praf, sau cu un recipient de praf și cu o cârpă umedă, dar nu folosiți o mătură, deoarece o scânteie ar putea aprinde cu ușurință mătura atunci când intrați în contact cu pulberea de hipoclorit de calciu.

† Hipocloritul de calciu este higroscopic și va atrage umezeala din aer. Dacă rezerva dvs. devine umedă, aruncați-o, dar nu pe canalul de scurgere dacă aveți o fosă septică. Dacă aveți un canal de canalizare o cantitate mică, aproximativ un litru, nu îl va răni. Puteți să-l aruncați într-un depozit de oraș sau cu un colector de gunoi de oraș, după ce ați adăugat o cantitate mică de apă pentru a vă asigura că nu se poate aprinde.

† Evitați contactul cu pielea și ochii atunci când sunt sub formă de pulbere.

† Nu respirați direct fumurile din hipocloritul de calciu.

† Nu faceți mai multe capsule MMS2 decât aveți nevoie pentru o lună, deoarece capsulele vor deveni fragile și se pot rupe cu ușurință.

† Dacă utilizați o mașină cu capsule pentru a vă compune capsulele MMS2 (consultați paginile 93-94, 274-278), utilizați una fabricată din plastic, deoarece pulberea de hipoclorit de calciu nu trebuie să intre în contact cu metalul.

## **AVERTIZARE**

- Nu permiteți ca hipocloritul de calciu (MMS2) să intre în contact cu DMSO. Acest lucru va provoca arderea imediată cu căldură și foc extrem. În acest caz, nu are nevoie de scânteie pentru a porni instantaneu focul. Folosiți apă pentru a stinge un astfel de foc, dar stați înapoi, deoarece apa se va stropi.
- Hipocloritul de calciu (MMS2) nu trebuie ambalat niciodată în același recipient, cutie sau valiză ca DMSO. Când transportați aceste articole, împachetați-le întotdeauna separat.

## **AVERTISMENT DE INGESTIE**

- Nu utilizați niciodată DMSO într-o băutură în timp ce luați în același timp capsule de hipoclorit de calciu (MMS2). DMSO poate provoca încălzirea MMS2 și poate deveni foarte incomod în stomac. (Dacă acest lucru se întâmplă accidental, beți multă apă rece pentru a atenua orice disconfort.)

- Dacă adăugați DMSO la o doză MMS1, conform Protocolului 1000 Plus, de exemplu, nu trebuie să calculați mai mult de 3 picături de DMSO per fiecare picătură de MMS1 și trebuie amestecat în cel puțin 1/2 cană (4 uncii / 120 ml ) de apă.
- Dacă pe un protocol care solicită administrarea MMS2 în aceeași zi cu dozele MMS1 / DMSO, puteți face acest lucru, dar capsula MMS2 trebuie separată cu o jumătate de oră de dozele MMS1 / DMSO. Nu luați niciodată o doză din nimic care conține DMSO și o capsulă MMS2 în același timp!

## **ACID CITRIC / ACID HIDROCHLORIC (HCl)**

➤ Acidul citric și acidul clorhidric (HCl) nu trebuie să intre în contact cu pielea. Acidul poate fi spălat de pe piele cu apă curată. Dacă acidul pătrunde în ochi, spălați-l cu apă curată până când dispariția senzației de usturime. Dacă spălați ochiul imediat, nu ar trebui să existe nicio problemă, dar dacă luați până la 30 de secunde înainte de a vă aduce apă curată în ochi, poate exista o problemă și ar trebui să mergeți imediat la o clinică de urgență, dar nu înainte de clătire ochiul bine cu apă. Unele măsuri de precauție sugerate pentru a evita stropirea ochilor ar fi - purtați ochelari atunci când turnați acizi, aveți grijă să țineți sticla la distanță și înălțime, astfel încât să evitați stropirea în ochi, folosiți un pahar suficient de adânc.

† Pentru unii (nu toți) oamenii, se știe că acidul citric provoacă tulburări semnificative de stomac. În acest caz, utilizați HCl 4% ca activator pentru MMS în loc de acid citric.

† Protocoalele noastre solicită 4% HCl. În această concentrație nu ar trebui să producă daune grave dacă este vărsat accidental pe piele, dar trebuie totuși clătit imediat.



Cu toate acestea, HCl cu rezistență mai mare și alți acizi cu rezistență ridicată pot fi dăunători dacă nu sunt manipulate corespunzător. Rețineți că de fiecare dată când transportați sau transportați acizi puternici la o distanță mai mare decât în aceeași cameră, ar trebui să purtați și apă cu voi. Acest lucru vă va permite să clătiți imediat orice acid vărsat de pe piele sau din ochi. Scurgerile mari pot provoca leziuni grave și chiar moarte dacă nu sunt clătite imediat de pe piele sau din ochi. În cazul în care trebuie să manipulați HCl într-o concentrație ridicată, faceți acest lucru într-o zonă foarte bine ventilată, folosiți o mască adecvată, purtați mănuși și aveți mare grijă să nu respirați fumul, deoarece poate provoca daune.

## **DMSO**

† DMSO este un solvent și trece cu ușurință prin piele și în țesuturi. De asemenea, va transporta și alte substanțe, așa că aveți grijă la ceea ce aveți pe piele înainte de a manipula DMSO.

† Dacă aplicați DMSO local, asigurați-vă că mâinile și unghiile sunt curate și lipsite de contaminanți (inclusiv reziduuri de săpun) atunci când manipulați DMSO. De asemenea, doriți să vă asigurați că zona pe care aplicați DMSO este curată.

† Când spălați o zonă a pielii înainte de a aplica DMSO, este mai bine, dacă este posibil, să folosiți săpun natural, fără substanțe chimice, pentru a spăla zonele de aplicare și mâinile. Indiferent dacă este disponibil sau nu, asigurați-vă că orice săpun este complet clătit - sau nu folosiți deloc săpun. Pur și simplu spălați bine (frecând pielea) cu apă curată.

† Cea mai bună metodă de a aplica DMSO pe piele este pur și simplu să folosiți mâinile goale și uscate curate atunci când frecați DMSO în corpul dvs. sau pe altcineva.

† Dacă folosiți mâinile goale pentru a aplica DMSO, nu purtați oă. DMSO este un solvent care nu numai că se va dizolva

lustruirea, dar își va transporta și ingredientele toxice prin piele și în corp. Vă puteți acoperi mâna într-o pungă sandwich din plastic (acest tip de plastic, în general, este OK pentru utilizarea cu DMSO) pentru a aplica DMSO.

† După manipularea DMSO, nu-l spălați niciodată cu săpun, deoarece poate transporta săpunul în piele / țesuturi. Pur și simplu clătiți bine mâinile cu apă curată.

† Păstrați DMSO cu toată puterea din ochi.

† Nu utilizați mănușile cele mai comune (cauciuc, latex etc.) cu DMSO. Poate dizolva mănușile. Chiar și dizolvarea unei mici mănuși poate transfera cauciucul sau latexul în corpul dumneavoastră. Mănușile din plastic care nu se pot întinde sunt bine de utilizat cu DMSO. În mod normal, DMSO nu își va răni mâinile, iar mănușile nu sunt necesare. (Dacă se aplică frecvent sau în cantități mari pentru unele tipuri de piele, aceasta poate cauza pielea să se încrețească, dar acest lucru trece în curând.)

† **Nu adăugați niciodată DMSO la o soluție de clismă.** Colonul conține multe toxine pe care corpul le elimină. Dacă puneți DMSO în colon, puteți returna unele dintre aceste toxine înapoi în fluxul sanguin.

## AVERTIZARE

- Nu permiteți ca DMSO să intre în contact cu hipocloritul de calciu (MMS2). Acest lucru va provoca arderea imediată cu căldură și foc extrem. În acest caz, nu are nevoie de scânteie

pentru a porni instantaneu focul. Folosiți apă pentru a stinge un astfel de foc, dar stați înapoi, deoarece apa se va stropi.

- DMSO nu trebuie ambalat niciodată în același recipient, cutie sau valiză ca hipocloritul de calciu (MMS2). Când transportați aceste articole, împachetați-le întotdeauna separat.

## AVERTISMENT DE INGESTIE

- Nu utilizați niciodată DMSO într-o băutură în timp ce luați în același timp capsule de hipoclorit de calciu (MMS2). DMSO poate provoca încălzirea MMS2 și poate deveni foarte incomod în stomac. (Dacă acest lucru se întâmplă accidental, beți multă apă rece pentru a atenua orice disconfort).
- Dacă adăugați DMSO la o doză MMS1, conform Protocolului 1000 Plus, de exemplu, nu trebuie să calculați mai mult de 3 picături de DMSO la fiecare picătură de MMS1 și trebuie amestecat cu cel puțin 1/2 cană (4 uncii / 120 ml ) de apă.
- Dacă pe un protocol care solicită administrarea MMS2 în aceeași zi cu dozele MMS1 / DMSO, puteți face acest lucru, dar capsula MMS2 trebuie separată cu o jumătate de oră de dozele MMS1 / DMSO. Nu luați niciodată o doză care conține DMSO și o capsulă MMS2 în același timp!



**Heroine Free:** Vă mulțumim că ați oferit MMS lumii noastre. Personal, am ajutat

destul de mulți oameni să obțină o dependență completă de heroină în trei până la patru zile numai cu 3/4 picătură de MMS1 pe oră. Aceasta este în fiecare oră când sunt treji. Am inclus și băi MMS1, folosind 25 de picături de MMS1 pe baie. Am asistat personal o mână plină de oameni cu rezultate 100% incredibile. —Ravi, Anglia



**Candida a plecat:** Am avut-o pe Candida atât de rău, încât nu numai că am fost epuizată ani de zile, dar ciuperca mi-a migrat spre ochi și urechi. Era ca și cum ai privi prin coli de hârtie cerată. Urechile mele bâzâiau și sună fără oprire. Am mâncat peste tot, mai ales noaptea când era atât de rău încât mă trezea dintr-un somn profund. Am avut multe alte simptome și am încercat multe remedii, dintre care niciunul nu a funcționat până când am încercat MMS. A trebuit să-mi schimb dieta cu o dietă foarte scăzută în carbohidrați, deoarece zahărul hrănește drojdia. Nu cred că te poți îmbunătăți dacă vei continua să consumi dieta americană standard, așa că mi-am modificat dieta pentru a nu include aproape niciun fel de boabe, niciun fel de zaharuri și fructe foarte limitate. Trebuie să faceți acest lucru pentru a vă recupera. Am găsit un produs numit Syclovir care făcea o treabă excelentă la menținerea simptomelor la distanță, dar nu a existat niciun remediu nici după un an pentru produs. Apoi am citit că MMS ar putea ajuta la uciderea Candidei, așa că am luat 7 picături de 4 ori pe zi și am început să văd îmbunătățiri. Cred că au trecut aproximativ 2 luni de la această abordare și energia mea este ridicată. Pot tolera acum mai mulți carbohidrați

fără simptome. Mă simt minunat și știu că este din cauza MMS. În plus, MMS a inversat artrita pe care o aveam în degetele de la picioare și trebuie să-mi fi curățat venele, deoarece acum mă pot exercita și nu mă pot respira. Ce miracol s-a dovedit a fi MMS în viața mea! —Kathryn  
MMS a inversat artrita pe care o aveam în degetele de la picioare și trebuie să-mi fi curățat venele, pentru că acum mă pot exercita și nu mă pot respira. Ce miracol s-a dovedit a fi MMS în viața mea! —Kathryn  
MMS a inversat artrita pe care o aveam în degetele de la picioare și trebuie să-mi fi curățat venele, pentru că acum mă pot exercita și nu mă pot respira. Ce miracol s-a dovedit a fi MMS în viața mea! —Kathryn



**Recuperări multiple:** MMS1 și 2 m-au vindecat de mărirea / durerea pros-tatei ... infecția gingiei / dinților și candida. Uimitor! Folosesc MMS pentru a face baie ... excelent pentru piele și pentru mușchii obosiți. —James A., Noua Zeelandă



## capitolul 3

# MMS Basic Essentials

Există câteva informații fundamentale pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a încerca să utilizați MMS. La fel ca multe lucruri, MMS este ușor de utilizat odată ce îl cunoașteți. Dar, ultimul lucru pe care ar trebui să-l faci este să încerci să-l folosești fără să știi ce faci. Dacă alegeți să vă asumați responsabilitatea pentru propria sănătate, vă rugăm să vă faceți temele înainte de a încerca să efectuați oricare dintre protocoalele din această carte.

Iată doi factori cheie care ar putea face o diferență în ceea ce privește recuperarea sănătății:

1. De fiecare dată când porniți un protocol, chiar dacă ați citit cartea inițial sau cu câteva luni în urmă, asigurați-vă că revedeți temeinic informațiile din protocolul pe care urmează să îl începeți. Este important să aveți o înțelegere clară a tot ceea ce trebuie făcut înainte de a începe. Acest lucru vă va ajuta să adunați toate materialele necesare protocolului și vă va ajuta să evitați să ajungeți la un anumit pas în protocol și să fiți prins scurt sau să vă dați seama că ați făcut ceva greșit la început. Unele protocoale sunt mai detaliate decât altele și unele conțin precauții importante și / sau detalii

esențiale pentru succes. Așadar, reîmprospătați-vă memoria și înțelegeți clar fiecare detaliu înainte de a începe un protocol.

2. Dacă este posibil, aveți un partener. MMS are multe utilizări. Puteți merge bine folosind un protocol pentru o curățare generală

sau pentru a depăși o răceală obișnuită. Dar când sunteți foarte bolnav, fie că aveți o gripă foarte gravă sau o boală mai gravă sau pe termen lung, este posibil să nu vă simțiți gata să amestecați o doză sau să pregătiți o baie sau să țineți evidența orelor și măsurilor. Nu încercați să mergeți singur. Găsiți pe cineva, un soț, un părinte, un fiu sau o fiică, o mătușă sau unchi, un bunic, un prieten sau un îngrijitor, care să vă poată ajuta în călătoria dvs. către wellness.

## **Activarea MMS**

### **Acid citric și acid clorhidric (HCl)**

MMS are nevoie de un acid de calitate alimentară pentru a-l „activa” și cele două combinate produc MMS1 (dioxid de clor). Există mai mulți acizi care pot activa MMS, inclusiv sucul unei lămâi proaspete sau lime sau oțet. Cu toate acestea, în această carte, când ne referim la utilizarea unui acid pentru activarea MMS, ne referim la utilizarea fie a 50% acid citric, fie a 4% HCl (acid clorhidric). Când utilizați acești doi acizi în aceste procente, utilizați întotdeauna 1 picătură de acid la 1 picătură de MMS. Ambii acizi, în aceste procente, au un raport 1-la-1 cu MMS. Cu alte cuvinte, amestecați 1 picătură din oricare dintre acești acizi la fiecare 1 picătură de MMS. Timpul standard de activare pentru amestecarea acestor doze picătură cu picătură folosind 50% acid citric sau 4% HCl este de 30 de secunde. Consultați pagina 32 pentru instrucțiuni complete despre cum să amestecați o doză de bază MMS1.

Preferăm HCl ca activator ales, deoarece este același acid care este produs în mod natural în stomac. Mulți

oameni consideră că are un gust mai bun și este mai ușor pe stomac.

## **Unii acizi alternativi**

Atât acidul citric, cât și cel clorhidric sunt ușor de utilizat ca activatori pentru MMS; cu toate acestea, în funcție de locația și disponibilitatea dvs. sau în caz de urgență, alți activatori, cum ar fi

ca suc proaspăt de lămâie sau lămâie sau oțet, pot fi utilizate pentru a activa MMS, dar acestea măsoară diferit. Dacă utilizați oricare dintre acești acizi, va trebui să utilizați 5 picături de lămâie, lime sau oțet pentru fiecare 1 picătură de MMS, la un raport de 1 la 5. Dacă se utilizează acești acizi alternativi, timpul de activare trebuie să fie de trei minute, în loc de 30 de secunde, care este timpul de activare standard pentru 50% acid citric sau 4% HCl.

## Note

† Când folosiți sucul de lămâie sau lămâie proaspătă, este important să nu folosiți o presă de citrice care să stoarce în vreun fel coaja (pielea sau suprafața exterioară) a lămâii sau a limei. Proprietățile uleiului din coaja de lămâie / lime, dacă sunt amestecate cu suc, pot preveni activarea cloritului de sodiu și, astfel, pot lăsa unul cu o doză inutilă. Puteți preveni această problemă strângând lămâia / lămâia cu mâna. Diferitele stoarce de plastic și metal (în special cele de mână) pun prea mult din uleiurile de coajă în sucul de lămâie / lime. Așa că stoarceți lămâia / lămâia cu mâna. Prin aceasta, vreau să spun tăiați lămâia / lime în jumătate, luați o jumătate în mână și stoarceți ușor numărul de picături de care aveți nevoie. Pur și simplu numărați picăturile pe măsură ce cad pentru cantitatea de picături de care aveți nevoie pentru doza dumneavoastră.

† Nu folosiți niciodată acid ascorbic sau acid fluorhidric; deoarece acidul ascorbic va neutraliza MMS și acidul fluorhidric este extrem de otrăvitor.

† Pe parcursul acestei cărți vă sugerăm să utilizați 50% acid citric ca activator. Acest lucru a fost folosit de ani de zile cu succes în formulele MMS. Cu toate acestea, există unii care folosesc 33% sau 35% acid citric. Disponibilitatea în diferite procente variază de la țară la țară. Aceste procente sunt, de asemenea, acceptabile

*de utilizat pentru amestecarea unei doze de MMS1. La aceste procente (33% și 35% acid citric), utilizați, de asemenea, un raport de scădere 1 la 1 cu MMS și așteptați 30 de secunde pentru timpul de activare.*

## **Amestecarea unei doze de bază de MMS1**

Diverse protocoale sunt discutate în această carte. Acestea utilizează un număr diferit de picături în funcție de mai mulți factori. Aici vom discuta doar despre conceptul de bază al mixării.

### **Pasul 1**

- q Folosiți întotdeauna un pahar gol, curat, uscat și de băut.
- q Înclinați ușor paharul și lăsați picăturile de MMS, astfel încât acestea să ajungă în colțul părții inferioare a paharului. Țineți întotdeauna flaconul cu picurător sau pipeta (picurătorul de ochi) drept în sus și în jos atunci când scăpați picăturile.
- q Dacă utilizați o soluție 50% de acid citric sau 4% soluție de HCl, adăugați aceeași cantitate de activator deasupra picăturilor MMS. (Pentru fiecare picătură de MMS adăugați 1 picătură de acid.)

### **Pasul 2**


- q Rotiți picăturile puțin pe măsură ce numărați până la 30 de secunde; în acest interval de timp, amestecul ar trebui să devină de culoare chihlimbar.

### **Pasul 3**

- q Apoi adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă potabilă sau suc sau alt lichid conform instrucțiunilor de la paginile 41-45.
- q Bea doza în timp ce este proaspătă, în mai puțin de un minut.



## Amestecarea unei doze de bază de MMS1



**Ai grija:** Este posibil ca unele dioxid de clor gazos să scape atunci când MMS și activatorul sunt amestecate și nu se află într-un recipient sigilat. Cel mai bine este să evitați să obțineți un miros direct. Nu amestecați doza direct sub nas sau gură. Există momente în care este necesară respirația gazului în cantități mici și poate fi foarte vindecătoare pentru plămâni și sinusuri, dar evitați acest lucru, cu excepția cazului în care vă aflați sub un protocol specific care o solicită și știți ce faceți (deoarece este ușor a inhala prea mult).

## Doze orare

Când am scris prima mea carte, am instruit oamenii să lucreze până la 3 doze mari de MMS1 în fiecare zi. Dacă ați citit prima mea carte sau oricare dintre site-urile aleatorii care au publicat informații din acea carte și, din păcate, nu au actualizat-o, atunci este timpul să învățați ceva nou. La început, când am sugerat doza mai mare, am avut întotdeauna oameni să lucreze până la el câte puțin. Pe atunci, sugestia a fost de a lucra până la o doză de 15 picături luate de 3 ori pe zi.

Dezavantajul vechii metode era că mulți oameni aveau o reacție Herxheimer destul de puternică. S-ar simți mult mai rău înainte de a se îmbunătăți. Cu timpul și cu mai multă experiență, am început să realizez că administrarea de doze mai mici de MMS1 mai des pe parcursul zilei a adus rezultate mai bune. Poate că cel mai important motiv pentru aceasta este că MMS1 durează în sistem doar o oră, posibil cel mult o oră și jumătate. Așadar, este imperativ să păstrați MMS1 în funcțiune în fiecare oră. În acest fel, MMS1 lovește agenții patogeni în mod continuu

și nu permite timp agenților patogeni să se regroupeze și să se reconstruiască. În schimb, fiind lovite constant fără șansa de a se regrupa, mor. Această nouă metodă funcționează și vedem în mod clar rezultate pozitive.

În 2009, am fost în Malawi, o țară mică din sud-estul Africii. În timp ce eram acolo, 800 de cazuri de HIV / SIDA mi-au venit. Acești oameni au luat doar 3 picături de MMS1 în fiecare oră, timp de opt ore pe zi, timp de trei săptămâni. Ghici ce? Dozele de 3 picături, luate opt ore pe zi timp de 21 de zile, au fost eficiente la 99% în eradicarea HIV / SIDA. Au fost doar cinci eșecuri din cele 800 de cazuri, iar din aceste cinci instrucțiuni nu au fost respectate în mod corespunzător într-un fel sau altul.

De atunci, sute de mii de oameni au luat doze de 3 picături pe oră și și-au recuperat sănătatea. Această schimbare la doze orare mai mici, spre deosebire de doze mari mai rar, reprezintă probabil cea mai mare dezvoltare din instrucțiunile anterioare.

Pentru a rezuma, după ani de experiență, am aflat că majoritatea bolilor (altele decât malaria) sunt substanțial mai receptive la dozele orare de MMS1, răspândite pe o perioadă de opt până la zece ore zilnic. Acest lucru este mai eficient decât 1, 2 sau 3 doze mari pe zi. Acest lucru este valabil pentru cancer și pentru majoritatea bolilor. Oamenii au folosit protocoale orare în ultimii ani cu succes uimitor. Există câteva alte excepții de la regula dozei orare, altele decât malaria, cum ar fi Protocolul 6 și 6 (vezi pagina 169) și unele dintre Protocoalele de urgență (vezi Capitolul 12).

Deci, pentru a reitera: Vă rugăm să nu urmați instrucțiunile care vorbesc despre 3 doze mari de câte 15 picături. (Cu excepția cazului în care este o excepție de la regulă, așa cum s-a menționat mai sus.)

## **Importanța dozelor consecutive**

Fiți sânguincioși pentru a vă lua doza consecutiv la fiecare oră pe oră. De exemplu, în timp ce utilizați un protocol de opt ore, nu vă rupeți orele de dozare, cum ar fi patru ore în

dimineața, apoi o pauză de trei ore, apoi încă patru ore mai târziu în timpul zilei.

Un principiu fundamental al MMS este acela că lovirea agenților patogeni la fiecare oră nu le oferă agenților patogeni timp de regrupare și reconstruire, dar, în schimb, fiind loviți constant fără șansa de a se regrupa, aceștia mor.

## **Sticlă cu doză zilnică**

În ultimii ani am învățat utilizarea unei sticle cu doză zilnică. Principala sursă de inspirație pentru această sticlă a fost aceea de a ajuta persoanele să ia doza orară. Cu toate acestea, de atunci am ajuns la concluzia că beneficiul maxim de la administrarea MMS1 se obține atunci când fiecare doză orară este completată proaspătă. Acest fenomen a fost observat pentru prima dată la mii de copii autiști care au folosit sticla cu doză zilnică pentru o perioadă amplă de timp. Apoi, când copiii au fost trecuți la doze alcătuite individual și proaspete în fiecare oră, au fost raportate mai multe îmbunătățiri decât atunci când dozele lor au fost amestecate într-o sticlă pentru întreaga zi.

În cei 20 de ani de muncă cu MMS și ajutând personal mii de oameni, am observat rezultate generale mai bune în recuperarea sănătății atunci când au fost utilizate doze proaspete mixte de MMS1. În plus, miniștrii foarte activi ai

Sănătății din întreaga lume care lucrează pe scară largă cu MMS și cu un număr mare de oameni (cu mii), au raportat, de asemenea, aceleași rezultate.

Dacă din diverse motive nu există altă opțiune decât să compuneți un amestec pe tot parcursul zilei, în loc să amestecați fiecare doză proaspătă la fiecare oră, merită cu siguranță și mai bine decât să nu luați deloc MMS. Dar recomandarea mea este, dacă

pe cât posibil, rămâneți la amestecarea dozelor orare proaspete. Veți avea șanse mai mari de a vă face bine mult mai repede.

**Notă:** *O sticlă cu doză zilnică implică amestecarea tuturor MMS1 doze pentru o zi într-o sticlă din care beți o anumită cantitate în fiecare oră. De exemplu, dacă ați participat la Protocolul 1000, este necesar să luați o doză de 3 picături de MMS1 (3 picături este maximul - începeți cu mai puțin), la fiecare oră timp de opt ore consecutive. Dacă faceți o sticlă zilnică, veți activa 24 de picături de MMS și adăugați picăturile într-o sticlă de 1 litru / litru de apă purificată. Dacă beți 4 uncii din sticlă, ați avea o doză de 3 picături.*

Pot exista numeroase motive pentru care a face o doză orară nouă de MMS1 poate părea dificilă și nu este posibilă. Poate că cineva are o slujbă în care conduc mult. Nu este ușor să amestecați o doză în timp ce conduceți și nici nu o recomand. Am constatat, totuși, prin primirea de feedback substanțial de la oameni din întreaga lume, că acolo unde există voință, există o cale. Luați în considerare faptul că sănătatea dvs. merită efortul de a găsi o modalitate de a vă amesteca dozele orare. Poate fi la fel de simplu ca și purtarea sticlelor MMS și a acidului activator într-o pungă Ziploc.

## **sfaturi**

† Când sunteți în deplasare, vă recomandăm să aveți sticle mici de 1/2 uncie (15 ml) de MMS și activator de acid pe care să le purtați în geantă sau în buzunar. (Acestea pot fi reumplute atunci când este necesar din sticlele mai mari de acasă.)



† Dacă sunteți în deplasare și vă aflați în birou, în mașină, întruniri, blocate în trafic și așa mai departe, achiziționați o pungă portabilă mică sau o pungă de prânz pentru a vă menține consumabilele MMS la îndemână și gata să mergeți împreună în orice moment poate fi de ajutor. Tot ce aveți nevoie sunt sticlele dvs. de MMS și activator de acid, un pahar mic de 4 uncii / 120 ml și o sticlă sau două de apă purificată. Ca o regula,

Nu recomand să vă amestecați și să beți dozele în pahare de plastic, este preferat paharul. Dar dacă sunteți în mișcare, poate fi convenabil să luați pahare mici de plastic de unică folosință, de 4 uncii / 120 ml. Nu ar fi ceea ce folosești tot timpul, dar atunci când ești în deplasare, ar putea fi util.

† Dacă și când nu este încă convenabil să faceți toate cele de mai sus și vă aflați în situații în care oprirea pentru a vă amesteca doza nu este posibilă, o alternativă la cedarea utilizării unei sticle de doză toată ziua ca regulă, mai degrabă decât la excepție, ar fi să amestecați în prealabil numai dozele pentru orele în care nu există altă alegere.

De exemplu, spuneți că sunteți profesor și că trebuie să stați în fața clasei timp de două sau trei ore. Știți din timp că nu vă puteți scuza să mergeți să amestecați o doză în acel timp. În acest caz, amestecați în prealabil 2 sau 3 doze într-o sticlă. Beți-vă doza orară din sticla respectivă în timpul în care nu puteți scăpa pentru a amesteca o doză proaspătă. În aproape orice situație este acceptabil să aveți la îndemână o sticlă de apă. Apoi, când este posibil, reveniți la amestecarea dozelor orare proaspete. Acest lucru vă ajută să puteți continua cu doze orare consecutive, fără a întrerupe ciclul de 8 sau 10 ore al protocoalelor. Toate dozele de MMS1 sunt luate de obicei în 120 ml apă (sau alt lichid compatibil). Încercați să găsiți sticle de 4 uncii / 120 ml și amestecați în prealabil cantitatea de doze de care aveți nevoie, în sticle individuale. Sau, dacă știți că aveți nevoie de doze pre-amestecate în valoare de două ore, ar face o sticlă de 8 uncii / 240 ml sau timp de trei ore o sticlă de 12 uncii / 360 ml. Poate doriți să utilizați un stilou de marcat de neșters pentru a vă marca sticla în secțiuni de 4 uncii / 120 ml. Găsiți ce funcționează cel mai bine pentru dvs.

Această metodă este o combinație a flaconului pentru doze prefabricate și amestecarea dozelor orare proaspete. Nu uitați, dozele mixte proaspete sunt cele mai bune, dar recurgeți la această combinație a celor două - doze proaspete și doze preparate din timp

Într-o sticlă, când nu există altă alegere. Este important să țineți pasul cu dozele orare consecutive.

### **Cum să testați dacă MMS-ul dvs. este bun**

Când activați MMS, este foarte important ca picăturile de MMS și activator să devină de culoare chihlimbar în primele 30 de secunde. În această carte, când spunem chihlimbar, ne referim la o culoare maro. Acest lucru poate fi de oriunde de la maro deschis la maro închis, dar nu galben. Culoarea chihlimbar a picăturilor activate MMS înainte de a adăuga apă, seamănă mult cu culoarea unei sticle de chihlimbar de sticlă (cum ar fi folosită pentru uleiuri esențiale, diverse poțiuni medicinale sau pentru sticle de bere), atunci când este ținută la lumină.

Amestecați o doză de 3 picături de MMS1 pentru a face acest test, dacă utilizați mai puține picături va fi dificil să judecați în mod adecvat culoarea. Cel mai bine este să efectuați acest test într-o cameră cu iluminare bună. Când v-ați amestecat picăturile (înainte de a adăuga apă), țineți paharul în sus pe un fundal alb sau deschis la culoare și priviți prin partea și fundul paharului (unde sunt picăturile dvs.) cu nivelul paharului cu ochii; în acest unghi veți privi prin amestecul de picături. Dacă priviți în jos în sticlă, picăturile vor arăta de multe ori galben mai deschis, dar dacă vedeți picăturile la nivelul ochilor (cu iluminare bună) ar trebui să vedeți o nuanță mai închisă - adică chihlimbar. Deși devine întunecat, trebuie să fie și transparent (transparent). Picăturile trebuie să apară de culoare chihlimbar. Culoarea chihlimbar se va estompa și va deveni galben deschis în aproximativ 15 minute.

Culoarea chihlimbarului este un indicator important al faptului că amestecul de picături este corect. Amestecați două lichide clare, MMS și un activator. Dacă lichidele sunt amestecate conform instrucțiunilor, acestea vor schimba culoarea și vor deveni chihlimbar. Această culoare chihlimbar indică faptul că aveți lichidele corecte

și un amestec corect. Foarte puține două lichide limpezi pot produce aceeași culoare.

Dacă picăturile nu devin chihlimbar în primele 30 de secunde de la amestecare, ceva nu este în regulă cu MMS-ul și / sau cu acidul dvs. și este posibil ca acest amestec să nu aducă rezultatele dorite. S-ar putea să încercați să mai amestecați o doză încă o dată, pentru a fi sigur că ați făcut-o corect, dar dacă totuși aveți culoare galben deschis și nu de culoare chihlimbar, puteți utiliza acele picături pentru moment, în timp ce încercați să obțineți MMS-uri bune și activator acid. Dar aș sugera să nu utilizați această soluție (galben deschis, nu chihlimbar, picături) mai mult de o săptămână sau cam așa ceva. Dacă soluția nu devine cel puțin galbenă, nu o utilizați deloc.

Diferenți factori pot influența culoarea picăturilor, cum ar fi tipul de sticlă pe care îl utilizați, asigurându-vă că sticla este complet uscată pentru a începe, numărul de picături pe care le amestecați, culoarea de fundal a peretelui, timpul a zilei și câtă lumină naturală este în cameră și așa mai departe. Dacă nu obțineți culoarea potrivită și sunteți sigur că ați urmat corect instrucțiunile, încercați să amestecați picăturile de câteva ori în condiții diferite. De exemplu, utilizați un pahar diferit (unele calități ale sticlei distorsionează) asigurați-vă că paharul este suficient de curat - fără depuneri de săpun de vase. Țineți picăturile în sus pe un perete alb, un frigider alb sau un fundal deschis atunci când testați culoarea. Dacă aveți dubii despre culoare, amestecați o doză de 6 picături atunci când testați. Testați-vă picăturile în diferite condiții, înainte de a determina că picăturile sunt insuficiente.

**Notă:** Dacă utilizați un acid alternativ, cum ar fi lămâia, var sau oțet la un raport de picături de 1 la 5 cu MMS, picăturile dvs. nu vor deveni chihlimbar. În acest caz, dacă doriți să testați dacă MMS este bun, amestecați o doză de 3 picături de MMS1 (ar fi 3 picături de MMS și 15 picături de lămâie, lime sau oțet) și așteptați trei minute. Apoi adauga

*1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă și testați ppm, care ar trebui să fie de 25 ppm. (Pentru testarea ppm, vezi pagina 278.)*

### **Apă - Lichidul ideal pentru amestecarea unei doze MMS1**

† Ideal este să vă luați doza de MMS1 numai în apă. Dozele de MMS1 trebuie luate în 1/2 cană de apă (adică 120 ml) sau apă minerală. De obicei, copiii au nevoie de mai puțin de o jumătate de cană de apă. Când un copil ia 1 picătură de MMS1 sau mai puțin, el ar trebui să folosească 1/4 cană de lichid.

† MMS1 trebuie administrat în apă potabilă (purificată) - niciodată apă de la robinet care are clor, fluor sau alte toxine adăugate, deoarece acestea vor anula eficacitatea MMS1 și chiar vă vor îmbolnăvi. De obicei, cel mai bine este să cumpărați apă îmbuteliată. Rețineți că toată apa îmbuteliată nu este creată la fel. Nu presupuneți automat doar pentru că este îmbuteliat, este mai sigur, mai curat sau mai pur decât apa de la robinet. Unele ape îmbuteliate conțin fluor, clor sau alte substanțe nocive. Deci, verificați sursa de apă. Citiți etichetele și / sau consultați producătorii pentru a afla ce obțineți. Se poate folosi și apă distilată sau apă cu osmoză inversă.

**Prudență:** Rețineți că majoritatea locurilor din lume folosesc o formă toxică de clor ca purificator de apă. Chiar și mai rău de atât, multe locuri adaugă fluor extrem de otrăvitor în apă, din păcate, în urmă cu aproximativ 50 de ani, medicii au convins publicul că fluorura ajută dinții. Fluorul este una dintre cele mai otrăvitoare substanțe chimice cunoscute de om. Nu există dovezi că ajută dinții cuiva și există sute de mii de adolescenți care au dinți cu pete ca urmare. Folosiți



o apă potabilă îmbuteliată de bună calitate pentru aceste protocoale, cu excepția cazului în care obțineți apă dintr-un izvor sau fântână de apă pură sau dacă aveți un filtru de apă cu osmoză inversă. Se poate folosi și apă distilată.

## **Factor de gust / Cum se poate îmbunătăți gustul MMS1**

† De ce dozele MMS1 au un gust extrem de rău pentru unii oameni? Am observat că unii oameni dezvoltă o repulsie extremă față de administrarea MMS1 la un moment dat sau altul în timp ce utilizează un protocol MMS. Uneori devine atât de rău încât oamenii pur și simplu nu mai suportă. Cred că poate exista o explicație. Eventual agenții patogeni creează aversiunea față de MMS1 ca mecanism de supraviețuire pentru agenții patogeni pentru a împiedica persoana implicată să continue să ia orice ar putea să-i distrugă. În orice caz, dacă vi se întâmplă acest lucru, merită să faceți tot ce puteți pentru a încerca să depășiți aversiunea de a lua MMS1. Încercarea de a păstra o atitudine pozitivă vă poate ajuta, apoi încercați unul sau câteva dintre lucrurile menționate mai jos pentru a ajuta la depășirea problemei gustului.

† Mulți oameni sunt de acord că dozele de MMS1 activate cu 4% HCl (acid clorhidric) au un gust mai bun decât cele activate cu 50% acid citric. Dacă utilizați acid citric și gustul este deranjant, încercați să treceți la HCl. Este într-adevăr o chestiune personală - vezi ce funcționează cel mai bine pentru tine.

† Deși apa este ideală, dacă nu puteți lua MMS1 numai cu apă, deoarece gustul vă deranjează, unele sucuri naturale (nu toate) sunt OK de utilizat dacă nu au conservanți dăunători și / sau au adăugat vitamina C sau acid ascorbic, ca aceasta va anula eficacitatea MMS1. Sucul proaspăt este cel mai bun. Am găsit suc de mere, struguri și afine care funcționează bine cu MMS1, dar din nou, ar trebui să fie natural, fără conservanți și să nu aibă vitamina C (sau acid ascorbic) adăugat. Nu folosiți niciodată suc de portocale sau mandarine sub nici o formă cu MMS1. Este posibil să aveți

aceste sucuri cu cel puțin două ore înainte sau după protocolul MMS1 pentru ziua respectivă.

† Multe ceaiuri nu sunt compatibile cu MMS. Cu toate acestea, există unele ceaiuri de plante care sunt compatibile. Acest lucru poate varia în funcție de ce ceai folosiți, adică de cel proaspăt

*ierburi* sau o pungă de ceai care este posibil legată de un contaminant de vreun fel. Utilizați metoda de testare descrisă la pagina 278 pentru a vă asigura că este compatibil.

† Unele băuturi răcoritoare funcționează bine cu MMS1: Coca-Cola, Pepsi, Sprite, 7-Up și Canada Dry Ginger Ale (utilizați doar formulele originale; nu utilizați Diet Soda sau „Light” sau „Zero”). Nu vă recomandăm să utilizați aceste băuturi pe termen lung sau pentru Protocolul 1000 (datorită conținutului de zahăr), deoarece veți bea acest lucru de 8 ori pe zi. Aș sugera apa minerală cu gaze ca o alegere mai bună, deoarece nu conține zahăr. Cu toate acestea, dacă gustul este o problemă, pentru cineva care este grav bolnav, este mai bine să luați o doză de MMS1 în sifon decât să nu o luați deloc. Puteți amesteca doza într-o cană de 4 uncii / 120 ml și puteți adăuga 1 uncie de Pepsi, de exemplu, și apa restantă - care poate fi suficientă sifon pentru a acoperi doar gustul MMS. Dar, în multe cazuri, numai apa minerală (fără gaze și fără zahăr) ajută la depășirea gustului.

**Notă:** *Deși am testat personal aceste băuturi cu MMS de multe ori, mi-a fost adus la cunoștință faptul că companiile de sifon tind să își ajusteze formulele din când în când și adesea diferă de la țară la țară. Cel mai sigur mod de a ști dacă băutura dvs. este compatibilă cu MMS1 este să testați băutura cu o bandă de testare a dioxidului de clor. (Consultați pagina 278 pentru mai multe informații despre aceste benzi de testare produse de Compania LaMotte și despre cum să le utilizați pentru a testa compatibilitatea cu MMS1 și diverse lichide.) Dacă benzile de testare nu sunt disponibile și o persoană este în protocol folosind o anumită băutură răcoritoare sau suc îmbuteliat ca mixer, dar fără a obține rezultate după cinci sau șase zile, vă recomand cu tărie să treceți la un alt lichid pentru a vă bea doza.*

† Mirosul poate avea un impact imens asupra gustului. Dacă observați că nu vă puteți simți gustul MMS1, încercați să schimbați modul în care beți doza. Unii oameni își țin de fapt nasul în timp ce își beau doza. O sticlă sau un pahar cu gură mică, spre deosebire de o gură largă, poate face minuni. Folosind

o sticlă cu gură mică nu permite nasului să se afle în recipientul care degajează dioxidul de clor ( $\text{ClO}_2$ ). Paharele și sticlele sunt de toate formele și dimensiunile. Fii inventiv! Fiți atenți - o sticlă sau un borcan gol din alt produs ar putea să vă servească bine. Căutați ce funcționează perfect pentru dvs.

† Dacă doriți să vă despărțiți și să folosiți diverse sucuri sau băuturi răcoritoare, altele decât cele menționate în această carte, pentru a le amesteca cu MMS1, de regulă este o idee bună să testați compatibilitatea cu MMS. Utilizați banda de testare menționată anterior în această secțiune (consultați instrucțiunile de la pagina 278).

† Unii oameni au sugerat utilizarea steviei pentru a îmbunătăți gustul băuturilor lor MMS1. Am constatat că calitatea steviei variază. Unele sunt foarte procesate, iar unele mărci / tipuri anulează eficacitatea MMS1. Dacă doriți să utilizați stevia, vă sugerez să utilizați benzi de testare (a se vedea pagina 278) pentru a confirma dacă tipul pe care îl utilizați este compatibil cu MMS1. (O companie numită SweetLeaf® produce stevia lichidă și SteviaClear netedă, fără aromă® picăturile sunt compatibile cu MMS1. Dacă doriți să folosiți diferitele arome ale SweetLeaf® stevia, din nou, utilizați benzile de testare pentru a vă asigura că este compatibil cu MMS1 - compatibilitatea poate varia de la aromă la aromă.)

† Personal, am făcut un vas de apă cu apă purificată și puțină miere și am păstrat-o în frigider pentru a se amesteca cu băuturi MMS1 pe tot parcursul zilei. Acest lucru a ajutat gustul pe placul unora. Cu toate acestea, vă sugerez, deoarece există multe calități și tipuri diferite de miere (și unele miere este destul de adulterată) că, din

nou, cel mai sigur lucru de făcut ar fi să vă testați băutura cu apă de miere. Utilizați metoda benzii de testare, pentru a vă asigura că tipul de miere pe care îl utilizați este compatibil cu MMS1.

† O altă modalitate de a îmbunătăți gustul unei doze MMS1 este de a folosi apă rece în fiecare doză. Pur și simplu păstrați o sticlă de apă purificată în frigider în acest scop.

† Orice ați alege să amestecați cu MMS1, încercați să-l beți imediat, astfel încât să nu treacă mai mult de 60 de secunde de la momentul în care ați început să amestecați.

### **MMS1 într-o capsulă (pentru a elimina gustul)**

O altă metodă de administrare a picăturilor MMS1 care ajută la eliminarea gustului este utilizarea capsulelor vegetale sau gel.

#### **Pasul 1**

q Aveți la îndemână bunurile. Pentru această metodă, veți avea nevoie de capsule goale și un picurător de ochi în plus față de picături și de un pahar curat și uscat pentru a le activa. De asemenea, veți avea nevoie de apă potabilă în apropiere pentru a vă putea lua capsula imediat după ce a fost făcută. Consultați graficul de la pagina 46 pentru dimensiunea adecvată a capsulelor de utilizat pentru doza pe care o luați.

#### **Pasul 2**



- q Activați cantitatea corectă de picături pentru doza dumneavoastră într-un pahar și numărați 30 de secunde.
- q Luați imediat picurătorul de ochi, aspirați picăturile activate din pahar și puneți-le cu grijă în capsulă.
- q Împingeți capacul capsulei închis și verificați dacă este bine fixat.

### Pasul 3

- q Luați capsula cu cel puțin 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă imediat. Nu așteptați după umplerea capsulei, deoarece picăturile vor începe să se topească.


### Note

† **Nu activați MMS în capsulă.** Presiunea generată în interiorul micului spațiu al capsulei în timpul procesului de activare ar putea determina separarea capsulei pe măsură ce o înghițiți. Deci, asigurați-vă că activați întotdeauna picăturile într-un pahar curat și contați 30 de secunde înainte de a introduce picăturile activate în capsulă.

† Dimensiunea capsulei de care veți avea nevoie depinde de doza de mărime pe care doriți să o luați. (A se vedea graficul de mai jos.) Rețineți că, dacă pregătiți o doză de 3 picături pentru a fi introdusă într-o capsulă, aceasta va fi de fapt de două ori mai multe picături, deoarece fiecare doză trebuie activată cu picături egale de 50% picături de acid citric. sau 4% picături de HCl.

MMS1 Capsule Size and Dosage	
Dimensiunea capsulei	Picături totale

<b>Mărimea 4: deține o doză de 3 picături</b>	<b>total 6 picături</b>
<b>Dimensiunea 3: deține o doză de 4 picături</b>	<b>total 8 picături</b>
<b>Mărimea 2: deține o doză de 5 picături</b>	<b>total 10 picături</b>
<b>Mărimea 1: deține o doză de 6 picături</b>	<b>total 12 picături</b>
<b>Mărimea 0: deține o doză de 7 picături</b>	<b>total 14 picături</b>



† *Rețineți că, pe măsură ce numărul capsulei devine mai mic, capsulele sunt de fapt mai mari. Dacă este posibil, utilizați o dimensiune a capsulei cea mai apropiată de doză pe care urmează să o luați. Puteți utiliza o capsulă de dimensiunea # 0 (dimensiunea mare) pentru a lua orice doză de dimensiune, dar mulți oameni nu pot înghiți cu ușurință # 0 capsule. Folosirea capsulei de mărime care corespunde cantității de picături din doză este cea mai bună.*

† *Dacă aveți probleme cu înghițirea capsulelor sau pastilelor, atunci această metodă nu este probabil o idee bună pentru dvs. De asemenea, nu este recomandat copiilor mici.*

### **Pur și simplu nu mai pot lua o picătură**

Aici aș dori să abordez un scenariu când cineva simte că nu mai poate lua încă o picătură de MMS. Poate că sunt în protocol de ceva timp și ajung la un punct în care nu se simt atât de grozav (acest lucru este probabil pentru că un val de toxine este eliberat în corp și provoacă o senzație de rău). Sau, poate, nu luau MMS1, dar se îmbolnăvesc dintr-un motiv sau altul și se simt atât de rău încât pur și simplu nu simt că pot suferi MMS1.

Există un proces important în joc aici, pe care l-am observat în ultimii 20 de ani, și anume, că corpul cuiva poate dezvolta o repulsie la MMS care depășește cu mult prostul gust. Am văzut-o de nenumărate ori. Cred că este creat de agenții patogeni. Gândiți-vă la acesta ca la un tip de mecanism de supraviețuire care protejează boala. Când boala simte că ceva pe care persoana îl mănâncă sau îl ia poate să-l distrugă, boala însăși va emite un semnal care creează o respingere în

interiorul persoanei asupra substanței care o va afecta (în acest caz, MMS1). Această repulsie poate apărea atunci când persoana se gândește la administrarea MMS1. Când se întâmplă acest lucru, ce pot face?

Dacă sunteți bolnav la pat și vă simțiți destul de rău sau dacă situația se dezvoltă în timp ce luați MMS1 și ajungeți într-un punct în care nu mai puteți suporta ideea de a mai lua o picătură - următoarea procedură vă poate fi de ajutor.

Principiul aici este că nu doriți să încetați să luați MMS1 împreună. Chiar și ceea ce pare a fi o cantitate foarte, foarte mică de MMS1 administrat pe oră poate contribui la eliminarea organismului de agenți patogeni și la recuperarea sănătății. Pentru a „gestiona” MMS1, pentru o perioadă de timp, poate fi necesar să vă reduceți doza la mai puțin de 1 picătură pe oră. Unii au fost nevoiți să-și reducă aportul la 1/2 picătură, 1/4 picătură, 1/8 picătură și, în cazuri extreme, la 1/16 picătură pe oră. Ideea este - nu renunța! Chiar și o mică cantitate de MMS pe oră vă poate ajuta corpul să depășească problema.

## **Instrucțiuni**

### **Pasul 1**

- q Vă rugăm să consultați procedura de pornire (vezi pagina 79) pentru instrucțiuni despre cum să preparați o doză de 1/4 picături. După ce ați pregătit o doză de 1/4 picături, puteți lua 1/2 din ea pentru a face o doză de 1/8 picături. Sau luați 1/4 din doza de 1/4 picături pentru a face o doză de 1/16 picături. Pregătiți și luați orice doză mică ați ales timp de câteva ore, sau o zi sau două.

### **Pasul 2**

- q Odată ce luați confortabil cantitatea mică, începeți să creșteți încet doza orară. Creșteți încet într-un ritm cu care vă simțiți confortabil.
- q Continuați să creșteți lent sau rămâneți scăzut. Unii oameni vor putea obține până la o doză de 1/4 picătură și apoi vor continua

pentru a le mări dozarea constant. Dar există unii care, din diverse motive, nu pot crește aportul de MMS dincolo de o cantitate destul de mică, totuși sunt capabili să se descurce cu o doză mică. Acest lucru este explicat mai detaliat în capitolul 5, Planul de recuperare a sănătății (HRP) și în capitolul 6, Protocoalele cheie.

**Notă:** *Dacă nu ați fost pe un protocol și nu ați făcut-o ați luat deja DMSO, dar v-ați îmbolnăvit suficient pentru a vă afla în pat și vă simțiți destul de prost, nu încercați să utilizați DMSO cu MMS1 în acest moment, cu excepția cazului în care ați folosit deja DMSO într-un protocol pe care îl faceți. (Când vă simțiți atât de rău că nu doriți să luați nimic, cel mai bine este să respectați încercarea de a lua câte un lucru pe rând. DMSO adăugat la MMS1 pe care faceți un efort să îl luați ca atare, s-ar putea adăuga la dificultate. Încercați să vă acumulați rezistența la administrarea MMS1 mai întâi, înainte de a adăuga DMSO.) Nu încercați să utilizați DMSO atunci când luați mai puțin de 1 picătură.*

## Stocarea MMS

Cel mai bun mod de a păstra MMS (22,4% clorit de sodiu în apă) este în sticle de chihlimbar sau sticlă verde, cu un capac etanș din plastic (nu metalic) și la frigider. Acesta este idealul, dar nu este întotdeauna posibil. Dacă sticlele de chihlimbar sau sticlă verde nu sunt disponibile, o sticlă clară va face, dar încercați să o păstrați la lumină (un frigider este întunecat când este închis). Un loc întunecat și răcoros va fi suficient dacă spațiul frigider nu este disponibil. Dacă sticlele de sticlă nu sunt disponibile, sticlele din plastic cu capac din plastic vor fi valabile, dar



Încercați să găsiți sticle cu numărul 1 sau 2 în interiorul unui triunghi pe fundul sticlei. Aceasta înseamnă un plastic de o calitate mai bună. (Plasticul clasificat cu # 3 în triunghi nu este recomandat.) Folosiți sticle cu capac din plastic, deoarece cloritul de sodiu (și dioxidul de clor, de asemenea) vor dizolva în cele din urmă un capac metalic.

## **Simtindu-se bolnav**

Dacă apare greață, vărsături, diaree sau oboseală excesivă în timpul tratamentului cu MMS1, (vezi reacția Herxheimer la pagina 6) reduceți imediat doza la jumătate, dar nu încetați să luați MMS1, cu excepția cazului în care simptomele sunt prea mari pentru a fi tratate. În acest caz, opriți-vă cu totul până când starea este eliminată. Odată ce simptomele s-au eliminat, începeți din nou la jumătate din cantitatea pe care o luați înainte de apariția simptomelor. Dacă reduceți cantitatea cu o jumătate și reacțiile menționate mai sus continuă, reduceți cu încă o jumătate. Reduceți aportul de MMS1 în trepte până când găsiți cantitatea pe care o puteți lua fără a provoca boală de la MMS1. Chiar și o cantitate foarte mică de MMS1 pe oră vă va ajuta, așa că ideea este să încercați să nu renunțați la toate împreună, dacă este posibil. Când găsiți o cantitate confortabilă de MMS1 pe care o puteți tolera,

**Notă:** Dacă utilizați 50% acid citric și vă confrunțați cu sentimente de rău, încercați în schimb 4% HCl. Unii oameni nu pot tolera acidul citric.

## **Femeile gravide și MMS**

Mii de femei gravide au folosit MMS1 pentru a-și stoca sănătatea la nevoie. Doza pentru o femeie însărcinată este exact aceeași ca atunci când nu este însărcinată. Urmați protocoalele și determinați ce doză este cea mai bună pentru dvs. MMS1, administrat conform protocoalelor din această carte, nu dăunează organismului și, prin urmare, poate fi considerat sigur pentru toate persoanele, inclusiv femeile însărcinate, copiii și bebelușii.

(Urmați dozele adecvate pentru copii și bebeluși, așa cum sunt enumerate în această carte - vezi Capitolul 13.) Toată lumea este responsabilă de luarea propriilor decizii de sănătate. Dacă doriți, consultați un profesionist educat din domeniul sănătății.

## **Mâncare în timp ce pe protocoale MMS**

Dozele de MMS1 nu trebuie administrate la masa. În timp ce utilizați protocoalele, cel mai bine este să vă planificați mesele în jurul dozării. Distanțați doza MMS1 și mesele cu 20 până la 30 de minute de la momentul administrării dozei. De exemplu, dacă luați doza MMS1 la 8:00, micul dejun ar putea fi între 8: 20-8: 30 și următoarea doză la 9:00. Micul dejun ar trebui să fie relativ simplu și mic și să nu mănânce mai mult de 10-15 minute. La fel, dacă luați o doză MMS1 la ora 12, prânzul ar putea fi la 12:30 și așa mai departe.

În timpul orelor de protocol, cel mai bine este să încercați să mâncați mese mai mici și / sau gustări, spre deosebire de mesele foarte mari. (Nu mă înțelegeți greșit, puteți mânca în timp ce luați MMS1, evitați doar mesele mai mari în timpul orelor în care luați dozele.) Există o varietate de moduri în care se poate face acest lucru - ajustați-vă în funcție de rutina zilnică. De exemplu, dacă începeți protocolul destul de devreme dimineața, să zicem la 8:00, opt ore mai târziu ar fi ora 15:00, care ar fi momentul ultimei doze. Dacă ați luat mese sau gustări mai mici în această perioadă de dozare de opt ore și ați terminat ultima doză la 15:00, aceasta înseamnă că până la 17:00 sau mai târziu, ați putea lua masa mai mare din zi.

Unii oameni preferă să înceapă administrarea mai târziu în timpul zilei, astfel încât să fie liberi dimineața să bea suc de portocale sau ceașca lor de cafea sau ceai (vezi pagina 56 pentru mai multe informații). De exemplu, dacă o persoană începe administrarea la ora 15:00, ultima doză ar fi la ora 22:00, dacă se utilizează protocolul de opt ore. Aceasta înseamnă că înainte de ora 13:00 își pot lua cafeaua, ceaiul sau sucul de portocale - lucruri care nu sunt compatibile cu MMS1 și

MMS2 - cu cel puțin două ore înainte de a începe protocolul. Ideea este să vă ajustați dozarea pentru a se potrivi nevoilor și programului dvs. Vedeți ce funcționează pentru dvs.

Eficacitatea MMS poate fi anulată atunci când este amestecată cu anumite alimente care sunt deosebit de bogate în antioxidanți. Nu am avut timp sau resurse pentru a face un studiu complet amănunțit al tuturor alimentelor de pe planetă pentru a vedea ce anula efectiv MMS. Chiar dacă aș face-o, există mulți factori care pot influența ecuația dacă un anumit aliment anulează eficacitatea MMS. De exemplu, dacă alimentele sunt OMG, ce pesticide sunt prezente, ce tipuri de aditivi sunt în alimente, care ar putea avea influență, etc. Dacă sunteți foarte bolnav cu o boală care pune viața în pericol, să fiți absolut sigur dacă există ceva în dieta dvs. anulând sau nu MMS, vă pot sugera utilizarea benzilor de test (vezi pagina 278) pentru a testa compatibilitatea MMS cu tot ceea ce mâncați. Acest lucru poate fi sau nu fezabil pentru dvs.

Permiteți-mi să spun că doar pentru că un aliment este etichetat ca fiind antioxidant, s-ar putea să nu fie deosebit de bogat în antioxidanți și, prin urmare, nu este un fapt faptul că va anula în mod necesar MMS. Vom continua să încercăm și să facem mai multe teste pe o gamă largă de alimente pentru a vedea ce este compatibil cu MMS și ce nu. Cu toate acestea, oamenii iau MMS de 20 de ani și își recuperează sănătatea fără a avea atât de multe detalii definite. Această carte vă oferă câteva îndrumări cu privire la ce trebuie să evitați atunci când luați MMS. Nu luați alimente sau suplimente care sunt deosebit de bogate în antioxidanți. Dincolo de asta, ia act de ceea ce funcționează sau nu funcționează pentru tine. Dacă nu pare să obțineți rezultate cu MMS după un timp rezonabil în protocol, aruncați o privire serioasă asupra dietei și vedeți dacă se poate elimina ceva despre care ați putea suspecta că este în conflict cu MMS. Dacă sunteți obișnuiți să mâncați multe articole la o singură

masă, vă recomandăm să mergeți cu un meniu care conține mai puține ingrediente. Urmarea unei diete mono (sau cel puțin a unei diete mono parțiale) în timpul în care vă aflați în protocol poate fi de ajutor.

## A rezuma

- Nu luați o doză de MMS împreună cu mesele, distanțați consumul de alimente și doza de MMS1 cu 20-30 de minute.
- În timpul orelor în care luați efectiv dozele de MMS, încercați să nu mâncați tipuri mari de „sărbătoare”, ci mai degrabă să mâncați mese mai mici și / sau gustări.
- Nu mâncați și nu beți lucruri care neutralizează MMS în timpul orelor de administrare. (Vezi paginile 42-45, 56.)
- Dacă nu pare să ai succes după un timp rezonabil, ia în considerare simplificarea dietei. Încercați să eliminați lucrurile care ar putea fi suspectate de anularea MMS.

## Suplimentele nutriționale și HRP

Există două motive de bază pentru realizarea HRP (Health

Plan de recuperare - vezi Capitolul 5):

1. Pentru a eradica o boală și a vă recupera sănătatea.



**2.**În scopuri de curățare, pentru detoxifiere și, astfel, pentru a scăpa de otrăvurile din organism, care pot ajuta la clarificarea mai multor probleme de sănătate, atât mici, cât și mari.

Dacă aveți o boală de orice fel, decizia este simplă. Ceea ce vrei să faci este să elimini boala.

Când cineva este bolnav și mai ales dacă este grav bolnav, este un moment bun pentru persoana respectivă să se oprească și să examineze diverse lucruri, cum ar fi dieta și stilul de viață. Alimentația corectă, exercitarea dreptului și dreptul la viață contribuie la toate

Sanatate buna. Deși alimentația bună este importantă pentru ca organismul să se vindece, atunci când cineva respectă protocoalele descrise în această carte, poate fi de fapt util să evitați administrarea suplimentelor nutritive pentru o perioadă de timp. Acest lucru se datorează faptului că agenții patogeni se hrănesc, de asemenea, cu o nutriție bună, deci, într-un anumit sens, dacă luați suplimente nutritive în timp ce patogenele sunt încă în viață, vă construiți cu o mână și dărâmați cu cealaltă. În plus, unele suplimente nutritive neutralizează MMS.

Acest lucru este valabil mai ales în cazul cancerului și al mai multor boli majore - când începeți protocoalele, nu este momentul să vă construiți simultan cu o creștere a suplimentelor nutritive suplimentare. În aceste cazuri, aș sugera că este mai bine să renunțați la administrarea suplimentelor timp de două până la trei săptămâni și, eventual, până la câteva săptămâni, în funcție de situație. Pentru că așa cum am spus, celulele canceroase și alți agenți patogeni se pot hrăni cu o nutriție bună. Nu vrei să faci nimic pentru a încuraja cancerul sau alte boli să trăiască mai mult sau să se înmulțească. Ideea este de a muri de foame și de a ucide boala, nu de a-i da mai mult pentru a prospera.

Dacă aveți o boală majoră, așa cum s-a menționat mai sus, suspendați sau nu începeți niciun supliment pe măsură ce începeți să luați MMS - încercați să-i acordați timp pentru a distruge suficient patogene înainte de a adăuga suplimente. Pe de altă parte, dacă simțiți cu adevărat nevoia unui anumit tip de suplimente despre care știți că sunt bune sau ați încercat deja, vă recomandăm să le adăugați la un moment dat (așa cum s-a sugerat mai sus, aș spune că nu înainte de două până la trei săptămâni pentru boli majore) și vedeți cum vă descurcați. Este imperativ să acordați o atenție deosebită

reacției corpului dumneavoastră. Dacă vă simțiți bine și vă descurcați mai bine cu adăugarea unui supliment, continuați. Nu vă schimbați atâta timp cât vă îmbunătățiți. Dar dacă adăugați suplimente (chiar dacă le luați la un moment diferit de dozele MMS) și nu progresați și nu vă faceți bine,

cel mai bine este să suspendați suplimentele din nou pentru o perioadă de timp.

Dacă luați suplimente, este foarte important să le separați de la momentul în care luați dozele de MMS cu cel puțin două ore, sau chiar mai mult dacă puteți. Nu luați niciodată suplimente în același timp în care luați doza de MMS.

Există la fel de multe teorii nutriționale astăzi pe cât există oameni. Dar observațiile noastre indică faptul că cel mai bine este să folosiți MMS pentru a distruge celulele canceroase și bolile, în timp ce nu promovați stimulări nutriționale speciale pentru organism pentru o vreme. Apoi, odată ce boala este eliminată sau redusă foarte mult, se poate construi sistemul imunitar printr-o nutriție bună. Este un proces pas cu pas. Detoxificați mai întâi, înainte de a introduce orice suplimente nutritive și alimente noi.

Dacă nu aveți o boală majoră, dar doriți doar să curățați de diverse toxine și metale grele și să eliminați alte lucruri, cum ar fi probleme ale pielii, articulații dureroase, diverse iritații copleșitoare și o multitudine de alte afecțiuni care nu sunt în mod necesar periculoase pentru viață, atunci puteți începe suplimentarea oricând după prima săptămână sau două din protocol dacă credeți că suplimentele vă vor fi de folos. Dar aceleași principii se aplică, dacă nu credeți că obțineți suficiente beneficii din protocolul dvs. MMS, încercați să suspendați suplimentele pentru o perioadă de timp și să vedeți cum mergeți.

Oricând luați vitamine și suplimente în timp ce administrați MMS, asigurați-vă întotdeauna că separați cu

cel puțin două ore timpurile pe care le luați de momentele în care luați dozele de MMS. Dacă este posibil, luați dozele de MMS în prima parte a zilei. Apoi, când ați finalizat protocolul pentru o zi, la două ore după ultima doză de MMS, începeți să vă luați vitaminele și suplimentele. Aceasta

este de la sine înțeles că, dacă începeți să luați vitamine și suplimente, evitați produsele sintetice și artificiale. Este întotdeauna cel mai bine să încercați să mâncați alimente integrale nutritive.

### **Alimente și băuturi de evitat atunci când utilizați un protocol MMS**

- Când luați MMS1 sau MMS2, evitați alcoolul, ciocolata, cafeaua, cafeaua decofeinizată, băuturile cu cofeină, ceaiul (negru, verde și multe ceaiuri din plante) lapte, apa de cocos, sucul de portocale, sucul de mandarină sau orice băuturi cu vitamina C adăugată (acid ascorbic).
- Nu luați alimente sau suplimente care sunt deosebit de bogate în antioxidanți, cum ar fi moringa, deoarece aceste lucruri anulează eficacitatea MMS. Acest lucru nu înseamnă că nu puteți avea niciunul dintre aceste alimente dacă luați MMS. Cu toate acestea, atunci când utilizați un anumit protocol, este mai bine să așteptați până când terminați dozele de MMS pentru o zi înainte de a consuma articolele de mai sus sau să le luați primul lucru dimineața, apoi așteptați două ore înainte de a începe dozarea MMS. Spaționați-le cu cel puțin două ore după ultima doză zilnică sau cu două ore înainte de a începe administrarea zilnică.
- Dacă vă luptați cu o boală majoră, vă recomandăm să suspendați suplimentele pentru

o perioadă, așa cum este explicat în secțiunea de mai sus privind suplimentele nutriționale și HRP.

**Notă:** *În timp ce ceaiul este pe această listă de „nu face”, există unele (nu toate) ceaiurile din plante care sunt compatibile cu MMS1. Utilizați metoda de testare descrisă la pagina 278 pentru a fi sigur ce este și ce nu este compatibil.*

## capitolul 4

# DMSO (dimetil sulfoxid)

DMSO (dimetil sulfoxid), este o substanță vindecătoare blândă, dar puternică. Este un cunoscut solvent purtător utilizat pe scară largă din 1955, de către practicieni alternativi și câțiva medici, ca modalitate de a transporta medicamente mai adânc în țesuturile și organele corpului. Luat oral, a fost utilizat pentru dizolvarea cheagurilor de sânge. Organele corpului care sunt folosite pentru transplanturi sunt scufundate în 99,9% DMSO pentru a le transporta între spitale, astfel încât DMSO nu va răni țesutul.

Unele dintre protocoalele din această carte solicită utilizarea DMSO în combinație cu MMS1. (Vă rugăm să rețineți că nu luați niciodată DMSO și MMS2 în același timp. Vezi pagina 27.) Acest lucru s-a dovedit că aduce rezultate bune, deoarece DMSO ajută la transportarea MMS1 mai adânc în țesuturi. DMSO în sine este, de asemenea, capabil să amelioreze durerea, să diminueze umflarea, să reducă inflamația, să încurajeze vindecarea, antifungic, să dizolve cheagurile de sânge, să restabilească funcția normală a corpului și multe altele. DMSO este adesea folosit de medicii veterinari și antrenorii sportivi în tratamentul entorsei musculare și a



diferitelor leziuni. Favorizează vindecarea prin creșterea aportului de sânge în zona leziunii.

Păstrez o parte din DMSO la îndemână în orice moment, pentru utilizare în caz de accident. Poate aduce o ușurare uimitor de rapidă a entorsei și vânătăilor și poate restabili zona rănită în câteva minute, dacă este aplicată la scurt timp după accident. În accidente majore, poate ajuta la ameliorarea durerii și poate ajuta corpul

vindeca mai repede decât în mod normal. Cu cât se aplică mai repede după accident, cu atât mai bine, dar dacă nu puteți aplica imediat după accident, va accelera totuși procesul de vindecare, chiar dacă există o întârziere în utilizarea acestuia. Aplicați DMSO direct pe vătămare. Îl puteți aplica cu toată puterea. Dacă arde sau provoacă mâncărime excesivă, adăugați o cantitate mică de apă, o linguriță sau cam așa și frecați-o ușor. Continuați să adăugați apă în cantități mici, dacă este necesar, până când nu există disconfort de la DMSO.

Mai jos veți găsi câteva informații utile și lucruri pe care trebuie să le știți despre DMSO înainte de ao utiliza conform protocoalelor din această carte. În plus, vă încurajez să o cercetați pe internet, unde este disponibilă o gamă largă de informații despre utilizarea DMSO.

## **DMSO - Unde și ce să cumpăr**

DMSO este disponibil prin diverse magazine, inclusiv companii de furnizare de animale și comercianți cu amănuntul online, cum ar fi Amazon. Doriți să căutați procentul (%) de „puritate” pe sticlă. Dacă sticla are puritate „99% sau 99,99%” sau „pură” pe sticlă și nu are alte numere, aceasta este cea mai mare puritate.

Dacă este posibil, cumpărați DMSO cu rezistență maximă (adică 99% până la 99,99% puritate). Puteți oricând să-l diluați puțin cu apă distilată, dacă este necesar. Dacă cumpărați DMSO diluat, cumpărați unul diluat numai cu apă. Uneori este diluat cu Aloe vera și adesea este parfumat. Nu recomand utilizarea acestora. Citiți cu

atenție etichetele și descrierea produsului. Dacă este necesar, consultați furnizorul pentru a vă asigura că achiziționați.

## **Note**

† *S-ar putea crede că DMSO nediluat este destul de puternic, dar rețineți că, în cea mai mare parte, apelează protocoalele noastre*

*pentru amestecarea DMSO cu apă. Dacă îl luați în doză orală, îl beți în 1/2 cană (4 oz / 120 ml) de apă. Dacă îl utilizați în Protocolul Patch, se adaugă și apă, astfel încât aceste protocoale asigură diluarea acesteia. Mulți oameni pot aplica DMSO nediluat direct pe piele (frecându-l sau folosind o sticlă de pulverizare) și se descurcă bine. Cu toate acestea, dacă vi se pare prea puternic, diluați-vă puțin DMSO cu apă distilată. Cel mai bine este să începeți cu adăugarea unei cantități mici de apă, deoarece puteți adăuga oricând mai mult dacă este necesar.*

† *Dacă DMSO a fost diluat cu mai mult de 10% apă distilată, puteți adăuga o picătură suplimentară din acel DMSO pentru fiecare picătură de MMS1 care este utilizată în protocol. De exemplu, dacă protocolul solicită 3 picături de DMSO per 1 picătură de MMS1, atunci utilizați 4 picături de DMSO per picătură de MMS1.*

† *Este bine cunoscut faptul că DMSO are un miros și un gust neplăcut, cu toate acestea, DMSO de calitate farmaceutică a fost descris ca având aproape nici un miros sau un gust prost. Poate fi găsit pe internet și în unele farmacii. Costul este substanțial mai mare.*

## **DMSO — Test de alergie**

Foarte, foarte puțini oameni, de obicei cei cu ficat slab, sunt alergici la DMSO. Pentru a verifica dacă sunteți alergic sau nu efectuați acest test:

q Folosiți apă simplă (nu folosiți săpun) și spălați și uscați o pată pe braț. (Chiar deasupra sau dedesubtul cotului funcționează bine.)

- q Adăugați 1 picătură de DMSO (cu un deget curat) la locul de pe braț și frecați-l.
- q Acordați DMSO aproximativ 15 minute să se înmoaie și lăsați zona să se usuce.

Dacă nu există durere în zona ficatului în decurs de 24 de ore, este probabil sigur să utilizați DMSO, ceea ce va fi cazul pentru 999 din 1000 de persoane.

Deoarece MMS1 vindecă ficatul, dacă ați luat deja MMS1 de mai mult de o săptămână, ficatul dvs. probabil va tolera DMSO fără nicio problemă.

Dacă aveți dureri la nivelul ficatului după aplicarea DMSO, vă sugerez să lucrați la îmbunătățirea stării ficatului, procedând la Procedura de pornire și apoi Protocolul 1000. Dacă sunteți deja pe un protocol, dar aveți în continuare o reacție proastă la DMSO, pur și simplu continuați cu protocolul și după câteva zile repetați același test din nou și ar trebui să arate toleranță la DMSO. Dacă nu reușiți testul a doua oară, continuați cu protocolul și încercați testul la fiecare două zile până când îl treceți. Nu a existat niciodată un raport despre faptul că DMSO ar fi făcut vreun fel de daune permanente unui om de când a fost descoperit.

## **DMSO — Măsuri de siguranță**

† DMSO este un solvent și trece cu ușurință prin piele și în țesuturi. De asemenea, va transporta și alte substanțe, așa că aveți grijă la ceea ce aveți pe piele înainte de a manipula DMSO.

† Dacă aplicați DMSO local, asigurați-vă că mâinile și unghiile sunt curate și lipsite de contaminanți (inclusiv reziduuri de săpun) atunci când manipulați DMSO. De asemenea, doriți să vă asigurați că zona pe care aplicați DMSO este curată.

† Când spălați o zonă a pielii înainte de a aplica DMSO, este mai bine, dacă este posibil, să folosiți săpun natural, fără substanțe chimice, pentru a spăla zonele de aplicare și mâinile. Indiferent dacă este disponibil sau nu, asigurați-vă că orice săpun este complet clătit - sau nu folosiți deloc săpun. Pur și simplu spălați bine (frecând pielea) cu apă curată.

† Cea mai bună metodă de a aplica DMSO pe piele este pur și simplu să folosiți mâinile goale și uscate curate atunci când frecați DMSO în corpul dvs. sau pe altcineva.

† Dacă folosiți mâinile goale pentru a aplica DMSO, nu purtați oă. DMSO este un solvent care nu numai că va dizolva lacul, dar va transporta și ingredientele sale toxice prin piele și în corp. Vă puteți acoperi mâna într-o pungă sandwich din plastic (acest tip de plastic, în general, este OK pentru utilizarea cu DMSO) pentru a aplica DMSO.

† După manipularea DMSO, nu-l spălați niciodată cu săpun, deoarece poate transporta săpunul în piele / țesuturi. Pur și simplu clătiți bine mâinile cu apă curată.

† Păstrați DMSO cu toată puterea din ochi.

† Nu utilizați mănușile cele mai comune (cauciuc, latex etc.) cu DMSO. Poate dizolva mănușile. Chiar și dizolvarea unei mici mănuși poate transfera cauciucul sau latexul în corpul dumneavoastră. Mănușile din plastic care nu se pot întinde sunt bine de utilizat cu DMSO. În mod normal, DMSO nu își va răni mâinile, iar mănușile nu sunt necesare. (Dacă se aplică frecvent sau în cantități mari pentru unele tipuri de piele, aceasta poate cauza pielea să se încrețească, dar acest lucru trece în curând.)

† **Nu adăugați niciodată DMSO la o soluție de clismă.** Colonul conține multe toxine pe care corpul le elimină. Dacă puneți DMSO în colon, puteți returna unele dintre aceste toxine înapoi în fluxul sanguin.

## AVERTIZARE



- Nu permiteți ca DMSO să intre în contact cu hipocloritul de calciu (MMS2). Acest lucru va provoca arderea imediată cu căldură și foc extrem. În acest caz, nu are nevoie de scânteie pentru a porni

foc instantaneu. Folosiți apă pentru a stinge un astfel de foc, dar stați înapoi, deoarece apa se va stropi.

## AVERTISMENT DE INGESTIE

- Nu utilizați niciodată DMSO într-o băutură în timp ce luați în același timp capsule de hipoclorit de calciu (MMS2). DMSO poate provoca încălzirea MMS2 și poate deveni foarte incomod în stomac. (Dacă acest lucru se întâmplă accidental, beți multă apă rece pentru a atenua orice disconfort.)
- Dacă adăugați DMSO la o doză MMS1, conform Protocolului 1000 Plus, de exemplu, nu trebuie să calculați mai mult de 3 picături de DMSO la fiecare picătură de MMS1 și trebuie amestecat cu cel puțin 1/2 cană (4 uncii / 120 ml ) de apă.
- Dacă pe un protocol care solicită administrarea MMS2 în aceeași zi cu dozele MMS1 / DMSO, puteți face acest lucru, dar capsula MMS2 trebuie separată cu o jumătate de oră de dozele MMS1 / DMSO. Nu luați niciodată o doză care conține DMSO și o capsulă MMS2 în același timp!



**Negul nepotului:** Nepotul meu de 8 ani a venit în vizită într-un weekend și a avut o negi uriașă și uriașă pe genunchi. De fapt, am amestecat trei picături de MMS și acid citric și am aplicat direct pe neg, fără a-l dilua deloc. L-a ars puțin, dar data viitoare când l-am văzut pe nepotul meu, aproximativ o lună mai târziu, negul dispăruse complet. A fost acum aproximativ un an și are o cicatrice în care era negul, dar nu are urme de alt neg. —Tina, Statele Unite

## capitolul 5

# Planul de recuperare a sănătății (HRP)

### **fundal**

O sănătate bună în lumea de astăzi poate fi dificil de obținut datorită mediului nostru toxic. Mulți oameni au probleme de sănătate complexe sau multiple și depășirea lor poate necesita o muncă. Din acest motiv, am dezvoltat acest plan de recuperare a sănătății (HRP). Uneori mă gândesc la el ca la Master Miracle Protocol și, deoarece este o combinație de diverse protocoale, este cu adevărat un plan de recuperare a sănătății (deoarece restaurarea sănătății este un proces). Vestea bună este următoarea: Dacă veți urma fundamentele de bază, așa cum sunt prezentate în Planul nostru de recuperare a sănătății, după ce ați lucrat cu mii de oameni suferinzi, sunt încredător că vă veți face bine într-un timp relativ scurt, așa cum au făcut alții. Amintiți-vă, MMS nu vindecă corpul ca atare, distruge patogenele și oxidează otrăvurile care împiedică organismul să se vindece singur. Folosiți acest plan, așa cum este dat în această carte, pentru toate bolile.

### **Cum functioneaza**

Această carte este plină de o serie de protocoale care, atunci când sunt urmate corect, ajută la restabilirea sănătății oamenilor. Protocoalele noastre cheie merg împreună cu o serie de protocoale de sprijin pentru a alcătui Planul de recuperare a sănătății.

Este important să știm că există o secvență sau o strategie generală în planul de recuperare a sănătății. Am pus-o

aici, în fața acestei cărți, pentru o imagine de ansamblu și pentru o referință ușoară. Pentru cei care nu au lucrat încă cu MMS, în acest moment este posibil să nu aibă încă un sens total cum funcționează acest plan, dar va deveni clar pe măsură ce veți învăța protocoalele prezentate în această carte.

Punctul important este că există o succesiune a modului de utilizare a protocoalelor. Dacă recuperarea cuiva se oprește după perioada de timp menționată aici, rețineți că aceasta este întotdeauna o indicație că este timpul să schimbați ceva, să treceți la pasul următor și să consultați adesea această secțiune a cărții, după cum este necesar.

**Toate protocoalele din această carte pot fi utilizate pentru copii.** Cu toate acestea, acestea trebuie adaptate în funcție de greutatea copilului. Consultați Capitolul 13 pentru instrucțiuni despre modul de ajustare a dozelor de protocol pentru copii.

## **Prezentare generală a protocoalelor cheie pentru planul de recuperare a sănătății**

**Procedura de pornire** este esențial pentru a începe fiecare persoană cu piciorul drept într-un mod ușor. Acest protocol necesită doze foarte mici de MMS1 pe oră pentru a obișnui corpul cu el.

**Protocolul 1000** este protocolul nostru principal care ucide agenții patogeni ai bolii, distruge otrăvurile și elimină metalele grele din corp. Am constatat că o gamă foarte largă de boli au fost depășite doar cu Protocolul 1000.

**Protocolul 1000 Plus** este o procedură care necesită adăugarea unei cantități specificate de DMSO la dozare. DMSO transportă MMS mai adânc în țesuturile corpului pentru a găsi și a elimina otrăvurile și agenții patogeni ascunși acolo.

**Protocolul 2000** termină sau face ceea ce Protocolul 1000 și 1000 Plus nu au putut face. Acesta este hitter-ul nostru dur, care se ocupă de boli atât de bine stabilite încât nu pot fi atinse doar prin Protocoalele 1000 și 1000 Plus. Acesta este, de asemenea, principalul protocol pentru a depăși cancerul și majoritatea bolilor care pun viața în pericol.

**Protocolul 3000** se adaugă pur și simplu la Protocolul 2000 pentru a-l face și mai eficient. Este o modalitate suplimentară de a introduce MMS în organism prin piele fără a trece prin stomac, ca în dozele orale.

**Protocolul de mucegai / ciuperci** include adăugarea de argilă bentonitică utilizată împreună cu MMS1. Dacă nu progresezi cu protocoalele pe care vă aflați, poate fi necesar să treceți o perioadă la Protocolul Mold / Fungus. S-ar putea să vă gândiți să începeți cu acest protocol imediat după procedura de pornire, dar înainte de a continua cu Protocolul 1000, dacă credeți că ați intrat în contact cu mucegaiul / ciuperca și bănuți că mucegaiul este rădăcina problemei dvs.

Așa cum am menționat mai sus, aceste șase protocoale reprezintă protocoalele noastre cheie din gama pentru recuperarea sănătății. Există o serie de protocoale de sprijin pentru a merge împreună cu acestea, în funcție de care este boala. În multe cazuri, oamenii își recuperează sănătatea cu mult înainte de a finaliza toate protocoalele din acest plan de recuperare a sănătății. Cu toate acestea, există cei a căror boală necesită o distanță suplimentară. Unele dintre protocoalele de sprijin abordează probleme și boli specifice și, prin urmare, este necesar să le adăugați



(de obicei după Protocolul 3000, dar uneori mai devreme) în timp ce se află pe Protocoalele cheie. Instrucțiunile din acest capitol vă vor ajuta să determinați acest lucru.

**Ierbă indiană** -În rare ocazii (poate 1 din 100) pentru cancerle extreme, poate fi necesar să se utilizeze Indian Herb (sau Black Salve). Această formulă pe bază de plante a fost de vânzare în

Statele Unite de peste 90 de ani. Mii de oameni l-au folosit cu succes. (Vezi capitolul 10.)

## **Principii fundamentale**

Regulile simple cu protocoalele noastre MMS și principiile fundamentale ale Planului de recuperare a sănătății, pe care le numim Trei reguli de aur ale MMS, sunt următoarele:

† Dacă vedeți progrese - țineți pasul cu ceea ce faceți. Nu schimbați nimic. Nu mergeți la următorul protocol. Nu crește la următoarea picătură; atunci când vă îmbunătățiți, continuați să faceți ceea ce ați făcut până bine sau până când nu mai vedeți niciun progres, caz în care ați trece la nivelul următor.

† De fiecare dată când aveți greață, diaree, vărsături sau oboseală excesivă și / sau vă simțiți mai rău decât boala vă face deja, reduceți aportul de MMS la jumătate. Dacă aceste simptome continuă, atunci continuați să reduceți cu jumătate până când nu vă mai simțiți mai rău decât vă face să vă simțiți boala. Apoi, când simptomele Herxheimer (greață, diaree etc.) dispar, reveniți încet la doza adecvată conform protocolului pe care îl utilizați, dar nu până la punctul de a vă face să vă simțiți mai rău decât vă face deja să vă simțiți boala.

† Dacă nu vedeți niciun progres spre vindecare într-o perioadă de cinci până la șase zile, treceți la nivelul următor - creșteți - începeți să vă creșteți aportul de MMS. În funcție de locul în care vă aflați, urmând un protocol, adăugați picături la doză și / sau treceți la protocolul următor. De fiecare dată când adăugați un nou protocol, nu opriți ceea ce faceți deja. Adăugați,

dar nu opriți niciunul dintre protocoalele anterioare pe care le urmați.

De exemplu, spuneți că sunteți la Protocolul 1000 și după a cincea sau a șasea zi observați o îmbunătățire a stării dvs., oricare ar fi aceasta. Semnele îmbunătățirii

sunt un indicator de menținut cu Protocolul 1000, nu schimbați nimic, țineți cont de el. Pe de altă parte, dacă sunteți în Protocolul 1000 și ați finalizat cinci sau șase zile din protocol și nu ați observat semne de progres sau îmbunătățire, treceți la Protocolul 1000 Plus și așa mai departe.

### **Aliniere de protocoale pentru planul de recuperare a sănătății**

**Procedura de pornire:** Începeți întotdeauna cu procedura de pornire. În același timp, împreună cu Procesul de pornire, începeți cu cei doi pași fundamentali care vă spală dinții cu MMS1 și utilizați flaconul de pulverizare dacă există probleme ale pielii. (Instrucțiunile complete sunt date la paginile 73-78.) În plus, dacă există tumori externe pe corp, acesta este momentul în care s-ar începe și aplicarea patch-ului MMS1 / DMSO (pagina 135).

**Protocolul 1000:** Treceți la Protocolul 1000 și continuați cu acest protocol atâta timp cât vedeți un anumit tip de îmbunătățire. Dar când există o perioadă de cinci sau șase zile în Protocolul 1000 și nu vedeți semne de îmbunătățire, primul lucru de făcut ar fi să vă asigurați că MMS nu este neutralizat de nimic (vezi paginile 42- 45, 52, 56). În plus, verificați lista pentru alte motive pentru care este posibil să nu aveți succes cu MMS (Cap. 8). Apoi, dacă urmăriți totul corect și nu vedeți semne de îmbunătățire după cinci sau șase zile, treceți la nivelul următor - care este Protocolul 1000 Plus.

**Protocolul 1000 Plus:** Continuați cu Protocolul 1000 Plus atâta timp cât există îmbunătățiri, dar din nou,

dacă nu există nicio îmbunătățire pentru o perioadă de cinci sau șase zile, treceți încă o dată la nivelul următor, care este Protocolul 2000.

**Protocolul 2000:** Când folosiți Protocolul 2000, inclusiv luarea MMS2 începând cu a treia sau a patra zi, atâta timp cât dvs.

se îmbunătățesc continuați cu acest protocol. Dar dacă nu există semne evidente de îmbunătățire pentru o perioadă de cinci sau șase zile, adăugați Protocolul 3000.

**Protocolul 3000:** După adăugarea Protocolului 3000, continuați atât timp cât există îmbunătățiri, dar dacă există o perioadă de cinci sau șase zile și nu există nicio îmbunătățire, puteți începe cu diferitele protocoale de sprijin. Aceste protocoale (explicate mai departe în această carte) oferă modalități suplimentare de a vă ajuta corpul să se refacă. Continuați să adăugați mai multe protocoale până bine.

**Protocol de mucegai / ciuperci:** Ultimul, dar cu siguranță nu în ultimul rând, din Protocoalele cheie din linie, este Protocolul Mold / Fungus. Dacă nu vedeți succes cu Protocoalele 1000 până la 3000, vă rugăm să luați în considerare trecerea la Protocolul Mold / Fungus pentru o perioadă. Există multe boli cauzate de mucegaiuri / ciuperci, așa că vă rugăm să citiți cu atenție detaliile explicate în Protocolul pentru mucegai / ciuperci la pagina 99.

Mucegaiul este un tip de ciupercă. Am aflat de-a lungul anilor că există unele tipuri de ciuperci pe care MMS1 și MMS2 nu par să le omoare. Cu toate acestea, am constatat că atunci când acesta este cazul, de obicei argila se va ocupa de problema. Deci, dacă nu obțineți rezultatele dorite cu MMS1 sau MMS2, ar putea fi un indicator că mucegaiul / ciuperca cauzează boala și acesta ar fi un semnal pentru a adăuga argilă la protocolul dvs.

Un alt punct important este că cred, la fel ca unii medici și specialiști în sănătate, că unele varietăți de mucegai / ciupercă pot acționa ca un tip de scut protector pentru unele boli din organism. Atunci când este cazul, este posibil ca unii agenți patogeni să nu fie depășiți de MMS, deoarece mucegaiul prezent oferă o anumită cantitate de „protecție” pentru ei. În acest caz, dacă eliminăm matrița

mai întâi cu lut, pe măsură ce ceilalți agenți patogeni își pierd „protecția împotriva mucegaiului”, MMS este capabil să-i distrugă și pe aceștia.

Acest lucru se poate întâmpla atât cu Lyme, cât și cu Candida și, posibil, cu alte boli. Candida în sine este o ciupercă și lutul poate ajuta la eliminarea acesteia. Dar, dacă și alte tipuri de ciuperci acționează ca un scut protector pentru Candida, atunci este important să rezolvăm mai întâi această problemă, astfel încât MMS să-și poată face treaba. Puteți pune în așteptare orice protocol pe care îl faceți și puteți face Protocolul pentru mucegai / ciupercă oricând doriți să faceți acest lucru. Interceptarea Protocolului de mucegai / ciuperci nu va fi o problemă și nu va afecta progresul pe care l-ați realizat deja, iar după ce ați terminat Protocolul de mucegai / ciupercă, puteți reveni la orice protocol ați fost și continuați cu el până sănătatea completă este recuperată.

## Note

† *Dacă atunci când luați MMS1 pe cale orală, vă confrunțați cu arsuri pe măsură ce coboară sau cu o senzație de arsură la stomac, aceasta ar putea fi un indiciu că mucegaiul / ciuperca este prezent intern. Acesta ar fi un semnal pentru realizarea Protocolului Mold / Fungus (vezi pagina 99). Când utilizați MMS1 extern și arde și înțepă rău, utilizați lut și vaselină (vezi paginile 106-107).*

† *După cum sa menționat deja, oricând MMS vă face să vă simțiți mai rău (cu alte cuvinte, aveți simptome ale unei reacții Herxheimer - greață, diaree etc.) reduceți doza cu 50%, dar nu vă opriți. Continuați să vă reduceți doza dacă continuați să vă simțiți mai rău decât boala vă face deja să*



*vă simțiți. Dacă vă simțiți extrem de rău, opriți-vă câteva ore sau o zi, până când simptomele neplăcute trec, dar odată ce simptomele trec, începeți să vă reconstruiți încet aportul de MMS la doza adecvată pentru protocolul pe care îl utilizați, ca atâta timp cât nu te face să te simți mai rău decât boala ta te face deja să te simți.*

† *Amintiți-vă, de fiecare dată când creșteți aportul de MMS și adăugați un alt protocol, nu încetați să faceți ceea ce faceți deja. Adăugați, dar nu luați sau opriți ceea ce faceți deja.*

† *Un lucru foarte important de reținut este să nu încetați niciodată să luați MMS până nu vă simțiți bine. Când este bine, îți sugerez să lucrezi la modificările necesare ale stilului de viață care te vor ajuta să rămâi sănătos și în formă. Aceasta poate include unul sau mai multe lucruri. Faceți tot posibilul pentru a elimina orice sursă de otrăvuri toxice care intră în mod constant în fluxul sanguin, cum ar fi îndepărtarea canalelor radiculare și îngrijirea oricărei cavitații orale infectate, îndepărtarea mucegaiului de acasă și / sau de la birou, obținerea unei surse bune de apă, fără substanțe chimice nocive etc. (Consultați Capitolul 8 Verificarea realității, pentru mai multe idei despre lucruri pe care poate fi necesar să le schimbați pentru a vă menține sănătos.) Faceți din activitatea fizică o parte a rutinei zilnice. Odihnește-te corect. Reduceți stresul din viața voastră. Cultivați relații bune cu ceilalți. Îmbrățișați o practică spirituală zilnică. Consolidăți-vă sistemul imunitar urmând un plan nutrițional bun. Mănâncă mâncare adevărată.*

## **Excepție de la regulă**

Dacă aveți cancer sau o altă boală care pune viața în pericol, poate fi necesar să vă mutați mai repede în Protocolul 2000 fără a respecta intervalele de cinci până la șase zile înainte de a adăuga un nou protocol. Puteți stabili dacă este timpul să vă mișcați mai repede după cum merg lucrurile. Dacă vă simțiți destul de rău și din nou, aveți o boală care pune viața în pericol, poate doriți să mergeți într-un ritm mai rapid cu

protocoalele, dar fără a vă îmbolnăvi mai mult decât sunteți deja din cauza bolii dumneavoastră. În acest caz, chiar dacă tocmai am spus că vă puteți mișca mai repede, ar trebui totuși să începeți întotdeauna cu procedura de pornire - nu ocoliți acest pas.

Este important să înțelegeți că cu cât boala este mai avansată, cu atât trebuie să începeți mai lent. Dacă detoxificați corpul prea repede, acesta îl poate îmbolnăvi. Să te îmbolnăvești, când ești deja destul de bolnav, nu este un lucru bun. Acest lucru poate slăbi și mai mult corpul și, pe termen lung, încetini procesul general de vindecare.

După finalizarea procedurii de pornire, pe măsură ce treceți la Protocolul 1000 și dozele orare de 3 picături, dacă nu vedeți îmbunătățiri de niciun fel în două până la trei zile (în loc de cinci până la șase zile standard) și nu experimentați o reacție Herxheimer, apoi treceți la Protocolul 1000 Plus (care adaugă DMSO la dozele orare). Dacă, din nou, nu vedeți îmbunătățiri în alte două sau trei zile, treceți la Protocolul 2000. Urmați instrucțiunile Protocolului 2000 și continuați cu Planul de recuperare a sănătății, așa cum este prezentat în această carte, dar fără a vă îmbolnăvi. (A se vedea cele trei reguli de aur ale MMS, paginile 83-84.)

Acordați o atenție deosebită reacției corpului dumneavoastră. Fiecare persoană este diferită; unii ar putea să meargă în acest ritm accelerat, pe de altă parte, alții ar putea avea nevoie să meargă într-un ritm mai lent decât este sugerat aici. Am auzit de recuperare remarcabile de la boli care pun viața în pericol atunci când persoana a luat doar 1 picătură de MMS1 pe oră. Nu este o cursă pentru a vedea cât de mult MMS puteți face față. Ascultați-vă corpul și amintiți-vă, este extrem de important să respectați întotdeauna cele Trei Reguli de Aur ale MMS.

## **Protocoloale suport - Când să le adăugați**

În general, am recomandat să începeți să adăugați protocoale de sprijin dacă ați ajuns la Protocolul 3000 și nu ați recuperat complet sănătatea. În parte, acest lucru se datorează faptului că lucrul prin Planul de recuperare a sănătății este un proces. În general, organismul are nevoie de ceva timp pentru a se obișnui cu fiecare nouă adăugare a procesului. Se adaugă

prea multe lucruri dintr-o dată pot fi copleșitoare și / sau poate provoca reacția Herxheimer. Nu doresc ca nimeni să se obosească și să renunțe, ceea ce ar putea împiedica recuperarea. Această regulă a momentului în care să adăugați un protocol de suport nu este grea și rapidă. Este un ghid.

Câteva excepții la adăugarea de protocoale de susținere: este de la sine înțeles, de fiecare dată când aveți o tuse persistentă, faceți protocolul de tuse. O femeie cu cancer de sân, de col uterin sau uterin poate dori să înceapă Protocolul Douche mai devreme, chiar și în timp ce se află în Protocolul 1000, în unele cazuri. Dacă se ocupă bine de MMS și simte că poate adăuga câteva dușuri pentru a vedea dacă asta ajută și ea să se îmbunătățească, ar putea merita încercarea. Cineva cu cancer de colon poate dori să adauge clisme sau colonici la un moment dat înainte de a ajunge la Protocolul 3000, dacă se simte la înălțimea acestuia. Un alt exemplu de adăugare a unui protocol suport înainte de a ajunge la Protocolul 3000 ar fi în cazul utilizării patch-ului MMS1 / DMSO pentru orice tumori externe. Acordați o atenție deosebită semnalelor corpului dvs. și urmați ceea ce simțiți că puteți face față.

## **Un cuvânt despre protocoalele suplimentare**

Protocoalele suplimentare din această carte sunt diferite de protocoalele de susținere, deoarece sunt specifice unei boli particulare. Anumite boli necesită o procedură diferită de HRP. De exemplu, malaria necesită administrarea a două doze mai puternice decât de obicei de MMS1. În cele mai multe cazuri, acest lucru eradică malaria, dar dacă există complicații,

Protocolul privind malaria oferă instrucțiuni suplimentare specifice ma-lariei.

Uneori, un protocol suplimentar vă poate sugera să mergeți la HRP la un moment dat, după ce ați urmat anumite anume

proceduri specifice bolii respective. Pentru a afla mai multe despre protocoalele suplimentare, consultați capitolul 11.

## **Două proceduri fundamentale de sănătate pentru HRP**

### **1. Spălându-vă dinții**

Aproape toate bolile sunt influențate într-o mare sau mică măsură de starea gurii și a dinților, prin urmare toate protocoalele enumerate în acest Ghid de recuperare a sănătății MMS ar trebui să fie însoțite de o spălare zilnică a dinților cu MMS1. S-a demonstrat de nenumărate ori că MMS1 poate reda sănătatea gurii și, în cazul realizării acestor protocoale, se observă deseori rezultate mai bune la periajul cu MMS1, chiar și atunci când dinții și gura sunt în stare foarte proastă.

Acest lucru nu înseamnă că cineva nu va avea nevoie de serviciile unui bun dentist, dar odată ce infecțiile și bolile gurii au dispărut, dentistul poate face o treabă mult mai bună, iar bolile corpului sunt de 10 ori mai susceptibile de a fi depași. Astfel, un pas preliminar pentru acest plan de recuperare este să cumpărați o perie de dinți moale bună pentru spălarea dinților și a gingiilor, făcând în același timp protocoalele. Dacă folosiți o periută de dinți cu pastă de dinți, păstrați o



perioadă de timp, păstrați o periuță de dinți separată pe care o utilizați numai cu MMS1 (și DMSO dacă o utilizați). Acest lucru va ajuta la evitarea reziduurilor de pastă de dinți rămase pe periuța de dinți, amestecându-se cu MMS1. În niciun caz nu trebuie să folosiți pastă de dinți care conține fluor.

## **Procedura de periere a dinților**

### **Pasul 1**

- q Într-un pahar activați 5 picături de MMS.
- q După 30 de secunde adăugați doar 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă la picăturile MMS1.

### **Pasul 2**

- q Spălați-vă atât gingiile, cât și dinții cu acest amestec timp de cel puțin două minute. (Se toarnă o parte din lichid peste periuța de dinți de 3 sau 4 ori în timp ce se periază. Consultați sfatul de la pagina 75.)
- q Faceți acest lucru de 2 sau 3 ori pe zi în timp ce efectuați protocoalele din această carte.

**Notă:** *De câțiva ani, oamenii din întreaga lume au folosit cu succes MMS1 pentru a-și menține gura în formă și pentru a depăși diverse infecții ale dinților și ale gingiilor. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la alcalinitatea cloritului de sodiu și nici cu aciditatea MMS1 care leșie mercurul din dinți. Acest lucru se datorează faptului că aciditatea din activatorul MMS atunci când este amestecat picătură pentru picătură cu MMS (clorit de sodiu) care este alcalin, este calculată pentru a se anula reciproc, lăsând soluția MMS1 mult mai aproape de neutră. Aciditatea este atunci mult mai mică decât majoritatea fructelor și nu vă poate răni dinții sau leșia mercurul din umpluturi. Rețineți că fructele și legumele sunt mai acide în natură decât dozele MMS1. (Pentru mai multe*

*informații despre aciditatea și alcalinitatea fructelor și legumelor, a se vedea apendicele C.)*

## **DMSO și dinți**

Dacă dinții dvs. sunt într-o formă slabă, de exemplu, dacă aveți un abces, durere sau complicații mai grave la dumneavoastră

dinți, adăugați DMSO la rutina de spălare a dinților. DMSO va transporta MMS direct prin smalț în dinte și poate ajuta la rezolvarea multor probleme.

## **Pasul 1**

- q Se amestecă amestecul de spălare a dinților MMS1 descris mai sus.
- q Spălați-vă dinții cu acest amestec timp de aproximativ un minut. Aceasta este pentru o curățare inițială a gurii și a dinților și pentru a curăța orice nu doriți ca DMSO să „transporte” mai adânc în țesuturi și smalțul dinților.
- q După această curățare inițială, clătiți bine gura.

## **Pasul 2**

- q Apoi, adăugați DMSO la restul amestecului MMS1 și continuați perierea cu DMSO adăugat. Trebuie să adăugați DMSO la amestecul dvs. imediat înainte de a continua perierea. Adăugați 3 picături de DMSO pentru fiecare 1 picătură de MMS pe care o utilizați. Pentru formula de mai sus, aceasta ar fi 15 picături.
- q Dacă aveți DMSO deja diluat, utilizați 4 picături pentru fiecare picătură MMS.

**Bacsis:** Dacă doriți să utilizați aceeași soluție descrisă în procedura de periere a dinților pentru mai mult de o periere,

va trebui să puneți soluția într-o sticlă cu capac strâns. Dacă doriți să vă scufundați periuța de dinți în lichid, aceasta nu mai este refolosibilă. Deci, dacă doriți să vă „scufundați”, nu vă contaminați întregul amestec. În schimb, turnați o parte din soluție într-un pahar mic și continuați cu scufundarea periei de dinți în lichidul respectiv de 3 sau 4 ori în timp ce vă periați, apoi aruncați orice soluție de „scufundare” rămasă. Dublați suma (10

picături activate de MMS la 1/2 cană [4 uncii / 120 ml] de apă) pentru a compune o porție pentru ziua respectivă.

Dacă compuneți această soluție pentru o zi, nu puteți adăuga DMSO. DMSO trebuie adăugat imediat înainte de utilizare, deoarece, în timp, vă va slăbi soluția MMS.

## **2. Stropirea pielii tale**

În timpul acestui plan de recuperare a sănătății, dacă aveți orice fel de probleme ale pielii, fie că este vorba de cancer de piele, eczeme, psoriazis, infecții sau răni etc., pulverizarea pielii sau a plăgii cu MMS este de mare ajutor. Am enumerat acest protocol în pașii fundamentali pentru HRP (Health Recovery Plan), deoarece este important ca problemele pielii să înceapă imediat cu pulverizarea pielii pe măsură ce începeți recuperarea sănătății. Utilizarea acestei sticle de pulverizare este, de asemenea, utilă pentru majoritatea oricăror tipuri de probleme izolate ale pielii, precum răni sau vânătăi, pentru a ajuta la starea generală a pielii și la multe alte afecțiuni. Poate fi folosit pentru tot restul vieții pentru probleme de piele, indiferent dacă vă aflați în celelalte protocoale sau nu. Ori de câte ori spray-ul MMS vă ustură sau vă arde pielea, accesați Protocolul pentru mușgai / ciupercă și verificați secțiunea despre procedura externă pentru mușgai / ciupercă (vezi pagina 106).

### **Flacon de pulverizare MMS1**

- q Formula standard a sticlei de pulverizare este de la 10 la 1. Adică, 10 picături activate de MMS la 1 uncie / 30 ml de apă.
- q Nu folosiți niciodată apă de la robinet pentru niciun amestec MMS, deoarece nu este sigur să riscați să introduceți clor, fluor sau alte impurități în soluție. Utilizați numai apă potabilă îmbuteliată, osmoză inversă sau apă distilată.
- q În majoritatea locurilor, sticle de pulverizare de 2 uncii sau 4 uncii sunt disponibile la farmacie sau în magazinele de produse naturiste.

Înmulțiți pur și simplu formula, 20 de picături de MMS1 la 2 uncii de apă sau 40 de picături de MMS1 la 4 uncii de apă.

- q În general, acest amestec va dura până la o săptămână sau cam așa ceva. Veți ști că și-a pierdut potența atunci când culoarea originală începe să se estompeze în mod vizibil.
- q Nu lăsați sticla de pulverizare în lumina soarelui; stocarea acestuia într-un loc întunecat va ajuta soluția MMS1 să rămână puternică.
- q Utilizați acest lucru pentru pulverizarea tuturor problemelor pe pielea dumneavoastră.
- q Când utilizați o sticlă spray MMS1 pe față, evitați să o introduceți în ochi.

**Baccis:** Puteți pulveriza puțin pe față și apoi pulverizați sau picurați puțin DMSO (dimetil sulfoxid, vezi capitolul 4) deasupra. Frecați-vă ușor fața pentru a ușura ridurile. DMSO face adesea spray-ul MMS mai eficient oriunde pe corp. Când pulverizați ambele MMS1 sau DMSO pe față, evitați să le luați în ochi.

**Variație:** Dacă nu vedeți rezultate cu sticla de pulverizare 10-la-1 MMS1, puteți crește puterea soluției de pulverizare până la până la 50 de picături activate de MMS pe 1 uncie / 30 ml de apă. Începeți întotdeauna cu 10 picături activate (MMS1) la 1 uncie / 30 ml și creșteți picăturile în trepte pentru a vedea ce



funcționează cel mai bine pentru dvs. Oricând soluția de pulverizare MMS1 înțepă și / sau arde, indiferent de cât de slabă sau puternică este, cel mai probabil este un indiciu că există un tip de ciupercă. În acest caz, clătiți-l cu apă purificată și aplicați soluția de argilă și vaselină descrisă în Protocolul pentru mucegai / ciuperci (paginile 106-107).

## **Flacon de pulverizare MMS2**

Am primit feedback de la mulți oameni care au folosit MMS2 într-o sticlă de pulverizare cu rezultate pozitive pentru piele. Atât MMS1, cât și MMS2 ajută pielea în moduri diferite, așa că încercați-le pe amândouă și vedeți ce funcționează cel mai bine pentru dvs. Vă rugăm să rețineți că, în instrucțiunile de mai jos, există unele diferențe în utilizarea MMS2 și MMS1 atunci când sunt utilizate într-o sticlă de pulverizare.

- q Adăugați suficientă pulbere MMS2 (hipoclorit de calciu) într-o sticlă de pulverizare curată și uscată (o sticlă de 2 uncii / 60 ml sau 4 uncii / 120 ml funcționează bine) pentru a acoperi doar fundul sticlei.
- q Umpleți restul sticlei cu apă purificată, distilată sau cu osmoză inversă.
- q Se agită bine pentru a dizolva pulberea MMS2.
- q Apoi puneți soluția MMS2 printr-un filtru curat de hârtie de cafea într-un pahar curat și uscat. (Dacă este posibil, utilizați filtre de cafea din hârtie maro nealbită.) MMS2 are de obicei mici bucăți care nu se dizolvă ușor și, dacă nu sunt strecurate, vă va înfunda sticla de pulverizare.
- q Înainte de a pune din nou soluția MMS2 în sticla de pulverizare, asigurați-vă că clătiți bine sticla cu

apă curată purificată, pentru a vă asigura că nu există bulgări care să vă înfundeze pulverizatorul.

- q Când utilizați o sticlă spray MMS2 pe față, evitați să o introduceți în ochi.

**Notă:** *Spre deosebire de sticla de pulverizare MMS1, nu utilizați o sticlă de pulverizare MMS2 cu DMSO, deoarece aceasta ar putea provoca arsuri.*

# **Capitolul 6**

## **Protocoalele cheie**

### **Procedura de pornire**

Această procedură de pornire trebuie făcută înainte de a urma Protocoalele 1000, 1000 Plus, 2000 sau 3000. Această procedură vă va asigura un succes mai mare, deoarece au existat persoane care fără ea au suferit greață, vărsături, diareee sau oboseală excesivă uneori în prima săptămână cam așa de a începe Protocolul 1000. Mulți renunță chiar atunci, în loc să persiste. Nu le poți da vina; au auzit cât de grozav este MMS-ul și apoi îi face să se simtă prost, așa că renunță. Acest lucru se datorează faptului că au început să ia prea mult MMS1 prea repede pentru a-și începe protocolul. Vă rog să mă credeți când spun că această procedură de pornire este extrem de importantă pentru dumneavoastră pentru recuperarea sănătății. Vă poate ajuta să evitați bolile inutile, deoarece vă ajută corpul să se obișnuiască treptat cu MMS.

Procedura de pornire constă în administrarea MMS1 în doze foarte mici pentru a începe și a crește lent până la o doză de 1 picătură pe o perioadă de patru zile. (Există o excepție de la această regulă, a se vedea varianta de la pagina 82.) MMS1 merge să lucreze la uciderea bolii, dar dacă mergeți prea repede, otrăvurile de la agenții

patogeni morți (orice agent producător de boală) se acumulează în organism mai repede decât corpul poate scăpa de ele. Aceste otrăvuri pot provoca în principal greață, vărsături sau diaree și, uneori, pot fi experimentate și alte suferințe, cum ar fi oboseala extremă. Aceasta se numește reacție Herxheimer așa cum se explică în definiția

termenii de la pagina 6. Sperăm că parcurgerea procedurii de pornire vă poate ajuta să evitați sau să reduceți la minimum o reacție Herxheimer.

## **Instrucțiuni pentru procedura de pornire**

### **Prima zi**

În prima zi a procedurii de pornire luați 1/4 picătură de MMS activat la fiecare oră timp de opt ore. Deoarece nu puteți împărți o picătură în sferturi, pașii următori explică modul în care faceți doza. Amintiți-vă, utilizați un pahar gol, curat, uscat și de băut. Deoarece toate dozele de MMS1 sunt luate în 1/2 cană de apă, este util să vă marcați paharul la punctul de 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) sau să utilizați un pahar cu această măsurare.

### **Pasul 1**

- q Activați 1 picătură de MMS conform instrucțiunilor din Amestecarea unei doze de bază de MMS1 (pagina 32).

### **Pasul 2**

- q Umpleți paharul până la semnul de 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) cu apă. Asigurați-vă că picăturile sunt amestecate în apă.

**Notă:** *Unele sucuri și băuturi răcoritoare sunt acceptabile; vezi paginile 42-45.*

### **Pasul 3**

- q Se toarnă 1/4 sau 1 uncie / 30 ml din acest amestec de apă într-un alt pahar și se bea.

**Notă:** *Înainte de a bea acest 1 uncie / 30 ml puteți adăuga puțină apă suplimentară - cel puțin o uncie sau două - dacă doriți să diluați gustul înainte de a-l bea.*

- q Aruncați 90 ml de 3 uncii în plus. Nu le veți folosi. Trebuie să preparați o băutură nouă în fiecare oră; în caz contrar, doza își va pierde potența. Fiecare doză de MMS1 trebuie preparată proaspătă - amestecați picăturile și numărați până la 30 de secunde, apoi adăugați apă și beți-o în jos. Ar trebui să fii sigur că nu aștepți niciodată mai mult de 60 de secunde înainte de a bea.

## **Ziua a doua și a treia**

În a doua și a treia zi a procedurii de pornire, luați 1/2 picătură de MMS1 la fiecare oră timp de opt ore pe zi.

## **Pasul 4**

- q Urmăriți pașii 1 și 2 (din prima zi de mai sus) în fiecare oră, dar de data aceasta turnați 1/2 din amestec (aceasta va fi 60 ml) și beți și aruncați cealaltă jumătate. Acest lucru vă oferă 1/2 picătură.

## **Ziua a patra**

În a patra zi a procedurii de pornire, luați 3/4 picătură de MMS1 la fiecare oră timp de opt ore.



## Pasul 5

- q Urmați pașii 1 și 2 (din prima zi de mai sus). În acest caz, ar fi cel mai ușor să aruncați 30 ml de lichid 1 uncie și să beți restul de 3 uncii / 90 ml lichid. Cu alte cuvinte, beți  $\frac{3}{4}$  din  $\frac{1}{2}$  cană (sau 4 uncii / 120 ml) amestec pe care l-ați făcut în pașii 1 și 2 și acest lucru vă oferă apoi  $\frac{3}{4}$  dintr-o doză de picătură.

## Pasul 6

- q La sfârșitul zilei patru ați finalizat procedura de pornire la Protocolul 1000. A doua zi (ziua a cincea), ar trebui să începeți Protocolul 1000 conform instrucțiunilor de la pagina 84.

**Notă:** *În cazul unui persoană foarte bolnavă, începe Procedura de pornire cu chiar mai mică decât doza de 1/4 picături sugerată mai sus. Pentru o persoană extrem de bolnavă începeți cu 1/8 picătură la fiecare oră timp de opt ore (pentru o zi), apoi efectuați procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000.*

## Variație - cale rapidă pentru procedura de pornire

Pentru cei dintre voi care sunteți familiarizați cu MMS1 și l-ați folosit anterior, dacă simțiți că ați dori să treceți mai repede prin procedura de pornire; această variație reduce pur și simplu timpul în jumătate. Cu toate acestea, nu recomandăm această metodă rapidă dacă a trecut mai mult de aproximativ opt luni de când ați luat MMS. (Dacă sunteți obișnuiți să luați o doză zilnică de întreținere MMS [consultați pagina 200] și doriți să începeți un protocol MMS complet, vă recomand să începeți totuși cu procedura de pornire folosind această versiune rapidă.) În orice caz, înainte de a continua cu această metodă, nu uitați, acordați atenție modului în care corpul dumneavoastră reacționează, mergeți în ritmul propriu și din nou, dacă apar greață, vărsături sau diaree, reduceți imediat doza la jumătate și urmați instrucțiunile referitoare la simțindu-vă rău la pagina 50.



## **Ziua întâi - cale rapidă**

- q Luați o doză de 1/4 picături timp de patru ore în loc de opt ore.
- q La sfârșitul celor patru ore, creșteți la o doză de 1/2 picătură pentru restul de patru ore din prima zi.

## **Ziua a doua: cale rapidă**

- Luați o doză de 1/2 picătură timp de patru ore.
- Măriți doza la o doză de 3/4 picături pentru restul de patru ore din ziua a doua.

## **Ziua a treia - cale rapidă**

3. Începeți cu Protocolul 1000, începând cu o doză de 1 picătură. Urmăți instrucțiunile Protocolului 1000.

## **Trei reguli de aur ale MMS**

**1(...). Dacă nu este rupt, nu-l repara!** Atâta timp cât vă îmbunătățiți, nu schimbați ceea ce faceți - continuați cu asta, deoarece funcționează în mod evident.

● **Corpul tău știe cel mai bine ... Trebuie doar să înveți să-l asculți!** Ori de câte ori vă confrunțați cu

greață, diaree, vărsături sau oboseală excesivă și / sau vă simțiți mai rău decât boala vă face deja, reduceți aportul de MMS la jumătate și apoi, când boala dispare, reveniți încet. Continuarea creșterii dozelor atunci când vă simțiți mai rău este o greșeală obișnuită. Nu te lăsa să ți se întâmple! Mai mult nu este întotdeauna mai bun. Ascultă-ți trupul!

● **Dacă sunteți într-o rutină, este timpul pentru o schimbare!** Ai ajuns la un impas? Dacă trece o perioadă de cinci până la șase zile și

nu vedeți semne de îmbunătățire și ați verificat că nu faceți nimic greșit (a se vedea Verificarea realității, capitolul 8), treceți la nivelul următor. În așteptarea locului în care vă aflați, adăugați o altă picătură la doză, faceți următoarea creștere sau mergeți la protocolul următor și / sau adăugați un protocol de susținere așa cum este listat în HRP. Ori de câte ori înaintați, nu încetați să faceți ceea ce ați făcut deja. Adăugați, dar nu luați.

### **Pe scurt...**

#### **Trei reguli de aur ale MMS**

- † **A se imbunatati?** Nu schimbați nimic. Continuați cu ceea ce faceți.
- † **Ma simt si mai rau?** Reduceți aportul de MMS cu 50%.
- † **Nu te faci mai bine / nu te înrăutățești?** Dacă nu există semne de îmbunătățire, faceți următoarea creștere sau mergeți la protocolul următor conform HRP.

## **Protocolul 1000**

Acest protocol singur s-a dovedit de nenumărate ori pentru a restabili sănătatea persoanelor cu o mare varietate de boli și afecțiuni, cum ar fi hepatita A, B și C, HIV / SIDA, artrita, refluxul acid, bolile renale, orice număr de dureri și dureri, infecții ale tractului urinar, depresie, diabet și lista continuă. Protocolul 1000 este, de asemenea, util pentru o bună curățare generală pentru a scăpa corpul de toxine nedorite pe care de multe ori nici nu-și dau seama că le au. Mulți oameni declară că într-adevăr nu au simțit că au probleme majore de sănătate, totuși, după ce au făcut Protocolul 1000

s-au simțit mult mai bine - au avut mai multă energie și vitalitate, au o gândire mai clară și s-au simțit mai sănătoși în general după finalizarea Protocolului 1000.

Instrucțiunile date aici sunt pentru originalul și ceea ce îmi place să numesc, Classic Protocol 1000. Dacă faceți cercetări suplimentare, veți descoperi că noi și multe alte persoane am încercat diferite versiuni ale Protocolului 1000 de-a lungul anilor. În timp ce majoritatea tuturor ușoarelor variații ale Protocolului 1000 au avut succes, conform rapoartelor pe care le-am primit din întreaga lume, succesul nu a fost niciodată la fel de bun ca protocolul original de amestecare a dozei proaspete în fiecare oră.

Protocolul 1000 ia maximum 3 picături de MMS activat (MMS1) în 120 ml apă (4 sucuri) (unele sucuri sunt acceptabile, așa cum se explică la paginile 42-45) o dată pe oră, timp de opt ore consecutive, în fiecare zi, timp de trei săptămâni sau până bine. Unul nu începe cu 3 picături pe oră. Încercați să construiți până la 3 picături încet, așa cum este menționat în această carte și respectând cele trei reguli de aur ale MMS. Amintiți-vă, dacă corpul dvs. nu tolerează o creștere a picăturilor, rămâneți cu ceea ce funcționează cel mai bine pentru dvs. Sănătatea dumneavoastră poate fi recuperată luând mai puțin de 3 picături în fiecare doză. Unii oameni și-au recuperat sănătatea luând 1 sau 2 (sau chiar mai puține) picături pe oră.



Cel mai bine este să începeți lent și să ajungeți la doza de 3 picături.

**Nu porniți Protocolul 1000 până când nu ați finalizat procedura de pornire.** După terminarea procedurii de pornire, începem Protocolul 1000 cu o picătură pe oră și ajungem la doza sugerată de 3 picături pe oră.

## **Instrucțiuni pentru Protocolul 1000**

### **Pasul 1**

- † Într-un pahar curat și uscat, activați 1 picătură de MMS conform instrucțiunilor din Amestecarea unei doze de bază de MMS1, pagina 32.
- † Adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă sau alt mixer recomandat.

### **Pasul 2**

- q Beți doza de 1 picătură într-un minut de la amestecare.

### **Pasul 3**

- † Continuați să luați o doză de 1 picătură în fiecare oră până când sunteți gata să vă creșteți picăturile.

### **Pasul 4**

- † Dacă după trei sau patru ore nu există nicio problemă de greață sau orice senzație mai rea, atunci creșteți doza cu cel puțin 1/2 picătură. Mergeți în ritmul propriu (fără a vă îmbolnăvi mai mult decât vă face deja

boala), dar acumulați constant o doză de 3 picături în fiecare oră. De exemplu, o persoană ar putea începe în prima zi cu o doză de 1 picătură timp de două până la trei ore și apoi poate crește la 1-1 / 2 picături pentru câteva ore și apoi 2 picături pentru câteva ore și așa mai departe. Alții ar putea dori să rămână la o doză de 1 picătură în fiecare oră pentru întreaga primă zi, și apoi 2 picături în fiecare oră a doua zi și așa mai departe. Unii pot chiar considera necesar să rămână la o doză de 1 picătură la fiecare oră timp de câteva zile înainte de a putea crește.

## Pasul 5

- Continuați să luați doze de 3 picături la fiecare oră, timp de opt ore consecutive pe zi, timp de 21 de zile. S-ar putea să vă faceți bine fără o altă problemă, dar dacă în orice moment aveți greață, vărsături, diaree sau oboseală excesivă, pur și simplu reduceți cantitatea de picături pe care o luați cu cel puțin o jumătate. Amintiți-vă, reduceți, dar nu vă opriți. (Un pic de scaun slab sau diaree ar putea fi considerat OK și face parte din procesul de curățare, dar dacă devine prea mare sau aveți, de asemenea, greață și vărsături tăiate imediat. Urmați instrucțiunile din secțiunea Simțiți bolnav, pagina 50. ) Asigurați-vă că respectați cele trei reguli de aur ale MMS.

## Note

● ***Nu treceți niciodată dincolo de o doză de 3 picături în fiecare oră pe Protocol 1000.***

● *Deși nu este plăcut să simțiți greață, diaree, vărsături sau oboseală excesivă în cazul în care vă confrunțați cu aceste simptome, este de obicei un semn că corpul dumneavoastră trece prin procesul de detoxifiere - așa că pe acest scor este pozitiv. Scopul este, însă, să mergi într-un ritm constant, nu prea rapid, astfel încât să nu te îmbolnăvești.*

● *În cazul în care vă recuperați sănătatea în mai puțin de trei săptămâni, vă sugerez să continuați totuși Protocolul 1000 pentru întreaga perioadă de 21 de zile. Acest lucru va ajuta la finalizarea procesului de detoxifiere.*

# **Protocolul 1000 Plus**

Protocolul 1000 Plus necesită adăugarea de DMSO (dimetil sulfoxid) la dozarea orară. Înainte de a începe

cu acest protocol, vă rugăm să citiți cu atenție și / sau să vă familiarizați cu capitolul 4 din această carte.

Acest protocol adaugă pur și simplu DMSO la doza MMS1 Protocol 1000, care este de 3 picături activate pe oră (sau de câteva ori mai puțin). Cu Protocolul 1000 Plus, adăugați 3 picături de DMSO pentru fiecare picătură de MMS. Sau, în cazul în care nu ați progresat la 3 picături pe oră până la această oră, continuați aceeași cantitate de MMS1 pe care o luați și adăugați în DMSO în consecință. De exemplu, dacă luați o doză de 3 picături de MMS1, ați adăuga 9 picături de DMSO. Dacă luați o doză de 2 picături de MMS1, ați adăuga 6 picături de DMSO.

## **Instrucțiuni pentru Protocolul 1000 Plus**

### **Pasul 1**

- † Activați 3 picături de MMS. (Dacă nu ați reușit să lucrați până la o doză de 3 picături încă, din cauza greaței etc., activați oricât de multe picături luați.)
- † Adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă (sau lichid compatibil; consultați paginile 42-45, 56).

### **Pasul 2**

- † Imediat după adăugarea apei, adăugați 3 picături de DMSO pentru fiecare picătură de MMS1 pe care o utilizați. De exemplu, dacă faceți o doză de 3 picături MMS1, adăugați 9 picături de DMSO. (Se amestecă bine DMSO amestecându-l.)
- † Beți imediat doza, deoarece odată ce DMSO este adăugat, MMS1 va începe să-și piardă încet puterea dacă este lăsat să stea.

### Pasul 3

† Dacă după adăugarea DMSO la doza dumneavoastră, aveți disconfort (cum ar fi greață, diaree etc.), reduceți cantitatea de DMSO pe care o adăugați la următoarea doză. În loc să adăugați 3 picături de DMSO per 1 picătură de MMS1, reduceți la 2 picături de DMSO la 1 picătură de MMS1. Dacă aveți încă disconfort, reduceți DMSO cu o altă picătură, cu alte cuvinte, utilizați 1 picătură de DMSO per 1 picătură de MMS1. Dacă aveți încă disconfort după reducerea cantității de DMSO de 2 ori, opriți complet adăugarea de DMSO la dozele MMS1 pentru o zi. Apoi începeți din nou cu doze mici de DMSO și acumulați încet până la 3 picături de DMSO per 1 picătură de MMS1.

### Note

q *Un motiv important pentru a bea imediat doza de MMS1 / DMSO este faptul că DMSO începe să determine doza să-și piardă încet puterea. Este nevoie de până la șase ore pentru a pierde potența completă; cu toate acestea, cel mai bine este să-l beți imediat, astfel încât să nu-și piardă puterea. Vă sugerez să-l beți în termen de un minut de la adăugarea picăturilor DMSO, deoarece pierde o cantitate mare de potență în primele zece minute și apoi continuă să piardă potența într-un ritm mai lent.*

q *Când treceți de la Protocolul 1000 Plus la Protocolul 2000, continuați să utilizați întotdeauna DMSO conform instrucțiunilor date aici în Protocolul 1000 Plus în timp ce faceți Protocol 2000, adică adăugați întotdeauna 3 picături de DMSO la doză pentru fiecare 1 picătură de MMS1.*



# Protocolul 2000

Protocolul 2000 este, în esență, Protocolul nostru împotriva cancerului, dar nu îl numim „Protocolul împotriva cancerului” ca atare, deoarece funcționează bine și pentru majoritatea celorlalte boli care pun viața în pericol. Eu

au observat că mai mult de 90% dintre cei care folosesc cu fidelitate Protocolul 2000 și își asumă responsabilitatea pentru a-l folosi conform instrucțiunilor de aici, își depășesc complet cancerul sau alte boli. Cu toate acestea, trebuie să menționez, de asemenea, că există cazuri de cancer și alte boli care pur și simplu sunt prea departe pentru ca chiar MMS1 și MMS2 să le ajute. În mod normal, acestea sunt cazurile care au avut cantități uriașe de chimioterapie, radiații sau tratament chirurgical, iar corpul este pur și simplu „trecut de punctul de neîntoarcere”. Cu toate acestea, nu spunem niciodată. Dacă persoana mai are încă o oră de trăit, puneți-i ceva MMS1 în el. Consultați pagina 249 pentru mai multe informații despre ajutorarea persoanelor cu condiții extreme.

### **În Protocolul 2000 veți:**

- q Măriți numărul de picături pe care le luați în fiecare oră la cât mai multe picături pe care le puteți suporta (până la cantitatea maximă de picături pentru greutatea dvs. - consultați pagina 92) fără a vă îmbolnăvi din cauza MMS. În majoritatea cazurilor, creșterea picăturilor este necesară pentru cancer și alte boli care pun viața în pericol.
- q Măriți numărul de ore în care luați doza în fiecare zi de la opt la zece ore.
- q La începutul celei de-a treia sau a patra zile a Protocolului 2000, ar trebui să începeți să luați MMS2 în plus față de MMS1.

Cel mai important lucru de reținut este să nu încetați niciodată să luați MMS până nu vă simțiți bine. Rămâneți în Protocolul 2000 și orice protocoale de

sprijin necesare, așa cum este explicat în Planul de recuperare a sănătății, până când vă recuperați complet sănătatea.

**Notă:** Când progresați de la Protocolul 1000 Plus la Protocol 2000, continuați să utilizați întotdeauna DMSO conform instrucțiunilor date în Protocolul 1000 Plus în timp ce faceți acest lucru

*Protocol 2000, adică adăugați 3 picături de DMSO la doză pentru fiecare 1 picătură de MMS1.*

## **Instrucțiuni pentru Protocolul 2000**

### **Pasul 1**

- q Măriți numărul de ore pe zi pe care o luați doză orară la zece ore pe zi în loc de cele opt ore pe zi din Protocolul 1000.

### **Pasul 2**

- q Începeți să creșteți picăturile din doza zilnică cu câte 1 picătură. De exemplu, dacă luați 3 picături pe oră conform Protocolului 1000, puteți crește la 4 picături.
- q Planul de recuperare a sănătății (HRP) acordă o excepție de la regulă (vezi pagina 70). Dacă intrați în această categorie și, prin urmare, ajungeți la Protocolul 2000 direct din procedura de pornire din cauza cancerului sau a unei alte boli care pune viața în pericol, atunci începeți cu 1 picătură pe oră și creșteți picăturile pe oră după doar câteva ore cu 1 picătură pe ora. Vă puteți da seama dacă nu ar trebui să adăugați o altă picătură pe oră după cum vă simțiți. Doar continuați să creșteți cu o picătură suplimentară pe oră, până când un sentiment mic de rău dincolo de felul în care vă face să vă simțiți boala, vă anunță deocamdată să nu mai creșteți. Unii oameni se pot deplasa mai repede, iar alții nu, vă rugăm să fiți atenți la cele trei reguli de aur ale MMS.

- q Este important să nu vă permiteți să vă simțiți mai rău decât boala vă face deja să vă simțiți, deoarece boala suplimentară vă poate încetini recuperarea. Deci, dacă luați doza de MMS duce la greață, vărsături, diaree sau oboseală excesivă, reduceți numărul de

picături pe care le luați cu 50% pentru următoarea doză, dacă totuși se pare că MMS1 continuă să provoace suferință, reduceți doza cu încă 50% din ceea ce luați. Când vă simțiți confortabil cu cantitatea de MMS1 pe care o luați, creșteți încet din nou picăturile. Dacă boala adăugată este severă, încetați temporar să luați picăturile cu totul și începeți din nou de îndată ce vă simțiți mai bine. Și din nou, crește la cât poți lua fără să te simți mai rău decât ești deja.

Următorul grafic oferă cantitatea teoretică maximă de picături pe care majoritatea oamenilor ar trebui să o ia pentru greutatea corporală. Oricine cântărește mai mult de 200 de lire sterline își poate calcula numărul maxim de picături adăugând câte o picătură pentru fiecare 20 de lire sterline peste 200 de lire sterline. Există momente în care un cancer nu se îmbunătățește, ar putea merge mai departe și să ia mai multe picături pe oră decât cele sugerate aici, în acest caz nu ezitați să faceți acest lucru, dar în mod normal acest grafic este corect. Amintiți-vă, urmați cele trei reguli de aur ale MMS. Unii oameni nu vor ajunge până aproape de aceste sume. Acestea sunt sume maxime - nu sunt un scop.

<b>Protocol 2000 — Dozaj maxim MMS1</b>	
<b>Greutate</b>	<b>Dozare</b>
<b>80-100 lbs (36-45 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 8 picături pe oră</b>
<b>100-120 lbs (45-54)</b>	<b>Nu luați mai mult de 8</b>

<b>kg)</b>	<b>picături pe oră</b>
<b>120-140 lbs (54-63 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 9 picături pe oră</b>
<b>140-160 lbs (63-72 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 10 picături pe oră</b>
<b>160-180 lbs (72-81 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 11 picături pe oră</b>
<b>180-200 lbs (81-90 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 12 picături pe oră</b>

**200 kg (90 kg) și peste: creșteți doza maximă cu 1 picătură pentru fiecare 20 kg suplimentar (9 kg)**

### Pasul 3

- q Începeți să luați MMS2 în a treia sau a patra zi în protocol. (Vă rugăm să citiți secțiunea MMS2 — Detalii, pagina 274, pentru informații despre unde să cumpărați hipoclorit de calciu și instrucțiuni despre cum să faceți capsule MMS2.)
- q Utilizați fie capsulele cu dimensiunea # 1, care sunt cele mai mici pe care ar trebui să le utilizați, fie capsulele cu dimensiunea # 0, care este cu o dimensiune mai mare decât # 1. (Și nu, nu am făcut o greșală în ceea ce privește dimensiunile capsulelor; ele devin într-adevăr mai mici ca dimensiune pe măsură ce creșteți numărul.) Începeți prin încărcarea capsulelor # 1 de dimensiuni 1/8 complete sau # 0 capsule de dimensiuni aproximativ 1/16 complete . Când capsulele sunt îndepărtate, o parte este întotdeauna mai mare decât cealaltă parte. Umpleți partea mai mare (împachetați-o ușor). Apoi puneți partea mai mică și asigurați-vă că o împingeți în siguranță în poziție.

### Pasul 4

- q Pasul 3 vă face să începeți, dar creșteți cantitatea pe care ați pus-o în capsulă în următoarele câteva zile, lucrând până la plin pentru capsula cu dimensiunea # 1 sau cu 3/4 plin pentru o capsulă cu dimensiunea # 0. Măriți încet cantitatea pe care ați pus-o în capsulă.



## **Pasul 5**

- q Luați una dintre aceste capsule de 5 ori pe zi - o dată la două ore.
- q Luați-vă prima capsulă MMS2 la o jumătate de oră după ce ați luat cea de-a doua doză MMS1 a zilei.

**Exemplu de program de timp pentru Protocolul 2000, odată ce MMS2 este adăugat la dozare**

<b>Protocolul 2000</b>	
<b>Program MMS2</b>	
<b>Timp</b>	<b>Doza</b>
<b>9:00 DIMINE ATA</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>10:00 AM</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>10:30 DIMINE AȚA</b>	<b>Doza MMS2</b>
<b>11:00 DIMINE ATA</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>12:00 PM</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>12:30 PM</b>	<b>Doza MMS2</b>
<b>1:00 DUPĂ AMIAZA</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>14:00</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>2:30 PM</b>	<b>Doza MMS2</b>

<b>3:00</b>	
<b>DUPA</b>	
<b>AMIAZA</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>16:00</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>16:30</b>	<b>Doza MMS2</b>
<b>5:00 PM</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>18:00</b>	<b>Doza MMS1</b>
<b>6:30</b>	
<b>SEARA</b>	<b>Doza MMS2</b>

## Note

q În timp ce lucrați până la dimensiunea corectă a capsulelor de MMS2, care este fie o capsulă de dimensiune completă # 1, fie o capsulă de dimensiune 3/4 completă # 0 (nu depășiți niciodată aceste cantități), păstrați dozele MMS1 constante. Cu alte cuvinte, nu lucrați la creșterea picăturilor de MMS1, în timp ce lucrați până la doza corectă de MMS2, deoarece dacă vă faceți greață nu veți putea determina care dintre cele două vă poate face să vă simțiți rău . După ce ați atins cantitatea sugerată de MMS2, puteți începe să vă creșteți din nou picăturile de MMS1.

q *Amintiți-vă, în orice moment, dacă vă măriți cantitățile de MMS1 sau MMS2, dacă în orice moment vă simțiți greață sau vă este rău din cauza creșterii, reduceți cantitatea cu cel puțin o jumătate și reconstruiți încet.*

q ***Nu luați niciodată o doză care conține DMSO și o capsulă MMS2 în același timp!*** Consultați paginile 23-24 pentru avertizarea completă cu privire la aceasta.

## Protocolul 3000

Scopul situațiilor grave sau care pun viața în pericol este de a face ca MMS1 să circule rapid în sânge în timp ce încearcă să rămână sub nivelul de greață. O modalitate de a realiza acest lucru este prin utilizarea DMSO cu MMS1 local. DMSO este un purtător și, prin urmare, duce MMS1 direct în piele și țesuturi și astfel în sânge. Testarea în condiții de laborator prin adăugarea unor mici cantități nepericuloase de radiații a demonstrat că DMSO transportă MMS1 direct la orice cancer din organism și apoi pătrunde în celulele canceroase. Avem dovezi că DMSO transportă, de asemenea, MMS1 în orice loc al corpului în care boala a slăbit zona. (Pentru informații suplimentare, recomand cartea lui Stanley Ja-cob: Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease de Stanley W. Jacob și Jack C. De La Torre. De asemenea, Manualul DMSO de Hartmut PA Fischer.)

Protocolul 3000 este utilizarea topică a MMS1 amestecat cu DMSO, aplicat corpului în fiecare oră pentru minimum opt ore pe zi. Procedura MMS1 / DMSO descrisă mai jos este o tehnică accelerată a pielii care ajută la împingerea

MMS1 în plasma sanguină. Această metodă ajută, de asemenea, la evitarea unei reacții Herxheimer. În cazul cancerului sau a altor boli care pun viața în pericol, acesta trebuie utilizat în plus față de un regim oral normal al Protocolului 2000.

## **Instrucțiuni pentru Protocolul 3000**

### **Pasul 1**

- q Se amestecă o soluție de 10 picături de MMS cu 10 picături de acid citric 50% sau 10 picături de acid HCl 4%. Numărați 30 de secunde pentru activare.
- q Adăugați 20 de picături de apă. Dar dacă acest amestec este prea puternic (provoacă arsuri ale pielii sau alte iritații), adăugați mai multe picături de apă până când nu provoacă iritații. Dacă nu există o sensibilitate suplimentară a pielii, poate doriți să adăugați mai puțină apă (faceți acest lucru în trepte), pentru a vedea dacă puteți tolera un amestec mai puternic.
- q Adăugați 1 linguriță / 5 ml de DMSO.
- q Întindeți imediat amestecul pe un braț. Puteți folosi mâna pentru a răspândi mixul. (Asigurați-vă că mâinile sunt spălate și clătite bine pentru a îndepărta tot săpunul înainte de a aplica DMSO.) Nu este necesar și nici chiar potențial periculos să purtați o mănușă (dacă este latex sau cauciuc). După ce ați terminat, spălați-vă mâna cu apă plată, nu vă spălați cu apă și săpun, deoarece DMSO este un purtător și poate transporta o parte din săpun în țesuturile dvs.

### **Pasul 2**

- q În următoarea oră, amestecați o altă soluție MMS1 / DMSO și răspândiți-o pe celălalt braț. Repetați următoarea oră și faceți o altă parte a corpului. Faceți mai întâi un braț, apoi celălalt braț, apoi un picior, apoi celălalt picior, apoi stomacul și apoi înapoi la primul braț și așa mai departe. Utilizați o parte diferită a corpului de fiecare dată când aplicați combinația DMSO / MMS1. Faceți acest lucru o dată la oră timp de opt ore consecutive.

### Pasul 3

- q Repetați acest proces o dată la oră timp de opt ore consecutive timp de trei zile consecutive. (Este bine să vă scăldați sau să faceți duș după ce ați terminat orele de aplicare a MMS1 / DMSO. Așteptați cel puțin o oră după aplicarea ultimei aplicații. Clătiți bine cu apă plată înainte de a utiliza săpun.)

### Pasul 4

- q Apoi ia o pauză. Renunțați la una până la patru zile sau oricâte zile este nevoie pentru a depăși orice probleme care ar putea fi cauzate de DMSO (cum ar fi pielea extra uscată).

### Pasul 5

- q După prima săptămână, puteți utiliza această aplicație topică patru zile pe săptămână sau mai multe, dacă nu există nicio problemă cu pielea. Dacă nu există nicio problemă, continuați să utilizați MMS1 și DMSO în fiecare zi, atât timp cât nu există iritații ale pielii. Oricând întâmpinați iritații, reduceți-o pentru o vreme sau puteți adăuga mai multă apă la amestec.

**Notă:** Când părăsiți aplicația topică MMS1 / DMSO timp de patru zile, ar trebui să continuați cu celelalte protocoale MMS.

### Variații



† O metodă alternativă utilizează același amestec menționat mai sus de picături MMS1 în apă, dar răspândiți mai întâi acest amestec pe corp și apoi pulverizați DMSO (vezi paginile 261-264 pe sticla de pulverizare DMSO) sau bateți DMSO deasupra MMS1 pe aceeași zonă. Frecați-l ușor în piele. Puteți folosi mâinile goale curate pentru a face acest lucru.

Când ați terminat, clătiți-vă mâinile cu apă plată. (Amintiți-vă, DMSO este un purtător, așa că utilizarea acestuia cu săpun ar putea transporta săpunul în sistemul dvs., deci clătiți cu apă și ștergeți-l.)

† Pentru persoanele bolnave în plus, care ar trebui să ia doze mai mici de DMSO, cel mai bine ar fi să începeți să utilizați doar o mică zonă a corpului. Vă sugerez să folosiți o zonă aproximativ de dimensiunea palmei - nu mai mare. Utilizați o zonă mică ca aceasta timp de câteva zile înainte de a merge într-o zonă mai mare, cum ar fi întregul braț sau picior. Utilizați o zonă mai mare numai dacă nu există nicio reacție adversă la DMSO în zona mai mică.

† Sau, în schimb, adăugați apă suplimentară amestecului. Adică, în loc să folosiți o zonă mai mică pentru a freca DMSO, adăugați apă suplimentară la soluția MMS1 / DMSO și apoi puneți-o pe întregul braț sau picior și alte zone.

† Există un mod mai convenabil de a face acest protocol care implică utilizarea sticlelor de pulverizare pentru a aplica MMS1 și DMSO pe corp. Puteți găsi detaliile complete despre metoda sticlei de pulverizare pentru Protocolul 3000, în secțiunea pentru copii din această carte la pagina 260. Același procedeu și amestec pentru copii pot fi folosiți și pentru adulți. Deși metoda sticlei de pulverizare poate fi mai ușoară pentru unii oameni, am lăsat mai sus metoda originală pentru acest protocol de dragul învățării și de dragul acelor persoane care, dintr-un motiv sau altul, poate să nu poată obține spray sticle.

## **Precauții**

† Când lucrați cu DMSO, nu utilizați mănuși din cauciuc sau latex sau alte mănuși medicale. Ați putea introduce cauciuc în corp, pe măsură ce DMSO topește cauciucul. Mănușile de plastic care nu sunt întinse sunt un fel de plastic care poate fi utilizat cu DMSO.

† Păstrați DMSO cu toată puterea din ochi. Aveți grijă să nu vă atingeți ochii când manipulați DMSO până nu ați clătit DMSO din mâini.

† Dacă observați o senzație de arsură pe piele după ce ați aplicat DMSO, o tehnică bună este să plasați o linguriță de apă purificată pe zona de ardere și să o frecați ușor. Continuați să adăugați apă până când nu mai arde. Sau utilizați o sticlă de pulverizare cu apă simplă în ea pentru astfel de probleme, dar frecați apa.

† Puteți freca ulei de măsline sau gel de Aloe vera pe piele după aplicarea DMSO / MMS1 pentru a calma pielea dacă vă simțiți arsuri sau iritante.

**Notă:** Pentru o listă completă a măsurilor de siguranță pentru utilizarea generală a DMSO, consultați paginile 25-27.

## Protocolul de mucegai / ciuperci

Mucegaiul poate fi un factor care contribuie la multe boli. Mucegaiul își poate face drum în unele locuri surprinzătoare. În timp ce mulți dintre noi asociază mucegaiul cu climele umede sau umede, adevărul este că mucegaiul poate fi găsit aproape oriunde, chiar și în climatul uscat. Problema cu mucegaiul este că poate fi adesea dificil de detectat. Când cineva este bolnav din cauza mucegaiului, acesta poate afecta corpul într-o varietate de moduri, iar simptomele pot varia foarte mult. Mucegaiul poate provoca infecții; poate face ravagii în calea respiratorie, provocând toate tipurile de probleme pulmonare, dificultăți de respirație, tuse și respirație suierătoare. Poate provoca o varietate de probleme ale

pielii, dureri de cap, depresie, pierderi de memorie, probleme vizuale, alergii, sinusuri și probleme nazale, dureri musculare și articulare, tulburări digestive, tulburări ale sistemului imunitar, oboseală și multe altele. Inutil să spun,

În anumite condiții, mucegaiul / ciuperca se pot răspândi rapid prin corp. Uneori te va îmbolnăvi și alteori s-ar putea să nu o simți timp de zile sau luni. S-ar putea chiar să vină și să plece fără ca tu să o simți vreodată. Cu toate acestea, nu pariați pe acest lucru, deoarece se poate agăța și luni sau chiar ani, distrugându-vă sănătatea și făcându-vă susceptibil la multe alte boli.

Mucegaiul este un tip de ciupercă. Am aflat de-a lungul anilor că există unele tipuri de ciuperci pe care MMS1 și MMS2 nu par să le omoare. De ce? Nu sunt tocmai sigur. Dar am constatat că atunci când acesta este cazul, de obicei argila va rezolva problema. Deci, dacă nu obțineți rezultatele dorite cu MMS, ar putea fi un indicator că mucegaiul / ciuperca cauzează boala și acesta ar fi un semnal pentru a adăuga argilă la protocolul dvs. Personal am avut succes făcând acest lucru, la fel ca mulți alții. Nu voi garanta că va funcționa pentru dvs., dar în opinia mea, dacă cineva se confruntă cu unul sau mai multe dintre simptomele descrise mai sus și nu are succes cu MMS, cu siguranță merită să încercați să adăugați argilă la protocolul dvs. și vedeți dacă aduce rezultate. Argila nu ar trebui să vă facă rău sau să vă încetinească progresul.

**Unele indicații că mucegaiul / ciuperca este la baza bolii, iar tipul (tipurile) MMS nu va ajuta să includă:**

- Dacă problema este externă și MMS este pulverizat pe ciupercă, aceasta va deveni dureroasă și va începe să întepe și să ardă grav.
- Dacă ciuperca este în gură când se aplică MMS1, gura va ustura și arde. (Clătiți-vă gura

cu apă rece pentru a scăpa de înțepătura cauzată de MMS.)

- Dacă mușgaiul este o problemă internă și, în timp ce luați MMS pe cale orală, aveți arsuri pe măsură ce coboară,

sau un tip de senzație de arsuri la stomac, acest lucru ar putea indica mucegaiul / ciuperca este prezent intern.

Dacă apar reacțiile de mai sus, acest protocol de mucegai / ciuperca, cu adăugarea de argilă, poate remedia situația. Argila are milioane de găuri mici cu o încărcare electrică puternică în fiecare gaură. Microorganismele sunt trase în gaură prin atracția sarcinii și sunt prinse în gaură. Argila se spală apoi din corp luând cu el microorganismele (fie vii, fie moarte). Procedura prezentată mai jos s-a dovedit a fi de succes cu mulți oameni.

Argila pe care recomand să o folosesc pentru acest protocol are mai multe denumiri: argilă aztecă, argilă bentonitică (este preferată bentonita de calciu sau argilă montmorillonită (din Franța).

## **Instrucțiuni pentru utilizarea internă a argilei**

Dacă nu ați fost pe un protocol MMS, efectuați mai întâi procedura de pornire (pagina 79), înainte de a începe acest protocol de mucegai / ciuperca. După finalizarea procedurii de pornire în patru zile, intrați direct în acest protocol în a cincea zi. Dacă sunteți deja pe un protocol MMS și stabiliți că trebuie să vă opriți câteva zile pentru a face protocolul Mold / Fungus, atunci când adăugați argilă în rutina MMS - pentru o perioadă scurtă de timp - în timp ce efectuați pașii 1 și 2 din acest protocol, întrerupeți administrarea dozelor de MMS conform oricărui protocol pe care îl puteți face în acel moment (Proto-cols 1000, 1000 Plus, 2000 sau 3000).



## Pasul 1

- q În prima zi de administrare a argilei, luați 5 doze de argilă, fiecare doză fiind separată la două ore.
- q **Doza de argilă 1 și 2:** Adăugați 1/2 linguriță de nivel (2,5 ml) de argilă în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Cel mai bine este

pentru a continua să agitați apa în timp ce stropiți lutul în apă. Bea totul. Este bine să beți încet, dar mențineți-l agitat.

- q **Dozele de argilă 3, 4 și 5:** Adăugați 1 linguriță de nivel (5 ml) de argilă în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Se amestecă așa cum s-a menționat mai sus până când se amestecă bine cu apa. Bea totul. Este bine să beți încet, dar mențineți-l agitat, deoarece lutul se va așeza repede până la fundul paharului.

## Pasul 2

- q Dacă după prima zi de administrare a lutului vă simțiți bine și nu aveți niciun sentiment de rău suplimentar (nu mai bolnav decât v-ați simțit deja cu boala) după 5 doze de lut, continuați cu Pasul 3 de mai jos în ziua a doua. Cu toate acestea, dacă se pare că vă simțiți puțin mai rău decât în mod normal, continuați să beți dozele de argilă descrise în Pasul 1 de mai sus, încă o zi, luând o doză de argilă la fiecare două ore până când ați luat 5 doze, apoi treceți la Pasul 3 în a treia zi.

## Pasul 3

- q Alternați băutura de lut descrisă la pasul 1 de mai sus cu oricare dintre dozele dvs. de MMS1 înainte de a începe lutul. (Prima oră luați o doză MMS1, ora următoare luați o doză de argilă, următoarea oră o doză MMS1, următoarea oră o doză de argilă și așa mai departe.) De exemplu, dacă ați început să faceți acest protocol de mușcăi / ciupercă imediat după terminând procedura de pornire,

apoi începeți cu doze de 1 picătură pentru acest pas. Dacă urmați Protocolul 1000, luați o doză de 3 picături de MMS1 în fiecare oră, alternați doza respectivă cu doza de argilă. Sau, dacă urmați Protocolul 2000, luați o doză de 5 picături de MMS1 în fiecare oră, alternați doza respectivă cu doza de argilă. Alterna

fiecare oră timp de opt ore. Aceasta ar fi 4 doze de MMS1 și 4 doze de argilă în fiecare zi.

- q Faceți dozele alternative timp de două zile. Dacă sunteți pe acest pas și vedeți îmbunătățiri, continuați-l (atâta timp cât există o îmbunătățire de vreun fel) până când sunteți complet bine. Dar, dacă ajungeți într-un punct în care mergeți câteva zile fără niciun fel de îmbunătățire, mergeți la Pasul 4 de mai jos.

### **Informații importante suplimentare pentru pasul 3**

† Dacă utilizați Protocolul 1000 Plus și adăugați DMSO la dozele MMS1 în momentul în care ați început să luați argilă, puteți continua să adăugați DMSO la dozele MMS1 în timp ce efectuați Pasul 3 de mai sus.

† Cu toate acestea, dacă ați participat la Protocolul 2000, nu continuați cu MMS2 în timpul în care luați argilă și MMS1 conform pasului 3 de mai sus - pur și simplu continuați cu cantitatea de MMS1 pe care o luați în momentul în care ați început argila, fie ea 5 -dozele picătură, dozele de 7 picături etc.

### **Pasul 4**

În acest pas, veți lua argila și MMS1 în aceeași doză. Când amestecați argila într-o doză MMS1, vă sugerez utilizarea apei minerale cu gaze (apă carbogazoasă). Acest lucru se datorează faptului că carbonatarea în apa minerală cu gaze tinde să protejeze și să conserve MMS1, deoarece este

amestecat cu argila. Argila tinde să minimizeze rezistența MMS1 în timp, dar amestecând-o cu apă cu gaze, nu o va reduce la fel de repede.

Pentru a explica în continuare de ce luarea argilei amestecate cu MMS1 poate fi benefică: mucegaiul aproape întotdeauna suprimă sistemul imunitar, permițând astfel altor agenți patogeni să se impună. Cred că în acest caz, ceilalți agenți patogeni nu pot fi depășiți de MMS1, deoarece atunci când mucegaiul este prezent

le oferă o anumită „protecție”. Astfel, dacă eradicăm mucegaiul cu lut, pe măsură ce ceilalți agenți patogeni își pierd „protecția împotriva mucegaiului”, MMS1 este capabil să le distrugă și pe acestea.

- q Într-un pahar curat și uscat, activați picăturile MMS, utilizând aceeași cantitate de picături pe care le luați la pasul 3.
- q Adăugați imediat 2 uncii / 60 ml de apă minerală cu gaze (apă carbogazoasă), urmată de 1 linguriță de argilă. Mi se pare că ajută să „stropiți” lutul în pahar în timp ce amestecați lichidul. Se va spuma puțin, nu lăsați asta să vă sperie, asigurați-vă că aveți un pahar suficient de mare pentru a nu se revărsa.
- q După ce lutul este presărat și amestecat complet, puteți adăuga încă 60 ml de apă carbogazoasă.
- q Bea această doză încet, dacă este posibil, pe o perioadă de cinci minute.
- q Faceți acest lucru în fiecare oră, pentru un total de opt ore timp de cel puțin o zi.

## Note

† *Argila tinde să mascheze gustul MMS1, cu toate acestea, dacă gustul este încă o problemă pentru dvs., puteți folosi o băutură răcoritoare precum Pepsi, Coca-Cola, Sprite etc., conform instrucțiunilor de la paginile 42-45 din această carte. . (Nu utilizați*

*sifon portocaliu.) Preferința mea, dacă este posibil, este apa minerală gazoasă, deoarece nu conține zahăr.*

† *Puteți face aceeași băutură cu apă îmbuteliată purificată care nu are carbonatare, va ajuta în continuare, dar nu va fi la fel de puternică ca atunci când se face cu apă carbogazoasă sau sifon.*

## Pasul 5

- q Dacă pasul 4 vă face să vă simțiți mai bine și simțiți că vă îmbunătățiți, continuați mai multe zile atâta timp cât vă îmbunătățiți, dar odată ce încetați să vă îmbunătățiți (sau dacă vă simțiți bine) încetați să luați dozele de MMS1 / argilă. Dacă aveți o problemă internă cu mucegaiul / ciuperca, argila adăugată la protocolul dvs. ar trebui să vă ajute să o eliminați. În mod normal, nu este necesar să continuați acest pas pentru o perioadă prelungită de timp, de obicei, o faceți câteva zile, dar asigurați-vă că continuați atât timp cât vedeți îmbunătățiri.

## Note

† *Dacă locuiți sau lucrați într-un loc cu multă mucegai, ar trebui să continuați să luați argila cel puțin cu o doză de întreținere de 6 picături de MMS1 și 1/2 linguriță de argilă până când ați eradicat problema mucegaiului în casa sau locul de muncă.*

† *Odată ce vă simțiți bine, puteți continua cu dozele zilnice de întreținere MMS1 (vezi pagina 200). Pe de altă parte, dacă ați încetat să vedeți îmbunătățiri și ați oprit astfel dozele de MMS1 / argilă, dar vă simțiți rău, poate fi o idee bună să vă întoarceți la protocolul pe care l-ați folosit (luând cantitatea de MMS1 și / sau MMS2 pe care îl luați înainte de a adăuga lutul), pentru o altă perioadă de timp. Aceasta ar fi pentru a curăța în continuare orice agenți patogeni sau toxine pe care argila le-a ajutat să le prindă, care încă trebuie spălate din corp, sau cele pe care mucegaiul / ciuperca le-ar fi „protejat”. S-ar putea să existe unele rămășițe de otrăvuri și agenți patogeni care sunt încă prezenți, chiar dacă mucegaiul a dispărut, prin urmare, ar trebui să continuați cu fostul protocol până când sunteți sigur că sunteți bine.*



† Dacă vă confrunțați cu mucoase în gât și / sau tuse, vă sugerez să beți dozele de lut încet timp de câteva minute, oferindu-i argilei timp să lucreze în

*gură, gât și esofag pe măsură ce coboară. De asemenea, este o idee bună să-l învârtiți în gură de câteva ori înainte de a înghiți.*

† *Când luați lut intern, asigurați-vă că intestinalele dvs. se mișcă, astfel încât să puteți elimina toxinele pe care le scoate argila. În cazul constipației, am găsit planta, Senna, ca fiind una dintre cele mai bune soluții. Este natural și exercită colonul. Senna poate fi găsită sub formă de tablete (vândute ca laxativ) în magazinele de produse naturiste și în unele țări în farmacii. Începeți cu doza recomandată și creșteți numărul de comprimate la fiecare patru ore până când veți avea succes.*

† *Am explicat mai sus că, dacă MMS1 sau MMS2 par să nu ajute o boală, se poate datora mucegaiului / ciupercilor. Cu toate acestea, există și alte motive pentru care cineva nu poate avea succes cu MMS, vă rugăm să consultați capitolul 8).*

## **Procedură externă pentru mucegai / ciupercă**

Există multe tipuri de ciuperci care se pot manifesta extern pe corp. După cum sa menționat mai devreme, un indicator că MMS1 nu va fi util apare atunci când MMS1 este pulverizat sau aplicat în alt mod pe ciupercă. Va deveni dureros și va începe să înțepe și să ardă grav. În acest caz, MMS1 va înrăutăți starea și cel mai bine este să încercați un alt mod de acțiune, cum este prezentat mai jos.

## **Instrucțiuni pentru procedura externă a mucegaiului / ciupercilor**

## **Pasul 1**

- q Se amestecă părți egale de lut cu vaselină vaselină. Alternative la vaselina sunt uleiul de cocos, uleiul de măsline sau un alt ulei purtător de bună calitate. Faceți amestecul destul de rigid, astfel încât să adere bine la zona ciupercilor.

## Pasul 2

- q Ungeți această cremă pe ciupercă și acoperiți-o cu un bandaj de tifon.
- q Dacă ciuperca este pe picioare, ungeți amestecul de argilă pe picioare, puneți șosete curate și puneți-vă pantofii dacă este necesar.

## Pasul 3

- q La fiecare patru ore, spălați zona și apoi aplicați mai mult din amestec până când ciuperca dispare.

## Note

† *În funcție de cât de sensibilă este zona pielii, poate fi dureros să spălați un amestec de vaselină. Am descoperit că vaselina cu lutul amestecat tinde să se înmoaie în piele după câteva ore. Folosiți un săpun foarte blând, dacă este posibil, făcut din ingrediente naturale (cele mai lipsite de parfumuri sunt cele mai bune, deoarece parfumul poate avea tendința de a irita pielea delicată și deteriorată) și apa caldă. Se toarnă apa încet peste zonă și se masează foarte ușor cu mâna. Uscați ușor cu un prosop curat sau un tampon de tifon.*

† *Există diverse mărci de vaselină pe piață. Recomand marca „Vaseline” (originalul, care este triplu purificat pentru a fi 100% pur) pentru amestecare cu argilă pentru a face o balsamă. Vaselina are capacitatea unică de a se uda și de a pătrunde și de a rămâne pe piele ore mai lungi decât majoritatea uleiurilor. Uneori, uleiul de cocos, uleiul*

*de măsline și alte uleiuri pot fi utilizate pentru a transporta diferite substanțe medicamentoase pe piele și a le ține acolo. Cu toate acestea, nimic nu se potrivește cu capacitatea vaselinei de a ține substanțe vindecătoare în contact cu pielea ore întregi, acționând în același timp ca agent de vindecare în sine. Utilizați diferitele uleiuri numai dacă nu puteți obține vaselină.*

## **O revizuire importantă**

HRP și Protocoalele cheie oferă diverse opțiuni. Aveți excepția de la regulă (pagina 70), unde, dacă este necesar, vă puteți muta mai repede în Protocolul 2000. Există o opțiune rapidă (pagina 82) pentru procedura de pornire. În Protocolul 2000, veți găsi cantități maxime de dozare. Toate acestea s-ar părea că indică cu atât mai multe MMS se iau cu atât mai bine. Nu este neapărat așa!

Amintiți-vă întotdeauna, este imperativ să urmați cele Trei Reguli de Aur ale MMS. Propriul corp vă va spune care este doza dumneavoastră personală ideală. Majoritatea oamenilor nu vor ajunge niciodată până aproape de dozele maxime. Acestea sunt sume maxime - nu sunt un scop. Astfel de sume pot fi necesare pentru unii, dar nu și pentru alții.

Este posibil să puteți lua o anumită cantitate de MMS, să spunem o doză de 3 picături pentru Protocolul 1000, pentru o boală. Dar apoi, pe drum, cândva, dacă trebuie să repetați proto-col, s-ar putea să găsiți că puteți rezolva doar 1 picătură pe oră, chiar dacă anul trecut ați făcut 3 picături pe oră fără nicio problemă. De ce asta? Corpurile noastre se schimbă; diferite tipuri de agenți patogeni sau toxine sau cantități diferite de agenți patogeni sau toxine pot contribui la reacții variate. Orice număr de circumstanțe și condiții pot avea legătură cu cât de mult MMS puteți tolera. Acesta este motivul pentru care este atât de important să fii atent la semnalele pe care ți le dă corpul tău și de ce vreau să repet, nu este o cursă să vezi cât de mult MMS poți lua.

Fiecare persoană este diferită, pentru unii oameni poate fi necesară o abordare rapidă sau o dozare mai mare, iar pentru alții, o dozare redusă aduce rezultate. Așa cum am menționat mai devreme, am avut unii oameni cu cancer avansat care primesc numai doze de 1 picătură de MMS în fiecare oră și doze mici de MMS2 și unii chiar mai puțin, o doză de 1/4 sau 1/2 picătură.

# **Capitolul 7**

## **HRP și Diverse**

### **Boli**

#### **Utilizarea HRP împreună cu protocoalele de sprijin pentru diferite boli**

În această carte nu este posibil să enumerăm toate bolile omenirii și nici măcar toate bolile și afecțiunile pe care le știm din feedback, pe care MMS le-a ajutat. Cu toate acestea, mai jos am enumerat unele dintre cele mai frecvente boli pentru a arăta o idee generală despre modul în care utilizăm Planul de recuperare a sănătății (Capitolul 5). Acest plan se referă la utilizarea protocoalelor cheie împreună cu protocoalele de sprijin, protocoalele suplimentare și, uneori, iarba indiană atunci când este necesar.

Este important să rețineți că, pentru a încorpora sugestiile de mai jos în rutina personală de recuperare a sănătății, trebuie să aveți o bună înțelegere a Planului de recuperare a sănătății și a modului în care acesta



funcționează. Amintiți-vă, HRP începe cu procedura de pornire și apoi se urmează succesiunea corectă a protocoalelor cheie în conformitate cu cele trei reguli de aur ale MMS (vezi paginile 83-84). În funcție de boală / boală, se adaugă și alte protocoale de sprijin și / sau protocoale suplimentare, dacă este necesar.

Am subliniat în Planul de recuperare a sănătății să încep întotdeauna cu procedura de pornire (vezi pagina 79) și apoi

treceți la Protocolul 1000. Cu toate acestea, există unele boli pe care cred că ar fi benefice după finalizarea procedurii de pornire, să faceți mai întâi Protocolul pentru mucegai / ciuperci, apoi să treceți la Protocolul 1000 și să continuați cu restul HRP ca prezentat în capitolul 5. Acest lucru se datorează faptului că mucegaiul și ciuperca reprezintă adesea o mare parte a problemei. În lista de mai jos am menționat ce boli ar fi benefice pentru a merge la Protocolul de mucegai / ciupercă după finalizarea procedurii de pornire și înainte de a face protocolul 1000. Cu toate acestea, de fiecare dată când există o întrebare cu privire la ce ar trebui să faceți sau ce ar trebui să faceți începeți cu, începeți întotdeauna cu procedura de pornire și urmați HRP standard. De fiecare dată când simțiți că nu faceți progrese suficiente în timpul programului HRP, puteți trece oricând la Protocolul Mold / Fungus pentru o anumită perioadă de timp.

**Dureri:** Faceți Protocolul 6 și 6. Apoi continuați cu Procedura de pornire și continuați urmarea HRP. Simultan, în timpul procedurii de pornire utilizați flaconul de pulverizare MMS1, împreună cu DMSO. Pulverizați MMS1 pe zona durerii urmată de DMSO (fie pulverizați DMSO pe, fie frecați-l manual) de 4 sau 5 ori pe zi. Continuați cu HRP până când durerile dispar. Uрмаți întotdeauna cele trei reguli de aur ale MMS.

**Reflux de acid:** Începeți cu procedura de pornire. Apoi treceți la Protocolul Mold / Fungus, mai întâi, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur). Luați o marcă bună de probiotice la orice masă care este separată cu cel puțin două ore de dozele MMS, timp de cel puțin o lună. Continuați până bine.

**Alergii:** Începeți cu procedura de pornire și continuați urmând HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur) până când dispariția alergiilor.

**Apendicită:** Mai întâi faceți Protocolul 6 și 6 (consultați pagina 169). Dacă există încă durere la o oră după ce ați luat a doua doză de 6 picături, este posibil să fie nevoie să mergeți la spital. Cu toate acestea, dacă durerea a dispărut în cea mai mare parte, în acest caz treceți la Protocolul 1000 și începeți să luați o doză de 3 picături de MMS1 în fiecare oră. Deoarece apendicele este conectat la sistemul digestiv, acest lucru va menține un flux de MMS1 care merge direct la apendicele și îl va ajuta să se vindece. Acordați o atenție deosebită celor trei reguli de aur ale MMS. Dacă vă simțiți mai bine, continuați cu Protocolul 1000 timp de trei săptămâni pentru a dezintoxica sistemul. Dacă durerea revine, poate fi necesar să mergeți la spital.

**Artrită:** Începeți HRP. În același timp, în timpul procedurii de pornire, utilizați flaconul de pulverizare MMS1, împreună cu DMSO. Pulverizați MMS1 pe zona durerii urmată de DMSO (fie pulverizați DMSO pe, fie frecați-l manual) de 4 sau 5 ori pe zi. Continuați să urmați planul HRP prin Protocoalele cheie, după cum este necesar. Artrita vine în multe grade diferite de intensitate. Problema poate fi remediată prin urmarea procedurii de pornire și a Protocolului 1000 sau poate fi necesară continuarea cu procedura completă de adăugare a tuturor diferitelor protocole de sprijin, așa cum sunt prezentate în secțiunea Boli considerate în general incurabile (vezi pagina 117). Nu uitați să urmați cele Trei Reguli de Aur. Continuă până bine.

**Astm:** Începeți cu procedura de pornire. Apoi, treceți mai întâi la Protocolul pentru mușgai / ciuperci, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Boală autoimună:** Boala autoimună afectează milioane și milioane de oameni din întreaga lume. Există până la 80 de tipuri de boli autoimune (și de numărare). Unele dintre cele mai frecvente variază de la lupus, la boala molidului celiac, la bolile inflamatorii intestinale, la psoriazis, iar lista continuă. MMS a fost cunoscut

pentru a remedia aceste și multe altele. Începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). Multe boli autoimune au simptome similare, ceea ce le face foarte dificil de diagnosticat. De asemenea, este posibil să aveți mai mult de unul în același timp. Dacă în orice moment al programului HRP nu observați progrese suficiente, poate fi util să vă opriți și să faceți Protocolul pentru mușcări / ciuperci și să vedeți dacă acest lucru vă ajută. În cazul unor boli autoimune, poate fi, de asemenea, necesar să adăugați protocoale de sprijin, dacă este necesar, așa cum este sugerat în secțiunea Boli considerate în general incurabile (vezi pagina 117).

**Candida:** Începeți cu procedura de pornire. Apoi, treceți mai întâi la Protocolul pentru mușcări / ciuperci, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine. Clisme și / sau colonii simultan (vezi paginile 148-153) pot fi adăugate ori de câte ori cineva se simte pregătit, de obicei nu pornește până când nu ai început Protocolul 1000.

**Răceală:** Când simțiți că apare o răceală, faceți Protocolul 6 și 6. Dacă frigul a dispărut la o oră după cea de-a doua doză de 6 picături, asta este tot ce este necesar pentru o răceală. Dacă frigul persistă după ce ați făcut Protocolul 6 și 6, începeți procedura de pornire și continuați HRP (respectând în permanență cele Trei Reguli de Aur) până la bine. (Este important să rețineți că organismul folosește uneori răceala obișnuită pentru detoxifiere. Când este cazul, nicio cantitate de MMS sau orice medicament nu va opri rapid răceala - va trebui pur și simplu să-și urmeze cursul. În acest caz, faceți nu încetați să luați MMS, deoarece în cazul MMS, frigul se va lămurii de obicei mult mai devreme decât în mod normal - chiar dacă este tipul de răceală pe care corpul îl folosește pentru detoxifiere,

care poate dura două sau trei săptămâni pentru a fi depășit complet.

### **BPOC (boală pulmonară obstructivă cronică):**

Începeți cu procedura de pornire. Apoi mergeți la

Protocolul pentru mucegai / ciuperci, mai întâi, înainte de a continua la Proto-col 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur). Când ați terminat cu Protocolul de mucegai / ciupercă, simultan cu începerea Proto-col 1000, porniți Protocolul pulmonar (Cupa), consultați pagina 159.

**Boala Crohn:** Începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). Clismele și, dacă este posibil, unii colonici, vă pot ajuta. În cazul acestei boli, începeți să folosiți clismele sau coloniștii de îndată ce sunteți obișnuiți să faceți protocoalele. Cel mai bine este să începeți cu o clismă sau două pentru a vedea cum merge (vezi pagina 148). Dacă observați îmbunătățiri, continuați atât timp cât vă descurcați mai bine. Nu faceți clisme sau coloniști pentru boala Crohn fără a include picături MMS1. Dacă prima clismă merge bine, puteți crește numărul de picături MMS1 în următoarele clisme conform instrucțiunilor. Dacă faceți colonii, urmați instrucțiunile de la pagina 152. Rețineți că un colon este într-adevăr o super clismă și curăță colonul mai eficient. Amintiți-vă că cele trei reguli de aur ale MMS se aplică în continuare,

**Febra Dengue:** Urmăți protocolul pentru febra dengue la pagina 190.

**Probleme dentare:** Efectuați procedura de periere a dinților (consultați pagina 73). În același timp, începeți cu Procedul de pornire și continuați urmând HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur).



**Depresie:** Începeți cu procedura de pornire și continuați urmând HRP (respectând întotdeauna cele Trei reguli de aur) până la bine. Dacă este necesar, continuați cu programul pentru secțiunea Boli considerate în general incurabile (vezi pagina 117).

**Diabet (tip 1 și 2):** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până bine.

**Probleme digestive:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine. În plus, luați un probiotic bun cu mesele consumate cu două ore în afară de dozele MMS, ceea ce înseamnă cu două ore înainte de a începe administrarea MMS și cu două ore după ultima doză a zilei, timp de cel puțin o lună.

**Infecții ale urechii:** Faceți imediat protocolul Ear (vezi paginile 139-141). În același timp, începeți cu procedura de pornire și, dacă este necesar, continuați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur) până la bine.

**Eczemă:** Începeți pulverizarea zonei afectate cu flaconul de pulverizare MMS1 (pagina 76) și aplicați DMSO deasupra. În același timp, începeți procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). Dacă spray-ul MMS1 arde și înțepă, este o indicație că mușgaiul / ciuperca poate fi prezent. În acest caz, urmați instrucțiunile din Protocolul pentru mușgai / ciuperci (vezi pagina 99) pentru depășirea mușgaiului și a ciupercilor pe piele. Continuați să urmați HRP până când este bine.

**Disfuncție erectilă:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Boală oculară:** Faceți imediat Protocolul ocular (vezi pagina 137). În același timp, începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur) până la bine.

**Fibromialgie:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Hepatita A, B, C:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Herpes (toate tipurile):** Începeți cu procedura de pornire. Apoi, treceți mai întâi la Protocolul pentru mușgai / ciuperci, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Tensiune arterială crescută:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**HIV / SIDA:** Începeți cu procedura de pornire și continuați urmând HRP (respectând întotdeauna cele Trei reguli de aur) până la bine.

**Boli infecțioase:** Acestea pot fi cauzate atât de viruși, fie de bacterii, și ambele pot fi în interiorul corpului și pe piele. Pneumonia, meningita și diareea, de exemplu, pot fi cauzate fie de viruși, fie de bacterii. În plus, există mii de boli ale pielii cauzate de viruși și bacterii, exemple sunt erupțiile cutanate ale varicelei, roseola și zona zoster. Medicamentele antibacteriene pot opri uneori bolile bacteriene [infecții], dar medicina nu a dezvoltat încă nimic pentru a opri infecțiile virale. Din fericire, se știe că MMS oprește atât bolile virale, cât și cele bacteriene.

Pentru infecții virale sau bacteriene, începeți cu procedura de pornire și continuați să respectați HRP (respectând întotdeauna cele Trei reguli de aur) până la bine. În cazul bolilor virale sau bacteriene de pe piele, utilizați flaconul MMS1 sau MMS2 spray (vezi pagina 76).

indicație că mucegaiul sau ciuperca sunt prezente. În acest caz, urmați instrucțiunile pentru procedura externă de mucegai / ciupercă de la pagina 106.

**Afecțiuni renale sau hepatice:** Începeți cu Procesul de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Boala Lyme:** Începeți cu procedura de pornire. Apoi, treceți mai întâi la Protocolul pentru mucegai / ciuperci, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Malarie:** Urmăți Protocolul împotriva malariei (vezi pagina 180).

**MRSA:** Urmăți Protocolul MRSA (vezi pagina 196).

**Obezitate:** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine. Pot fi necesare unele modificări ale dietei și ale stilului de viață.

**Paraziți:** Începeți cu procedura de pornire și continuați urmând HRP (respectând întotdeauna cele Trei reguli de aur) până la bine.

**Prostat (PSA ridicat):** Începeți cu Procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele Trei Reguli de Aur) până la bine.

**Probleme sinusale:** Faceți procedura de nas MMS1. În același timp, începeți cu procedura de pornire și, dacă este necesar, continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur) până bine.

**Probleme de piele:** Începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). Utilizați o sticlă de pulverizare MMS și pulverizați

zona afectată de până la 5 ori pe zi. Adăugați DMSO imediat deasupra spray-ului și frecați-l ușor. (Adăugați DMSO deasupra spray-ului doar dacă este MMS1. Nu utilizați DMSO cu o sticlă spray MMS2, vezi pagina 78).

**Tumori și chisturi:** Începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). Dacă tumoarea sau chistul se află în exteriorul corpului, utilizați o sticlă de pulverizare MMS de 5 ori pe zi, inclusiv folosind DMSO de fiecare dată. (Nu utilizați DMSO dacă utilizați o sticlă de pulverizare MMS2 (consultați pagina 78). Patch-ul MMS1 / DMSO poate fi aplicat și tumorilor și chisturilor externe.

**Infecții ale tractului urinar:** Începeți cu procedura de pornire și continuați să urmați HRP (respectând întotdeauna cele trei reguli de aur). În plus, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, utilizați un picurător de ochi pentru a injecta ușor în tractul urinar (prin deschiderea din capul penisului pentru bărbați și prin deschiderea urinară [deschiderea exterioară a uretrei] pentru femei), stoarceți lichidul MMS1 dintr-o sticlă de pulverizare MMS1 realizată conform instrucțiunilor pentru o sticlă de pulverizare MMS1 (vezi paginile 76-77). Acest lucru se poate face de 4 sau 5 ori pe zi.

## Boli

### Considerat în general incurabil

Există multe boli considerate, în general, incurabile. Cu toate acestea, am primit nenumărate rapoarte de la oameni din întreaga lume care, prin utilizarea MMS, au fost sănătoși din plin de multe dintre aceste



boli presupuse incurabile. Unele dintre acestea includ SLA (boala Lou Gehrig), Alzheimer, autism, cancer (tot felul), leucemie, scleroză multiplă, Parkinson, poliomielită, artrită reumatoidă și multe alte boli care pun viața în pericol.

Dacă dumneavoastră sau o persoană dragă suferiți de o boală incurabilă sau care pune viața în pericol, vă sugerez următoarele:

➤Începeți cu procedura de pornire. Apoi, treceți mai întâi la Protocolul Mold / Fungus, înainte de a continua la Protocolul 1000 și de a urma HRP după cum este necesar. Respectați întotdeauna cele Trei Reguli de Aur ale MMS, care vă spun când trebuie să mergeți la pasul următor sau la protocolul următor. Continuați să mergeți înainte prin Protocolul 3000, dacă este necesar.

† Dacă ajungeți la Protocolul 3000 și încă nu sunteți complet bine, atunci începeți să adăugați protocoalele de suport. În acest moment, ideea este să încercați să introduceți MMS în organism în mai multe moduri și mai variate. Gândiți-vă la aceasta ca la lovirea bolii din orice unghi posibil. Ideea este să nu adăugați fiecare protocol de suport în aceeași zi. Dar încercați să adăugați din ce în ce mai mult pe măsură ce mergeți. Dacă nu puteți face unele dintre aceste lucruri la început, nu vă faceți griji, pur și simplu țineți cont până când le faceți pe toate. Când începeți să adăugați protocoale de sprijin, continuați să luați doze orale MMS1 și MMS2 și să aplicați MMS1 și DMSO extern, în funcție de locul în care vă aflați în progres cu protocoalele cheie. Amintiți-vă, un principiu foarte important, adăugați, dar nu luați ceea ce faceți deja. Urmăriți întotdeauna cele trei reguli de aur ale MMS.

**Notă:** *În cea mai mare parte, vă sugerez să adăugați pe Asistență Protocoale în ordinea enumerată mai jos. Există câteva excepții de la această regulă, în funcție de boala dumneavoastră, de modul în care vă simțiți și cum reacționează corpul dumneavoastră. Vă rugăm să citiți Protocoale de suportare - Când să le adăugați*

*(pagina 71), pentru mai multe detalii despre acest lucru.*

**Băi:** Faceți băi complete cu MMS1. În câteva zile treceți la băile MMS2, dacă puteți. Dacă vedeți necesitatea continuării băilor MMS, alternați băile între MMS1 și MMS2 - vedeți ce funcționează cel mai bine pentru dvs. (Vezi paginile 142-

148.) Dacă băile pline nu sunt fezabile, faceți baia de picioare. Poate doriți să faceți o combinație a celor trei băi diferite. Observați progresul cu băile și urmați ceea ce funcționează pentru dvs.

**Clisme:** De asemenea, puteți încerca două clisme pe zi. În cazul bolilor grave, recomand, de asemenea, cel puțin două coloni pe săptămână, care înlocuiește clismele și este mai mare decât o clismă (vezi paginile 148-153).

**Protocol MMS Bag:** Încercați să faceți mai multe dintre acestea pe săptămână (consultați pagina 156).

**Protocolul Douche:** Femeile pot adăuga și dușuri în planul lor de recuperare a sănătății (vezi pagina 153).

**Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO:** În funcție de care este problema, de exemplu, în cazul tumorilor externe, poate doriți să faceți patch-ul MMS1 / DMSO în acest timp.

**Ierbă indiană:** Dacă, după ce ați făcut toate protocoalele descrise în Planul de recuperare a sănătății, împreună cu protocoalele de sprijin, nu v-ați recuperat sănătatea, atunci folosirea plantei indiene este următorul curs de acțiune (a se vedea capitolul 10).

Acesta poate părea un program dur. Veți ști dacă vă îmbunătățiți sau nu. Este o muncă grea și necesită hotărâre, dar mulți oameni au reușit la asta și și-au depășit boala specială și, prin urmare, duc o viață fericită și productivă.



**Lyme Success:** În martie trecut am primit ceea ce credeam că este gripa. A fost cea mai gravă gripă pe care am avut-o vreodată în viața mea. Mă doare din fiecare por al corpului meu. Am început să iau mașină, dar nu a ajutat. De când aveam MMS în casă, am decis să încerc. Ei bine, asta a făcut trucul! M-am simțit din nou bine în scurt timp. Am încetat să o iau, deoarece păream că mă întorc la vechiul meu eu. După câteva zile, simptomele au revenit și atunci am realizat că mă confrunt cu o altă boală și nu cu gripa. A fost nevoie de multă muncă investigativă pentru a descoperi că am boala Lyme. Medicul meu nu a fost absolut deloc de ajutor. De fapt, ea a fost o piedică. Am intrat online și am folosit un verificator de simptome și mi-a indicat că probabil am MS sau Lyme. Întrucât MMS-ul a ajutat, am început să-l folosesc din nou și am cercetat cât de mult am putut despre cum să-mi tratez simptomele. Am început protocolul 2000. Am luat legătura și cu un medic naturist din orașul meu pentru asistență. Spre marea mea surpriză, ea a susținut utilizarea MMS. Ea a recomandat utilizarea MMS într-o clismă care a ajutat foarte mult. Folosesc și MMS2. Ambele protocoale funcționează bine împreună. Dacă nu ar fi MMS, aş crede că aş fi în spital luptându-mă pentru viața mea chiar acum. Simptomele mele erau severe și durerea era oribilă. MMS este un miracol în opinia mea! —Brenda B., Canada



**Cancer la gât:** Tratarea unui tip cu cancer la gât. Numărul său de sânge a revenit, s-a îngrășat puțin, iar medicul său a spus orice face pentru a continua să o facă, deoarece funcționează. UPDATE: Tipul cu cancer de gât a fost complet eliminat de cancerul de gât. Sunt atât de încântat de el și de faptul că îi face pe oameni mai buni. - CP, Statele Unite

# Capitolul 8

## Analiză a realității

### **Motive pentru care este posibil să nu aveți un succes complet cu MMS**

#### **1. Nu respectați protocolul suficient de atent:**

Aceste protocoale sunt rezultatul a 20 de ani de a ajuta oamenii să-și recupereze sănătatea. Există motive pentru procesul exact dat. Cei care încearcă să schimbe procesul sau care nu sunt sârguincioși în respectarea exactă a procedurilor pot eșua. Dacă doriți să aveți o stare bună de sănătate sau doriți să trăiți dacă aveți o boală letală, vă rugăm să urmați exact protocoalele.

Este important să rețineți că există multe site-uri de internet care au diverse sugestii de protocol și dozare (folosind MMS) pentru o multitudine de probleme de sănătate. Multe dintre aceste site-uri nu sunt corecte și oferă informații care nu sunt ceea ce am constatat că sunt eficiente în ultimii 20 de ani. Pur și simplu nu avem niciun control asupra tuturor celor care au sărit pe căruciorul MMS și care au publicat informații incorecte. Vă îndemn să urmați instrucțiunile din această carte, care sunt cele mai actualizate informații



ale mele. Dacă doriți să obțineți mai multe informații de pe internet, asigurați-vă că provin de la un site de încredere. (A se vedea pagina de referință din spatele acestei cărți.)

## **2. Schimbarea dozării când se îmbunătățește:**

Amintiți-vă, când observați unele îmbunătățiri mari sau mici, nu schimbați nimic, ci continuați să faceți

12

1

ceea ce faceți până când nu mai există îmbunătățiri pentru o perioadă de cinci până la șase zile. Ceea ce se întâmplă adesea este că atunci când cineva simte că se îmbunătățește, el va gândi: „Dacă mă îmbunătățesc cu această cantitate de MMS, mai multe MMS mă vor ajuta să devin mai rapid mai rapid”. Deci, chiar dacă se îmbunătățește, își mărește doza. Când se întâmplă acest lucru, MMS1 suplimentar poate distruge prea mulți agenți patogeni simultan, provocând o reacție Herxheimer care ar putea provoca dureri de cap, oboseală extremă, greață, vărsături și / sau diaree. Persoana se poate descuraja și poate renunța la administrarea MMS cu totul. Așadar, amintiți-vă, atâta timp cât vă îmbunătățiți, nu schimbați nimic și mergeți la următorul protocol superior numai când nu ați văzut nicio îmbunătățire pentru o perioadă de cinci până la șase zile.

**3. Neutralizarea MMS în corp:** Cafeaua, cafeaua decofeinizată, ceaiul cu cofeină, unele ceaiuri din plante, laptele, alcoolul, apa de cocos, sucul de portocale, sucul de mandarină și toate sucurile cu vitamina C sau acid ascorbic adăugat, vor neutraliza direct MMS. (Vitamina C care se găsește în mod natural în fructe și legume în cantități moderate este OK.) Alimentele și suplimentele care au cantități excepțional de mari de antioxidanți, cum ar fi moringa, nu trebuie luate în timp ce se utilizează protocoalele MMS. (Vezi paginile 42-45, 52, 56.)

**4. Produse farmaceutice:** Până în acest moment, nu am observat nicio reacție cu MMS și medicamente, deși nu putem garanta că acest lucru va fi întotdeauna cazul. Decizia de a lua sau de a nu lua medicamente este una personală. Medicamentele afectează corpul fiecărei persoane în moduri diferite. Nu putem spune în toate cazurile că administrarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă va inhiba recuperarea sănătății cu MMS. Cu toate acestea, am văzut o tendință care continuă să ia produse farmaceutice în timp ce

faceți protocoalele MMS de multe ori va încetini recuperarea sănătății sau o va preveni pe toate împreună. Dacă cineva a luat o decizie de a nu lua produse farmaceutice, ocazional este posibil să fie nevoie să continue cu un medicament farmaceutic (în timp ce se află în protocolul MMS) pentru

mai multe zile sau o săptămână sau mai mult (în funcție de situație și de tipul și cantitatea de medicamente de care trebuie să vă dezlipiți). Acest lucru este pentru a preveni apariția unor reacții rele în primele câteva zile din cauza „șocului medicamentos” atunci când medicamentele sunt oprite pentru prima dată. De obicei, cel mai bine este să renunțați încet, reducând medicamentul în etape. Profesionistul medical calificat alternativ potrivit vă poate ajuta să vă dezlegați în siguranță de medicamente.

### **5. Calitatea și puterea MMS-ului și activatorului:**

Uneori s-ar putea cumpăra sticle de MMS care nu au potența necesară (de obicei dintr-o sursă neaprobăată) și astfel picăturile vor face o doză mai slabă. O modalitate de a vă asigura că doza este puterea corectă este să vă asigurați că picăturile capătă culoarea chihlimbarului după amestecarea picăturilor MMS și activator și numărarea a 30 de secunde (vezi pagina 39); dacă nu ceva nu este în regulă. Dacă nu devin chihlimbar, ci doar se îngălbenesc, utilizați acele picături doar câteva zile până când veți obține ingrediente bune - MMS și activator. Fie unul, fie ambele ar putea fi rele. Dacă picăturile nici măcar nu se îngălbenesc, nu le folosiți.

### **6. Luarea de suplimente în timp ce utilizați protocoalele MMS:**

Vitaminele, mineralele și alte suplimente pe care cineva le-ar putea adăuga în dietă, ar trebui suspendate pentru o perioadă de timp în conformitate cu protocoalele MMS. Aceasta include în special alimentele cu cantități mari de antioxidanți. MMS elimină otrăvurile și distruge biofilmele care protejează agenții patogeni. Apoi ucide agenții patogeni și acest lucru ajută la vindecare. Suplimentele nu numai că ajută organismul, ci și hrănesc agenții patogeni. Din păcate, de cele mai multe ori agenții patogeni primează nutriția din suplimente și astfel se furnizează substanțe nutritive bolii, încercând totodată să o omoare. Din acest motiv,

suplimentele pot încetini recuperarea sănătății sau chiar o pot opri cu totul. Pe de altă parte, după ce unul a fost pe un protocol timp de două sau trei săptămâni și a respectat toate regulile, pe măsură ce continuă protocolul MMS, atunci ar putea lua în considerare luarea de suplimente.

dacă simt nevoia. Amintiți-vă, separați orice suplimente de dozele MMS cu cel puțin două ore. Urmați exemplul corpului și stabiliți dacă suplimentele ajută sau împiedică MMS să funcționeze pe deplin. Vă rugăm să citiți secțiunea suplimentului nutrițional care începe la pagina 53 pentru o explicație completă.

**7. Terapii anterioare:** Am venit la noi pe ultimul picior care a avut mai multe tratamente de chimioterapie, radiații și intervenții chirurgicale, ceea ce face dificilă refacerea sănătății. MMS are sarcina suplimentară de a elimina medicamentele toxice pentru chimioterapie. În acest caz, de obicei sistemul imunitar este compromis, iar îndepărtarea diferitelor organe face recuperarea puțin mai lungă sau adesea considerabil mai lungă. Prin urmare, terapiile anterioare, în funcție de cantitate și în ce măsură au urmat, pot prelungi recuperarea sănătății. Este posibil să trebuiască să țineți cont de el mai mult decât vă așteptați.

**8. Atitudinea poate încetini vindecarea:** Este de înțeles când sunteți bolnav și vă simțiți putrezit că puteți cădea în plângere sau în a fi negativ. Cu toate acestea, multe studii au dovedit că a avea o atitudine pozitivă și a vă plânge la minimum contribuie la o recuperare mai rapidă. Atitudinea foarte rar împiedică MMS să funcționeze altogeth-er, dar o atitudine slabă poate afecta sistemul imunitar și poate încetini procesul de vindecare, uneori considerabil.

**9. Testarea sângelui:** De multe ori testele de sânge pot face să pară că MMS nu funcționează. Cel mai bun mod de a determina dacă MMS funcționează este prin rezultate tangibile. Cum te simți? Crești sau slăbești după cum este necesar? Rănile se vindecă și erupțiile cutanate dispar? Este restabilit sentimentul general al

bunăstării? Dacă aveți toate aceste semne pozitive și totuși un test de sânge arată o problemă, testul este probabil greșit.

În cazul HIV / SIDA, hepatitei C și a altor boli, de multe ori la primele teste în timpul și după curățarea MMS, numărul virusului sanguin poate crește extrem de mult. Acesta este întotdeauna un bun indicator al faptului că MMS funcționează, iar numărul va scădea în curând. Ceea ce se întâmplă este că MMS distruge virușii. Cu toate acestea, celulele albe din sânge continuă să absoarbă virusurile moarte sau pe moarte. Când se întâmplă acest lucru, celulele se umplu din ce în ce mai mult până când izbucnesc, eliberând cantități uriașe de viruși morți / morți. Acești viruși morți / morți sunt numărați în încărcătura virală, dar toți sunt în cele din urmă curățați din sânge în mod natural de către corp. Când acest proces de curățare este finalizat, atunci sarcina virală va scădea la zero. Dacă cineva care folosește MMS nu înțelege acest lucru, poate crede că nu se îmbunătățește și poate înceta să utilizeze MMS.

Trebuie să lăsați o cantitate suficientă de timp înainte ca analizele de sânge să citească cu exactitate, iar acest lucru depinde de boală. Amintiți-vă, de asemenea, multe laboratoare fac greșeli, prin urmare mai multe opinii sunt adesea o alegere înțeleaptă. Dar, mai presus de toate, trec prin ceea ce simți. Dacă energia este restabilită și rănilor dispar, puteți ști destul de mult că sunteți vindecați sau cel puțin că vă îmbunătățiți.

**10. Vaccinuri:** Se știe că vaccinurile conțin adesea agenți patogeni slabi ai multor tipuri de boli. Multe dintre aceste boli pot afecta activ organismul. Pe lângă boală, este de asemenea cunoscut faptul că majoritatea vaccinurilor conțin mercur și alte substanțe chimice extrem de otrăvitoare și, în majoritatea cazurilor, aceste toxine încetinesc vindecarea considerabil. Cu toate acestea, am văzut aproape întotdeauna că protocoalele MMS depășesc în cele din urmă otrăvurile cauzate de vaccinuri și sănătatea este apoi recuperată. Dacă trebuie să vă vaccinați în timp ce utilizați un protocol MMS, vă



sugerez să urmați procedura de vaccinare în ziua în care primiți vaccinul (vezi pagina 173) și apoi să continuați cu protocolul MMS pe care îl utilizați. În general, MMS poate depăși efectele negative ale majorității sau tuturor vaccinurilor.

**11. Presiunea familiei și a prietenilor:** Familia și prietenii îi pot descuraja pe aceștia să nu facă protocoalele, fiind negativ cu privire la ceea ce este luat, precum și îndoiindu-se că va funcționa chiar. Această influență externă poate determina adesea să se oprească administrarea MMS fie în întregime, fie să facă corect protocoalele.

**12. Otravuri de mediu:** Există sute, dacă nu chiar mii de surse de otrăvuri în împrejurimile noastre cu care toți intrăm în contact în mod regulat. Dacă cineva încearcă să restabilească sănătatea și este în permanență în contact cu toxinele, sistemul imunitar al organismului poate fi ocupat cu încercarea de a elimina aceste toxine și vindecarea poate fi încetinită sau oprită cu totul. În acest caz, este posibil să fie necesar să se îndepărteze de situația toxică înainte de a avea loc vindecarea completă.

**13. Mucegai / ciuperca:** Mucegaiul este un tip de ciupercă. Există unele tipuri de mucegai care nu sunt afectate de MMS. Acestea afectează atât interiorul corpului, cât și exteriorul. Mucegaiul / ciuperca poate pătrunde în gură și în sistemul digestiv și poate afecta foarte mult sănătatea cuiva, precum și a crea răni și erupții cutanate pe piele. Când MMS nu este eficient împotriva anumitor tipuri de mucegai / ciupercă, argila poate remedia deseori problema. Este important să rețineți că puteți distinge mucegaiul / ciuperca de alte răni și agenți patogeni prin faptul că atunci când se aplică MMS, acesta nu numai că înțepă și arde, dar poate, de asemenea, să agraveze starea. Argila aztecă, numită și argilă bentonitică sau argilă montmorilinită, va ucide de obicei mucegaiul / ciuperca pe care MMS nu o va eradica. (Consultați pagina 99 pentru Protocolul complet al mucegaiului / ciupercilor, inclusiv detalii suplimentare despre cum să recunoașteți mucegaiul în sau pe corpul dvs.)

**14. Reinfectie:** Doar pentru că o persoană și-a redat complet sănătatea, nu înseamnă că nu se poate infecta din nou. Dacă cineva continuă un stil de viață sau obiceiuri

care a cauzat boala pentru a începe, sau este expus continuu la o anumită boală sau toxină din nou după ce și-au restabilit sănătatea, atunci poate apărea o re-infecție. Luați în considerare o schimbare a stilului de viață și apoi repetați protocolul.

**15. Auto-înșelăciune:** Oamenii se pot înșela credând că sunt bine atunci când sunt de fapt bolnavi. Trebuie să acceptăm realitatea și să ne asumăm responsabilitatea personală pentru sănătatea noastră și să continuăm cu protocoalele până când toate simptomele dispar, indiferent de cât timp durează.

**16. Sârme și microunde de înaltă tensiune:** De mult s-a crezut că cei care trăiesc aproape de fire de înaltă tensiune și turnuri cu microunde au o incidență mult mai mare a cancerului și a bolilor decât cei care nu. Cel puțin firele și turnurile sunt suspecte. Practicanții de medicină alternativă sfătuiesc adesea persoanele bolnave să se îndepărteze de locațiile din apropierea acestor fire și turnuri. Unii oameni mi-au spus că s-au simțit mai bine după ce s-au mutat. Deci, dacă cineva constată că se simte rău după ce a făcut un protocol și totuși se află în apropiere de aceste lucruri, acesta este un lucru de luat în considerare. Chiar și modificările simple pot ajuta, cum ar fi utilizarea internetului prin cablu în loc de WiFi în casă și utilizarea telefoanelor mobile setate astfel încât să funcționeze pe difuzor în loc să fie ținute până la ureche.

Există o mulțime de controverse cu privire la siguranța sau pericolele alimentelor încălzite sau gătită într-un cuptor cu microunde. Dacă aș încerca să-mi redau sănătatea, personal m-aș gândi de două ori înainte de a avea un cuptor cu microunde acasă. Dacă nu faceți progrese suficiente cu protocoalele MMS și utilizați un cuptor cu microunde, poate doriți să întrerupeți utilizarea acestuia pentru o perioadă de timp și să

vedeți dacă vă ajută. Iată câteva linkuri către articole pe care le-ați putea găsi utile pentru a lua propria decizie cu privire la utilizarea cuptorului cu microunde:

***Pericolele ascunse ale gătitului cu microunde***, de un-

Tony Wayne și Lawrence Newell:

<http://www.health>

[science.com/microwave\\_hazards.html](http://www.healthscience.com/microwave_hazards.html)

***Mercola pe cuptoare cu***

***microunde***: <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/18/microwave-hazards.aspx>

***Cuptoarele cu microunde distrugeți valoarea nutritivă a dumneavoastră***

***Alimente***, de Mike Adams:

[http://www.naturalnews.com/021966\\_microwaves\\_microwave\\_ovens.html](http://www.naturalnews.com/021966_microwaves_microwave_ovens.html)

**17. Clor și fluor:** Aceste două otrăvuri se află în multe sisteme publice de apă din întreaga lume. În locațiile în care nu li s-a permis să arunce în apă deșeurile industriale numite fluor, au putut folosi clor. Ambele sunt toxice și ambele sunt cancerigene (cauzatoare de cancer). Cel puțin, urmarea unui protocol MMS folosind apă care conține fluor sau clor poate încetini procesul de recuperare. Vă rugăm să luați în considerare utilizarea apei cu osmoză inversă, a apei distilate sau a apei îmbuteliate care nu are niciunul dintre aceste otrăvuri adăugate sau utilizate în vreun fel.

**18. Patologie orală:** Un impediment substanțial pentru vindecarea completă este adesea patologia orală. Bacteriile mortale anaer-obice există în mod obișnuit în canalele radiculare, sub coroane și chiar în locurile de extracție anterioare (cauzând degradarea osului maxilarului numite cavitații). Majoritatea acestor bacterii nu pot fi atinse de sistemul imunitar și pot provoca infecții de grad scăzut care persistă ani de zile, provocând în cele din urmă afecțiuni cardiace, boli autoimune, artrită și multe altele. De multe ori patologia orală care cauzează diferite probleme în corp poate fi depășită prin periajul adecvat cu MMS1 și DMSO (vezi pagina 73), cu toate acestea, în cazuri rare, acest lucru nu va rezolva problema și, în acest caz,

consultarea cazului cu un dentist biologic de nivel înalt poate fi necesară pentru a ajuta MMS1 să restabilească complet sănătatea.

**19. Biofilm:** Dacă un biofilm este prezent în organism, acesta poate prelungi sau preveni vindecarea. Dacă cineva nu este conștient că este prezent un biofilm, s-ar putea crede că MMS nu funcționează sau nu funcționează adecvat și ar renunța la a face protocolul. Vă rugăm să consultați pagina 273 pentru mai multe informații despre biofilm.



**Cancerul vezicii urinare:** Un prieten de-al meu a mers la urgență pentru că urina sânge. După aceea, medicii au aflat că are un cancer al vezicii urinare. A fost trimis acasă. Apoi, medicii au vrut să înceapă chimioterapie, dar el nu avea asigurare, așa că a fost nevoie de timp pentru a reveni la medic. I-am dat MMS și a început să-l ia în fiecare oră. A luat MMS timp de 2 săptămâni. Apoi s-a oprit pentru că a început să aibă diaree și vărsături și s-a săturat de ea. În acea perioadă a fost calificat pentru asigurare. S-a întors la medic pentru a primi chimioterapie, dar înainte, medicul de



chimioterapie a intrat în vezica sa pentru a verifica dimensiunea cancerului. Au fost foarte surprinși când au aflat că nu există cancer. — Tadeusz, Statele Unite



**MMS funcționează:** Este sigur. Am folosit doze cuprinse între 2 și 12 picături, de la una la patru ori pe zi. Am 56 de ani și am folosit MMS off and on timp de un deceniu. Și a salvat practic viața fiicei mele. —Wayne F., Canada

In Brief...

## Three Golden Rules of MMS

### 1. Getting better?

Do not change anything.  
Continue with what you are doing.



### 2. Feeling worse?

Reduce your MMS intake by 50%.

### 3. Not getting better/not getting worse?

If there are no signs of improvement,  
do the next increase or go to the next  
protocol according to the HRP.



# **Capitolul 9**

## **Protocoloale de sprijin**

### **Protocolul de tuse**

Multe boli produc tuse, iar unele produc tuse continuă extremă. Tusea zapsă o persoană de energie, de obicei energie necesară pentru a ajuta la depășirea bolii. Am văzut tuse continuând continuu săptămâni și uneori chiar luni.

Tusea poate preveni recuperarea sănătății și adesea poate cauza agravarea bolii. Mușchii cuiva din stomac pot deveni extrem de dureroși și, de asemenea, gâtul poate deveni dureros din cauza tusei. Tusea poate preveni somnul, care este și debilitant. Faptul este că tusea prelungită prezintă o problemă majoră. Protocolul de mai jos oferă o alternativă la consumul de medicamente (pentru o tuse persistentă) care au adesea efecte secundare grave. Am văzut această lucrare pentru alții și pentru mine; Cred că poate funcționa pentru tine.

Tusea este cauzată de mucus și de modul în care corpul reacționează la acesta. Aproape toate bolile produc

mucus în zona în care există. De exemplu, boala din plămâni produce mucus în plămâni și, de asemenea, boala din intestin produce adesea mucus în intestin. Tusea, în special tuse puternică, este efortul organismului de a menține traheea (tra-chea) liberă de mucus. Blocarea traheei este o problemă extremă. Corpul nu poate permite acest lucru sau moartea rezultă, astfel reacția naturală a corpului este profundă,

Enf of pages 101 to 150

\\EQ6\r11\022B\1-Adrian\Health\FD\Alt-Med (I)\Alt  
Meds (I)\MMS (I)\SWF\xxAdrian\_20200929\_170631\  
xxAdrian\_20200929\_170631  
mms\_health\_recovery\_guidebook\_1\_october\_2016[1  
01-150].pdf.docx.en.ro.docx

tuse grea, necontrolabilă, pentru a expulza mucusul din trahee. Chiar și cea mai mică cantitate din aceasta amenință blocarea respirației.

Mucusul poate varia de la apos la foarte dur. Se poate tuse ore întregi pentru a expulza doar un pic de mucus din unele zone ale traheei. Uneori, tusea nu se oprește atunci când tot mucusul a fost îndepărtat din tuburile de respirație, deoarece anumite tipuri de mucus pot fi prezente în gură și gât. Acest mucus poate fi cauzat de alți agenți patogeni care nu au legătură cu cauza inițială a tusei. Tusea va apărea atâta timp cât anumite tipuri de mucus se află în gură sau gât. Acest mucus poate fi atât de subțire încât este apos și va scăpa chiar din nas când tuși, sau poate fi foarte gros și continuă să se adune în gât și trebuie scuipat.

Astfel, este necesară îndepărtarea întregului mucus din interiorul întregii guri, care include dinții, gingiile, părțile laterale ale obrajilor și ale gâtului.

Odată ce acest lucru este realizat, tusea ar trebui să se oprească, acest lucru este aproape întotdeauna cazul, dar dacă tusea nu se oprește, atunci ar trebui să repetați pașii de mai jos pentru a doua oară.

## **Instrucțiuni pentru îndepărtarea mucusului**

Îndepărtarea mucusului din gură se poate realiza cu utilizarea diferiților acizi într-o formă diluată. Se pot utiliza picături dintr-o sticlă de activator MMS, cum ar fi 50% acid citric sau 4% acid clorhidric (HCl), sau 1/2 lămâie sau lime stoarse.

**Notă:** Folosirea acidului sau a lămâii în aceste forme diluate nu va fi vă rănește dinții. Vă puteți clăti gura cu apă curată, curată, după ce ați terminat fiecare sesiune.  
eu nu

*recomandăm utilizarea bicarbonatului de sodiu sau a apei alcaline pentru neutralizarea acidului, clătirea cu apă curată este suficientă.*

## **Pasul 1**

- q Adăugați 20 de picături fie de acid citric 50%, fie de acid HCl 4% (dintr-o sticlă de activator MMS), la 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Sau folosiți 1/2 lămâie sau lămâie stoarsă în 1/2 cană de apă. (Douăzeci de picături de acid activator MMS în 1/2 cană de apă este un acid foarte slab. Este mult mai slab decât sucul de lămâie și este ușor de utilizat.)
- q Adăugați 1 picătură de MMS neactivat la această soluție și așteptați trei minute înainte de utilizare.

## **Pasul 2**

- q Luați o înghițitură (aproximativ 1 lingură) din amestecul din 1/2 ceașcă pe care l-ați făcut la Pasul 1. Rotiți apa de mai multe ori în gură, asigurându-vă că vă acoperă bine dinții și părțile laterale ale gurii. Dacă aveți dinți falși, asigurați-vă că apa pătrunde și sub dinți.
- q După swishing, înclinați capul înapoi și faceți gargară câteva secunde și apoi scuipa amestecul de apă / acid afară.
- q Repetați acest pas încă o dată.

## **Pasul 3**



- q Folosind o periută de dinți moale, (asigurați-vă că periută de dinți este curată, fără pastă de dinți), turnați puțin din soluția care a rămas din 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă acidificată pe care ați făcut-o la pasul 1 peste periută de dinți. Spălați-vă dinții și gingiile timp de un minut. Acest lucru este pentru a vă asigura că nu mai există peliculă de mucus pe dinți.

## Pasul 4

- † Clătește-ți gura încă o dată, cu o înghițitură (aproximativ 1 lingură) din 1/2 ceașcă de apă acidificată făcută la pasul 1.

## Note

† *Faceți acești patru pași oricând apare o vrăjeală de tuse. Asigurați-vă că țineți pasul cu protocolul pe care îl utilizați (dacă există) în timp ce efectuați această procedură suplimentară pentru o tuse.*

† *Dacă tusea persistă, vă recomand să faceți Protocolul pentru mușegai / ciuperci (a se vedea pagina 99), deoarece am ajuns să cred, ca mulți alți profesioniști, că mușegaiul poate proteja diferite boli, inclusiv bolile care creează mucus care cauzează tuse.*

† *După ce ați finalizat Protocolul pentru mușegai / ciuperci, dacă tusea este încă o problemă, vă sugerez următoarele: Începeți din nou cu procedura de pornire și lucrați prin Planul de recuperare a sănătății. Indiferent dacă înainte de a efectua protocolul de tuse, erai deja pe un protocol MMS, cum ar fi Protocolul 1000 sau 2000, sau dacă nu ai fost folosit pe vreun protocol MMS, indiferent de caz - mergi la Procedura de pornire. Simultan, în acest moment vă rugăm să revedeți capitolul 8 și să luați în considerare cu atenție dacă ceva vă împiedică recuperarea sănătății. De fiecare dată când utilizați un*

*protocol MMS, de regulă, tusea ar trebui să se oprească. Acesta este motivul pentru care vă sugerez să examinați ceea ce ar putea împiedica recuperarea dvs., să corectați orice ar putea fi greșit și să începeți de la început.*

## Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO

Patch-ul MMS1 este un alt mod de a utiliza MMS1 și DMSO local. Acest lucru nu este același cu Protocolul 3000 în sine, dar este o variantă a modului de utilizare a MMS1 / DMSO extern într-un mod eficient pentru a vindeca toate tipurile de probleme ale pielii. Am avut succes cu multe tipuri de tumori, tumori canceroase și infecții precum SARM, ulcere diabetice și alte boli ale pielii. A adus ameliorarea zonelor de durere, mai ales atunci când este prezent cancerul. În timp ce Protocolul 3000 este o modalitate de a absorbi dioxidul de clor în organism, prin piele, plasturele este conceput pentru a viza o anumită zonă a pielii.

**Notă:** Consultați pagina 265 pentru instrucțiuni despre pregătirea unui Patch MMS1 / DMSO pentru un copil.

### Instrucțiuni pentru patch-ul MMS1 / DMSO

#### Pasul 1

- † Într-un castron curat, activați 10 picături de MMS cu 10 picături de acid citric 50% sau 4% HCl. Numărați 30 de secunde pentru activare.
- † Adăugați imediat 10 picături de apă purificată.
- † Apoi adăugați 10 picături de DMSO. Asigurați-vă că această soluție este bine amestecată.

## **Pasul 2**

- † Se toarnă soluția pe un tampon de tifon de bumbac, asigurându-se că lichidul este complet absorbit în tampon.
- † Acoperiți zona cu probleme cu tamponul de tifon și lăsați-l timp de șapte minute. Prima dată când faceți acest patch, vă sugerez să îl aplicați timp de doar șapte minute

testați cum reacționează pielea. Dacă merge bine, atunci următoarele patch-uri pot fi ținute timp de 15 minute de fiecare dată. Dacă pielea este excesiv de iritată, reglați soluția așa cum este descris în notele de mai jos.

- Cel mai bine este să țineți plasturele în loc, deoarece punerea benzii pe tamponul de tifon înmuiat ar putea avea o reacție cu DMSO.

### **Pasul 3**

q După timpul alocat, scoateți plasturele.

### **Note**

q *Dacă pașii de mai sus provoacă arsuri sau iritații ale pielii, adăugați încă 10 picături de apă pe plasture. Dacă 10 picături de apă nu opresc arderea pe următorul plasture, adăugați încă 10 picături de apă și continuați să adăugați mai multe până când nu există arsuri sau iritații.*

q *În funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie acoperită, această formulă poate fi dublată sau triplată sau tăiată în jumătate în funcție de aceasta. Aplicați o dată sau de două ori pe zi, până când este bine*

## **Protocoloale pentru ochi, urechi și nas**

Curățarea ochilor, urechilor și nasului cu MMS le poate permite să se vindece atunci când nimic altceva nu va fi. MMS este foarte blând cu aceste părți delicate ale corpului. Urmăți instrucțiunile de mai jos.

Nu recomandăm niciodată utilizarea apei de la robinet pentru dozele MMS. Mai ales pentru ochi, urechi și nas, doriți să fiți sigur că nu folosiți apa de la robinet de la robinet pentru a compune amestecul, deoarece aproape toată apa de la robinet din SUA și multe alte țări are fluor și adesea clor ca

bine. Nu permiteți aceste otrăvuri în ochi, urechi sau nas. Apa distilată, dacă este disponibilă, este cea mai bună alegere pentru Protocoalele Ochii, Urechile și Nasul și apa purificată în al doilea rând. Evitați cu totul apa de la robinet. Când compuneți aceste formule diferite (care nu sunt toate la fel), asigurați-vă că marcați clar toate sticlele, astfel încât să nu confundați ce este ceea ce.

## Ochi

În trecut, am folosit o formulă pentru ochi de 1 picătură activată de MMS la 1 uncie / 30 ml apă distilată și, uneori, 1/2 picătură de MMS1 până la 1 uncie / 30 ml apă distilată. Ambele soluții pot funcționa pentru anumite tipuri de corp. Cu toate acestea, această putere a MMS1 pentru ochi a cauzat disconfort în unele cazuri. De atunci am dezvoltat o nouă formulă pentru ochi (mai jos) și am ajuns să găsesc că această soluție mai slabă va îndeplini același scop pentru a depăși problemele oculare. O regulă bună este dacă ochiul arde sau arde mai mult de doar câteva secunde (câteva secunde este normal) sau într-un grad incomod, atunci cel mai bine ar fi să vă diluați soluția cu apă distilată. Dacă aveți benzi de testare și vă puteți testa formula pentru ochi, părțile pe milion pentru soluția pentru ochi MMS1 prezentate mai jos ar trebui să citească între 6 și 10 ppm.

## Formula MMS1 pentru ochi

- q Activați 1 picătură de MMS cu 1 picătură de HCl 4% (preferat pentru ochi) sau 50% acid citric. Asigurați-vă că ați așteptat timpul corect (30 de



secunde) și că lichidul MMS a devenit de culoare chihlimbar.

- q Adăugați 4 uncii / 120 ml apă distilată sau purificată la 1 picătură activată.

- q Se toarnă această soluție fie într-o sticlă cu picurător, fie într-o sticlă cu spray.

## **Note**

q *Aceasta este formula de bază pentru ochi - 1 picătură activată de MMS la 120 ml apă purificată.*

q *Acest amestec durează aproximativ o săptămână dacă se află într-o sticlă cu capac etanș și păstrat într-un loc răcoros și întunecat. Deci, asigurați-vă că compuneți un lot proaspăt în fiecare săptămână, dacă este necesar. Acest lucru este probabil să fie mai mult decât suficient pentru picături de ochi sau spray pentru o perioadă de o săptămână pentru o persoană. Formula efectivă pentru ochi trebuie să fie o picătură activată de 1/4 până la 30 ml apă distilată. Cu toate acestea, deoarece nu este posibil să măsurați 1/4 dintr-o picătură de unul singur, vă sugerăm să vă amestecați soluția pentru ochi în acest mod.*

## **Procedura ochiului MMS1**

Acestea sunt cele două metode preferate de aplicare a

Amestec MMS1 pentru ochi:

### **1. Flacon spray pentru ochi.**

- † Puneți soluția de formulare pentru ochi descrisă mai sus (1 picătură activată de MMS la 120 ml apă) la o uncie curată.
  
- † Pentru cea mai bună acțiune de vindecare, spălați-vă ochiul sau ambii ochi cu acest amestec. Cu capul ușor înclinat înapoi, cu ochii larg deschiși și cu privirea în sus spre tavan, pulverizați fiecare ochi de 4 până la 8 ori pe aplicație. Încercați să țineți ochii deschiși când pulverizați, apoi clipește de mai multe ori pentru a ajuta la spălare. La început, poate arde puțin, dar dacă amestecul dvs. este corect, acest lucru va trece rapid.

- q Faceți acest lucru de 3 până la 4 ori pe zi pentru cele mai bune rezultate.

## **2. Flacon picurător pentru ochi.**

- † Utilizați același amestec de formulă pentru ochi (1 picătură activată de MMS la 120 ml apă), adăugată la o sticlă picurătoare.
- † Puneți 3 sau 4 picături în fiecare ochi în timp ce clipiți pentru a le răspândi.
- † Faceți acest lucru de 3 sau 4 ori pe zi.

### **Note**

q *Pentru majoritatea problemelor oculare, MMS elimină lucrurile într-o zi sau patru, unele cazuri durând până la o săptămână, dar puteți continua să utilizați soluția pentru ochi, dacă este necesar, până la bine.*

q *Utilizați același amestec și procedură pentru copii.*

q *Utilizați flaconul cu spray pentru ochi sau flaconul cu picurător de ochi de 1-2 ori pe săptămână pentru întreținere.*

q *Fii harnic pentru a-ți marca clar sticlele. Nu ați dori să amestecați o sticlă spray pentru piele, cu o sticlă spray pentru ochi - acestea sunt două soluții complet diferite.*

## Urechi

**Notă:** *Formula raportului dintre picăturile activate și apă este diferit pentru urechi și nas decât cel al ochilor.*

### Formula MMS1 pentru urechi

† Activați 1 picătură de MMS cu 1 picătură de HCl 4% sau 50% acid citric. Asigurați-vă că ați așteptat suma corectă

de timp (30 de secunde) și că lichidul MMS1 a devenit de culoare chihlimbar.

- † Se adaugă 1 uncie / 30 ml apă distilată sau purificată la

picătură activată.

- † Aceasta este formula de bază pentru urechi - 1 picătură activată la

uncie / 30 ml apă purificată. Amestecul pentru urechi durează aproximativ o săptămână când este păstrat într-o sticlă cu capac strâns și într-un loc răcoros și întunecat. Deci, asigurați-vă că compuneți un lot proaspăt în fiecare săptămână, dacă este necesar.

## **Procedura MMS1 pentru urechi**

### **Pasul 1**

- q Utilizați soluția de mai sus, 1 picătură activată la 1 uncie / 30 ml de apă. Pentru adulți, umpleți un picurător de ochi standard cu o strângere strânsă (completă) a becului (aceasta este de aproximativ 18 picături). Folosiți jumătate din această sumă pentru un copil.
- q Puneți persoana să se așeze de partea sa, cu capul în linie cu corpul său. Dacă stai întins pe un pat, va trebui să folosești o pernă, capul trebuie să fie la

același nivel cu corpul, nu mai sus sau mai jos decât gâtul și umerii.

## **Pasul 2**

- q Introduceți încet și cu grijă picurătorul de ochi în ureche, apoi strângeți ușor becul de 5 sau 6 ori permițând lichidului din picurător să intre și să iasă din ureche de fiecare dată. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a duce lichidul la fundul urechii. Scopul este de a duce lichidul la fundul urechii. (Clătiți picurătorul de câteva ori cu o soluție mai puternică de MMS1, cum ar fi concentrația flaconului cu spray de piele, prin stoarcerea becului

pentru a intra și ieși soluția înainte de a o pune înapoi în sticla dvs.)

## Note

q *În mod normal, în special la copii (deoarece copiii se vindecă mai repede decât adulții) această procedură va elimina imediat cea mai mare durere, dar dacă nu, continuați cu această procedură orar până când durerea dispare.*

q *Durerea poate scădea, dar ar trebui să continuați cu acest proces de 2 până la 3 ori pe zi până când este complet bine (fără orice infecție), care ar trebui să fie de la o zi la cel mult o săptămână.*

## Nas

**Notă:** *Formula raportului dintre picăturile activate și apă este diferit pentru urechi și nas decât cel al ochilor.*

**Formula MMS1 pentru nas** (aceasta este aceeași formulă ca și pentru urechi)

† *Activați 1 picătură de MMS cu 1 picătură de HCl 4% sau 50% acid citric. Asigurați-vă că ați așteptat timpul corect (30 de secunde) și că lichidul MMS1 a devenit de culoare chihlimbar.*



- † Adăugați 1 uncie / 30 ml apă distilată sau purificată la 1 picătură activată.
  
- † Aceasta este formula de bază pentru nas - 1 picătură activată la 1 uncie / 30 ml de apă purificată. Acest lucru va dura aproximativ o săptămână dacă este păstrat într-o sticlă cu capac strâns și depozitat într-un loc răcoros și întunecat. Deci, asigurați-vă că compuneți un lot proaspăt în fiecare săptămână, dacă este necesar.

## **Procedura nasului MMS1**

Următoarea procedură este eficientă atunci când nasul unei persoane este umplut și / sau când are o răceală. În plus, aceeași metodă va funcționa de obicei atunci când cineva are probleme sinusale continue și un nas înfundat continuu săptămâni sau chiar ani. Aceeași tehnică poate fi utilizată în plus față de Protocolul 1000 în timp ce depășește gripa.

### **Pasul 1**

- † Utilizați formula de mai sus - 1 picătură activată de MMS la 1 uncie / 30 ml de apă.
- † Așezați-vă plat pe spate pe un pat. Nu pune capul pe o pernă.

### **Pasul 2**

2. Puneți 4 până la 8 picături din această soluție într-o nară. Va arde puțin, deoarece nasul va arde chiar și cu apă simplă, dar MMS1 nu va face nici o pagubă. Ideea este să permiteți ca unele dintre MMS1 să se scurgă în sinusurile dvs. și să rămână acolo timp de aproximativ cinci minute. Vă puteți aștepta ca unele dintre acestea să se epuizeze atunci când vă ridicați. Ajută să ai un țesut la îndemână.
3. Repetați pasul de mai sus pentru cealaltă nară.

**Notă:** Faceți acest lucru de 3 ori pe zi, până când sunteți bine, ceea ce ar trebui să nu fie mai mult de patru zile în majoritatea cazurilor. În cazul în care nu vă simțiți bine în patru zile, continuați până vă simțiți bine.

## **Protocol de baie și baie de picioare**

Scăldatul în MMS1 sau MMS2 este încă o metodă de a obține MMS1 (care produce dioxid de clor,  $\text{ClO}_2$ ) sau MMS2

(care, amestecat cu apă, produce acid hipocloros [HOCl], care este un acid pe care corpul îl folosește pentru a distruge agenții patogeni), în organism, deși pe o cale diferită, astfel încât să poată ajunge în alte zone și să intre mai adânc în țesuturi.

## **Instrucțiuni pentru băile MMS1**

### **Baie plină**

**Notă: Pentru băile MMS nu utilizați apă cu clor sau fluor în ea.** Încercați să aflați dacă apa de la robinet conține clor sau fluor; dacă da, folosiți un filtru de apă cu osmoză inversă sau cumpărați apă purificată în sticle mari. O altă opțiune posibilă este că mulți oameni spun că boraxul poate elimina fluorul și clorul din apa de baie. Există multe dovezi anecdotice pe internet și unele chimii indică faptul că borul din borax creează fluor de bor din fluorul din apă. Aceasta nu este o substanță chimică otrăvitoare și nu este periculoasă pentru sănătatea dumneavoastră. O substanță chimică similară non-otrăvitoare este produsă și din clor. Utilizați două linguri rotunjite de borax pentru o cadă de dimensiuni standard. Așteptați cel puțin 15 minute după agitarea boraxului în apă (apa rece sau fierbinte este OK), apoi adăugați MMS-ul.

### **Pasul 1**

3. Activați 20 de picături MMS, numărați până la 30 de secunde și asigurați-vă că a devenit de culoare chihlimbar.

4. Adăugați picăturile activate într-o cadă cu 15 până la 30 cm de apă. Folosiți apă fierbinte, cât de fierbinte puteți sta confortabil.
5. Intră în baie și culcă-te sau încearcă să te așezi pentru a obține cât mai multă apă pe tine. Dacă nu sunteți complet scufundat, folosiți-vă mâinile pentru a trece ușor apa peste corp.

5. Stai în apă timp de aproximativ 20 de minute.

**Notă:** *Începeți prin utilizarea a 20 de picături MMS activate pe baie, data viitoare folosiți 40 de picături activate și apoi 60.*

## **Pasul 2**

7. Luați o baie MMS1 de 1 până la 3 ori pe zi și, în general, nu mai mult de 60 de picături pe baie.

## **Pasul 3**

10. În a doua sau a treia zi, începeți să adăugați picături DMSO la soluția MMS1 după ce timpul de activare s-a încheiat. (Asigurați-vă că cada dvs. este complet curată și lipsită de orice reziduu de săpun etc.) La început utilizați 1/2 la fel de multe picături de DMSO ca picături MMS activate, iar apoi, de fiecare dată când pregătiți o baie, creșteți picăturile de DMSO până când utilizați 3 picături de DMSO pentru fiecare 1 picătură de MMS activat (MMS1). Nu este necesar să utilizați mai mult de 3 picături de DMSO pentru fiecare picătură activată de MMS. (Rețineți că, atunci când spunem 1 picătură de MMS1, aceasta este 1 picătură de MMS activat. Din punct de vedere tehnic, 1 picătură de MMS1 reprezintă 2 picături de lichid, [1 picătură MMS + 1 picătură acid activator = 2 picături de lichid]. Cu toate acestea, , ne referim la aceasta ca la o doză

de 1 picătură de MMS1. În acest caz, nu luăm în considerare picătura de activator. Deci, o doză de 3 picături de MMS1 ar necesita 9 picături de DMSO,

11. Fie că faceți o baie doar cu MMS1, fie că ați adăugat DMSO în apă, rămâneți în apă timp de aproximativ 20 de minute.

## Note

11. *Băile pot fi foarte importante și, dacă observați că vă simțiți mai bine, nu încetați să luați băi MMS1 (până la trei băi pe zi) până nu sunteți sigur că nu mai este nimic de câștigat.*

12. *Instrucțiunile de mai sus, care sugerează să ia până la trei băi MMS1 pe zi și să adăugați DMSO la baie în a doua sau a treia zi, este recomandată în special în această cantitate, în cazul celor care luptă împotriva unei boli specifice și / sau boală care pune viața în pericol. Cu toate acestea, baia MMS1 (sau baia MMS2 - vezi mai jos), poate servi la multe scopuri. Aceste băi sunt excelente pentru o detoxifiere generală, mai ales dacă se știe că au fost „expuse” unor toxine puternice, cum ar fi din cauza călătoriilor / zborurilor cu avionul, sau din cauza petrecerii uneia sau mai multor zile într-un oraș mare poluat sau a în orice mediu toxic global. Dacă simțiți nevoia de detoxifiere suplimentară din cauza a ceea ce ați fost expus, atunci încercați o baie MMS.*

13. *Dacă se întâmplă să locuiți și să lucrați într-un oraș mare poluat, vă recomandăm să luați o baie MMS de 1 până la 3 ori pe săptămână. Sau s-ar putea să doriți să vă bucurați de aceste băi de câteva ori pe săptămână pur și simplu pentru plăcerea relaxării și pentru a înfrumuseța pielea.*

14. *O baie MMS poate servi ca tratament de înfrumusețare și mulți au raportat o piele mai clară, mai fină și mai moale după ce au adăugat băi MMS la programul lor săptămânal. Încercați baia MMS1 sau MMS2, vedeți cu ce se poate descurca corpul dvs., apoi adăugați aceste băi la rutina dvs. pe măsură ce apare nevoia și / sau pe măsură ce vă simțiți condus.*

## Baia de picioare



O baie MMS completă este mult mai eficientă și, prin urmare, mai de dorit decât o baie MMS pentru picioare. Acest lucru se datorează faptului că o mare parte a pielii este în contact direct cu soluția MMS și

diferite părți ale corpului au șansa de a trece MMS direct prin piele pe o zonă vizată. De exemplu, dacă aveți cancer de sân și vă puteți scufunda (și sânii) sub apă, poate fi benefic. Sau, dacă problema se află în părțile private și sunteți scufundat în apa MMS, mai multe pot fi absorbite direct în zona cu probleme.

Pentru cei care nu au o cadă sau care nu pot intra și ieși dintr-o cadă dintr-un motiv sau altul, sau care poate nu au suficientă apă necontaminată pentru o baie completă, vă sugerez o baie pentru picioare. Băile pentru picioare sunt o modalitate minunată de relaxare și, cu această metodă, o cantitate bună de MMS poate pătrunde în sistem și poate face ceva bun. Vă rugăm să rețineți, sugerez aceeași cantitate de picături pentru o baie de picioare ca o baie cu corp complet. Acest lucru se datorează faptului că pielea de la picioare, glezne și chiar picioare tinde să fie mai puternică sau mai dură decât pieptul, spatele, brațele, stomacul și părțile intime.

## **Pasul 1**

15.Utilizați apă înaltă pentru gleznă într-un bazin mic de plastic.

16. Urmați aceleași instrucțiuni date mai sus pentru baia completă cu aceeași cantitate de picături MMS1 și DMSO.

## **Variații**

17.Dacă apa este puțină, puteți pregăti baia de picioare cu puțină apă, nici măcar suficientă pentru a ajunge la vârful piciorului. Puneți o cârpă deasupra piciorului și lăsați apa să se înmoaie în cârpă în timp ce mai rămâne puțină apă sub picior. Aceasta servește ca un tip de compresă și va ajuta în continuare mai multe MMS pentru a pătrunde în piele / țesuturi.

18.Pregătiți baia de picioare folosind un recipient mai adânc pentru apă, cum ar fi o găleată, astfel încât apa să ajungă până la

gambă sau până la genunchi. Urmăți aceeași formulă - adăugați până la 60 de picături activate de MMS pe baie. Acest lucru permite acoperirea unei zone de piele mai mari.

## **Instrucțiuni pentru băile MMS2**

**Prudență:** Spre deosebire de baia MMS1, nu adăugați niciodată DMSO la o baie MMS2! (Pentru mai multe detalii vezi avertismentul de la paginile 23-24.)

### **Pasul 1**

19. Asigurați-vă apa pentru baie sau picioare conform instrucțiunilor din nota din secțiunea Baie completă, pagina 143.

### **Pasul 2**

20. **Pentru o baie plină** utilizați 3 lingurițe de nivel (15 ml) de MMS2 (hipoclorit de calciu) prima dată. Dacă pielea funcționează bine, puteți crește cu precauție până la 10 lingurițe de nivel (50 ml) de MMS2 pe baie. Poate doriți să stropiți granulele MMS2 în apă fără a le atinge, apoi o dată în apă amestecați-le cu mâna. Dacă aveți unele dintre granulele uscate pe mâini, aveți grijă să nu vă atingeți ochii până când nu este bine clătit.

21. **Pentru o baie de picioare** utilizați aceleași măsurători ca baia completă MMS2, așa cum s-a subliniat mai sus.

**Notă:** *Tipurile de piele variază foarte mult de la persoană la persoană. dacă tu observai orice iritație sau arsură a pielii, ieșiți imediat din apă și clătiți. Data viitoare folosiți doar 1/2 din MMS2.*

**Variație:** Aceleași variații enumerate mai sus pentru baia MMS1 se pot aplica și pentru băile MMS2, cu

excepție, din nou, că nu adăugați niciodată DMSO la o baie MMS2, deoarece cele două nu sunt compatibile.

## **Protocol de clismă**

Clismele au fost folosite de mii de ani în multe culturi pentru a curăța corpul, pentru a atenua febra și pentru a se vindeca de boli. A fost un instrument frecvent utilizat de medici până în vremurile recente. Poate fi, de asemenea, un sistem de livrare eficient pentru MMS1, mai ales atunci când cineva a atins doza orală tolerabilă maximă.

Utilizarea unei clisme MMS1 este adesea foarte importantă pentru recuperarea sănătății. Clisma livrează dioxid de clor în ficat și în sânge, precum și neutralizează toxinele și ucide paraziții în intestin. În plus, adăugarea MMS1 în clismă ucide agenții patogeni din colon și o mare parte din MMS1 este absorbită prin pereții colonului în plasma sanguină. În multe cazuri clisma va oferi colonului o curățare atât de necesară.

Dacă nu știți cum să vă dați o clismă, vă rugăm să studiați și să vă familiarizați cu procesul înainte de a încerca. Există multe site-uri de instruire pe internet în acest scop. Pur și simplu puneți cuvintele „clisma cum să” în orice motor de căutare și veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie.

Majoritatea echipamentelor sau truselor de clismă vin cu o duză rigidă care este introdusă în rect și în colon în jur de 6 până la 8 inci. Ca alternativă la utilizarea duzei de

clismă rigidă, vă recomand să folosiți un cateter simplu cu punga de clismă în locul duzei de plastic dur. Cateterul este un tub flexibil și, prin urmare, poate ajuta la evitarea oricăror găuri în partea colonului, așa cum au făcut unii, folosind vârful mai rigid. Orice echipament decideți să utilizați, mergeți încet și nu continuați

dacă există disconfort. (Unele pungi de clismă includ și tubul cateterului sau pot fi achiziționate separat împreună cu un conector care unește cateterul cu tubul de sac de clismă. Acest echipament este disponibil în majoritatea farmaciilor sau online pentru o selecție mai mare.)

## Instrucțiuni pentru Protocolul clismă

### Note

† *Fie că utilizați clisme pe cont propriu pentru diverse probleme, cum ar fi dificultăți vezicale, sau dacă utilizați alte protocoale în același timp, 5 picături de MMS activat în 1000 ml (1 litru / litru) de apă purificată (caldă sau corporală) temperatura) în punga de clismă ar fi o cantitate bună pentru început. Măriți picăturile din fiecare clismă până ajungeți la 30 de picături. Dacă în orice moment simțiți disconfort sau că soluția este prea puternică, tăiați picăturile în jumătate și ridicați-vă încet de acolo până la ceea ce aveți confort.*

† *Utilizarea acidului citric ca acid activator poate avea tendința de a arde dacă cineva urcă foarte sus cu picăturile lor, în special în ultimele 20 de picături. Pentru clisme, acid clorhidric 4% (acid clorhidric) este acidul activator preferat de utilizat.*

† *Nu utilizați o pungă de clismă din oțel inoxidabil. Unii oameni consideră că acestea sunt cele mai bune, cu toate acestea, oțelul inoxidabil poate reacționa chimic cu MMS și, prin urmare, nu este o alegere bună.*



**Atenție: Nu utilizați niciodată DMSO într-o clismă!** De ce? Colonul conține multe toxine pe care corpul le elimină. Dacă puneți DMSO în colon, puteți returna unele dintre aceste toxine înapoi în fluxul sanguin.

## **Pasul 1**

- q Pregătiți apa pentru punga de clismă încălzind 1000 ml (1 litru / litru) de distilat, osmoză inversă sau apă îmbuteliată la temperatura corpului. (Este important să încălziți apa sacului de clismă la temperatura corpului, deoarece utilizarea apei reci poate provoca crampe severe.)
- q Selectați numărul de picături pe care doriți să le utilizați (5 picături prima dată). Într-un pahar curat și uscat, activați picăturile și contați 30 de secunde. (Amintiți-vă, dacă utilizați acid citric, nu veți dori să treceți de 20 de picături pe clismă. HCl 4% este activatorul preferat pentru clisme.)
- q Adăugați picăturile activate în apa caldă pe care ați pregătit-o. Se toarnă o parte din apa caldă în paharul de activare MMS și apoi se toarnă acea soluție înapoi în recipientul cu apă caldă. Acum aveți soluția de geantă de clismă. (Fiți sânguincios pentru a vă asigura că toate ustensilele utilizate pentru acest preparat sunt foarte curate.)

## **Pasul 2**

- q Umpleți-vă punga de clismă cu soluția. Pentru primele mai multe clisme este acceptabil să folosiți jumătate din această soluție sau chiar mai puțin în geanta de clismă dacă nu vă simțiți confortabil folosind mai mult. Puteți crește cantitatea de lichid puțin de fiecare dată până când utilizați cantitatea completă de 1000 ml (1 litru / litru) de soluție. Mergeți în ritmul propriu, nu vă faceți excesiv de incomod. Opriți-vă înainte de a

ajunge la 1000 ml (1 litru / litru) dacă vă simțiți inconfortabil.

### **Pasul 3**

- q Începe clisma. Lăsați apa să curgă. Încercați să o țineți timp de 5 până la 10 minute, dacă puteți. Dacă nu îl puteți ține,

Aceasta nu este o problema. Încercați să dețineți o cantitate mai mică, uneori este mai ușor, apoi repetați.

## Note

† *Dacă începeți cu o soluție de 5 picături, faceți asta o dată sau de două ori și apoi faceți o soluție de 10 picături și așa mai departe.*

† *Puteți merge până la 20 până la 30 de picături dacă lucrați până la aceasta, dar nu continuați dacă cauzează probleme.*

† *Puteți face 2 până la 3 clisme pe zi.*

† *Dacă vedeți îmbunătățiri după ce ați făcut 4 sau 5 clisme, continuați să faceți clisme până când nu există alte indicații de îmbunătățire. Dar dacă nu există nicio îmbunătățire după 4 sau 5 clisme, nu continuați cu ele. După cum am spus, clismele pot fi o parte foarte importantă a recuperării sănătății; cu toate acestea, nu sugerez utilizarea prelungită a clismelor, deoarece acestea pot fi dificile pentru corp. În acest caz, dacă nu vedeți semne de progres după 4 sau 5 clisme, nu continuați. Continuați cu următorul protocol sau procedură prezentată în Planul de recuperare a sănătății.*

**Excepție:** Dacă utilizați alte protocoale și luptați împotriva unei boli care pun viața în pericol, puteți crește picăturile clismei în consecință. De exemplu, dacă sunteți unul dintre acei oameni care tolerează o cantitate mai mare de MMS1 - să spuneți că luați 9 până la 12 picături

sau mai mult pe oră în doza orală - atunci este posibil să puteți crește cantitatea de MMS1 pe care ați introdus-o. geanta de clismă. Dar nu depășiți 60 de picături în 1000 ml (1 litru / litru) de apă pe clismă. Amintiți-vă, aceasta este excepția, nu regula.

S-au obținut rezultate bune în cazul problemelor de prostată și blad-der cu clisme, precum și multe alte probleme.

## Colonici

Un colon (numit și hidroterapie colonică sau irigare a colonului) este infuzia de apă în rect de către un terapeut de colon pentru a curăța și spăla colonul. Colonicii și clismele urmăresc ambele curățarea colonului prin introducerea apei prin rect. Deși cele două metode sunt similare în abordare și în beneficiile lor pentru sănătate, există unele diferențe distincte între coloniști și ene-mas.

Clismele implică o infuzie unică de apă în colon. Colonicii implică mai multe infuzii de apă în colon. Obiectivul principal al clismelor este evacuarea colonului inferior, în timp ce coloniștii sunt meniți să curețe o parte mai mare a colonului. Colonul este mai aprofundat și poate fi mai benefic în funcție de care este problema și boala.

Spre deosebire de clisme, care pot fi efectuate acasă cu ajutorul truselor de bricolaj, coloniștii necesită echipament specializat și trebuie să fie administrați de un terapeut cu colon instruit.

În timpul colonului cald, apa filtrată este eliberată încet în colon. Apa determină contractarea mușchilor colonului, numită peristaltism. Peristaltismul „împinge” fecalele prin furtun pentru a fi aruncate într-un sistem de deșeuri închis. În timpul acestui proces, terapeutul colonului poate aplica masaj ușor pe zona abdominală a clientului pentru a facilita procesul.

Veți dori să găsiți un terapeut cu experiență în coloniști care să știe ce face. Terapeutul ar trebui să vă pună întrebări cu privire la istoricul dumneavoastră de sănătate pentru a fi sigur că nu există contraindicații pentru a primi colonii. În plus, terapeutul ar trebui să efectueze un simplu extern

verificarea colonului și a intestinului, precum și un examen rectal foarte simplu pentru a vă asigura că condițiile sunt potrivite pentru a primi colonicii.

De asemenea, veți dori să găsiți un terapeut care va folosi MMS1 în colon la recomandarea dumneavoastră. Acestea pot sau nu să aibă experiență cu MMS1 (le puteți orienta asupra modului de utilizare a picăturilor). Asigurați-vă că verificați de două ori dacă folosesc apă bună și nu apă de la robinet, deoarece acesta va avea în general clor și / sau fluor. În mod obișnuit, te vor pune să pui o rochie și să te așezi pe o masă pentru colon.

Vă sugerez să utilizați 20 de picături de MMS1 (MMS activat) pentru prima dată și 50 de picături de MMS1 a doua oară. Dacă totul merge bine și continuați cu coloniști, puteți urca până la 100 de picături MMS1 pentru sesiunile ulterioare de colon. (Această cantitate de picături este pentru 20-25 litri / litri de apă. Dacă se folosește mai multă apă în colon, picăturile pot fi ajustate în consecință.)

Amintiți-vă, există multă apă folosită într-un colon, deci această cantitate de MMS1 nu este o problemă.

## **Protocolul Douche**

Acest protocol este recomandat pentru problemele vaginale, infecțiile rele, precum și cancerul și majoritatea



altor boli și probleme (cum ar fi fibroamele, polipii și chisturile) ale organelor reproductive feminine (ovare, uter și sân). În cazul cancerului de sân, colul uterin absoarbe MMS1 și îl transportă către sistemul limfatic și în sân. MMS1 în duș va ucide agenții patogeni din zonă, permițând corpului să creeze sănătate acolo. În general, dușurile sunt necesare numai atunci când ceva trebuie corectat.

## **Instrucțiuni pentru MMS1 Douche**

Următoarele instrucțiuni presupun că se știe cum să faci o duș. Dacă nu, vă rugăm să vă educați suficient cu privire la proces înainte de a urma acest protocol.

### **Pasul 1**

- q Veți avea nevoie de o pungă de duș de 2 cani / 500 ml. Puteți folosi o pungă de duș mai mare, dar nu este necesar să folosiți mai mult de 2 cani / 500 ml de apă.
- q Pregătește-ți soluția. Începeți cu 5 picături de MMS1 la cele 2 cani / 500 ml apă purificată, distilată sau cu osmoză inversă. La fel ca clisma, 4% HCl, este acidul activator preferat de utilizat cu un duș, deși poate fi utilizat 50% acid citric. Cel mai bine este să încălziți apa pentru duș la temperatura corpului.
- q Când faceți dușul, lăsați să curgă apa până când începe să curgă din nou, apoi închideți debitul. (Tubul cu geantă de duș vine de obicei cu o clemă pentru deschiderea și închiderea debitului de apă.)
- q Strângeți mușchii pelvini / vaginali pentru a-l ține cât mai mult timp posibil, apoi eliberați. Repetați acest proces până când punga este goală.

### **Pasul 2**

- q Dacă nu aveți reacții adverse, creșteți cantitatea de picături de MMS1 pentru următoarea duș.
- q Data viitoare adăugați 10 picături activate în apa pe care o turnați în punga de duș și continuați să creșteți până la 30 de picături atâta timp cât nu există durere sau problemă, dar nu utilizați mai mult de 30 de picături. Creșteți la această cantitate încet.

## Adăugarea DMSO la o duș

- q Dușul dvs. poate fi mai eficient cu utilizarea DMSO, care poate ajuta MMS1 să pătrundă mai adânc în țesuturi. Adăugați 3 picături de DMSO la fiecare 1 picătură de MMS1 pe care îl utilizați în geantă.

**Atenție: atunci când adăugați DMSO la un duș, este important să aveți un sac de duș care nu este făcut din cauciuc sau latex** (care este o formă rafinată de cauciuc). Există diferite tipuri de containere de duș disponibile, dacă doriți să adăugați DMSO, utilizați unul care este fabricat din plastic (inclusiv furtunul), nu din cauciuc, deoarece cauciucul se poate scurge în corp împreună cu DMSO.

## Note

† *Dacă aveți arsuri și / sau înțepături, aceasta este de obicei o indicație că ciuperca este prezentă. În acest caz, vă sugerez să faceți o duș de lut. Utilizați 1 linguriță de argilă (argilă aztecă, bentonită, argilă sau argilă montmorillonită) în 2 căni de apă pentru duș. Păstrați recipientul de duș bine agitat pentru aceste dușuri de lut. Faceți două sau trei dușuri de lut pe zi și întotdeauna „spălați” lutul (folosind punga de duș și apă curată) după o oră. După trei zile, puteți verifica dacă ciuperca a dispărut folosind aceeași soluție MMS1 care a cauzat inițial arderea și / sau înțepătura. Dacă nu mai simțiți usturime și / sau arsuri, aceasta înseamnă că ciuperca a dispărut, dar ar putea fi necesare alte dușuri non-argiloase. Puteți continua cu dușurile dvs. MMS1 conform instrucțiunilor din acest protocol Douche.*

† În caz de cancer sau infecții rele, puteți face duș de 4 până la 5 ori pe zi (lucrați până la aceasta). Asigurați-vă că dușul nu provoacă iritații.

† În mod normal, faceți duș de 1 până la 4 ori pe zi, în funcție de gravitatea problemei. O singură dată pe zi poate fi suficientă. Depinde de dvs. să determinați de câte ori în fiecare zi. Amintiți-vă regula, atâta timp cât vă îmbunătățiți, nu vă opriți, dar nu continuați dacă nu există niciun beneficiu.

† Faceți-vă ultimul duș din zi înainte de culcare pentru absorbție și detoxifiere în timp ce dormiți. Amintiți-vă, dacă după aproximativ o săptămână nu vedeți nicio îmbunătățire, nu continuați, dar continuați atâta timp cât există îmbunătățiri.

† Ori de câte ori faceți protocolul Douche, este întotdeauna o idee bună să luați protocolul oral, fie Protocolul 1000, fie Protocolul 2000, în funcție de situație.

## Protocol MMS Bag

Acest proces într-un mod suplimentar pentru a obține dioxid de clor MMS1 în și pe corp, ajutând la depășirea patogenelor, otrăvurilor și metalelor grele. Acest proces de gazare este mai intens decât utilizarea unei sticle de pulverizare.

**Atenție: Evitați respirația oricărui fum.** Contactul cutanat controlat de MMS1 este ok, dar plămânii nu pot tolera mult dioxid de clor gazos. Deschideți o fereastră în cameră în timp ce faceți acest lucru. Dacă se întâmplă să respirați câteva respirații de vapori de MMS1, este posibil să nu aveți prea multă reacție la început, dar dacă o inspirați, este posibil ca la un timp mai târziu (aproximativ patru ore), să aveți dificultăți în respirând o vreme. Pentru început, este bine să evitați respirația directă.

## **Instrucțiuni pentru MMS1 Bag Protocol**

Această procedură se poate face de 2 ori pe zi, pe o perioadă de câteva zile, dacă este necesar. Va trebui să începeți cu un anumit număr de picături activate și să construiți

suma pe trei zile. Asigurați-vă că citiți cu atenție și înțelegeți bine fiecare punct de mai jos înainte de a încerca acest protocol.

## **Pasul 1**

- q Luați două pungi mari de gunoi (cele negre mari funcționează cel mai bine) și faceți o pungă din ele. Așezați-le pe o masă sau pe podea, uniți-le la deschiderea fiecărei pungi. La această joncțiune, bandăți-le tot cu o bandă de transport de 2 cm (5cm) lată, astfel încât gura fiecărei pungi să fie lipită pe cealaltă, făcând o pungă lungă. (S-ar putea începe prin a folosi bucăți mici de bandă pentru a le ține laolaltă, apoi le lipiți cu bandă largă, lipind mai întâi o parte și apoi cealaltă)
- q Tăiați un capăt al pungii, apoi verificați dacă nu este lipit împreună în centru, unde ați lipit cele două pungi împreună.

## **Pasul 2**

- q Dezbracă-te complet sau folosește cât mai puține haine.
- q Deschideți punga și pășiți în ea. În acest moment, vă ajută să aveți un scaun la îndemână, astfel încât să vă puteți așeza. Cu picioarele în geantă, trageți-o până la talie, apoi așezați-vă pe scaun și pregătiți-vă picăturile.
- q În prima zi, puneți 20 de picături de MMS și 20 de picături de acid citric 50% sau 4% HCl într-o ceașcă și



imediat (nu așteptați să numărați 30 de secunde) puneți ceașca în interiorul pungii, astfel încât să se așeze pe podea lângă picioarele dumneavoastră, având grijă să nu o lăsați să se varsă. Dacă se varsă, aveți grijă să nu-l puneți pe picioare, dar mergeți mai departe și folosiți-l, deoarece va crea la fel de bine vapori de dioxid de clor.

- q Ridicați-vă cu grijă și trageți punga în jurul umerilor și gâtului, înfășurând și pliant plasticul, astfel încât să nu scape fumuri.

**Prudență:** Nu introduceți capul în interiorul pungii și nu respirați niciun fum.

### **Pasul 3**

- q În prima zi, stați în geantă cinci minute, nu mai mult. Dacă simțiți orice senzație de arsură pe piele, ieșiți imediat din geantă, chiar dacă nu au trecut cinci minute. (În acest caz, clătiți și / sau faceți duș.)
- q Repetați întreaga procedură încă o dată în prima zi, (cu alte cuvinte, de 2 ori pe zi).

### **Pasul 4**

- q Atâta timp cât nu există iritații ale pielii, efectuați această procedură încă două zile. În a doua zi utilizați 30 de picături activate, iar în a treia zi utilizați 40 de picături activate. Atâta timp cât nu există iritații ale pielii, puteți prelungi timpul din geantă până la 10 minute, dar nu mai mult. Dacă simțiți orice senzație de arsură pe piele, ieșiți imediat din geantă și faceți duș. Cu sau fără senzație de arsură, nu depășiți 10 minute în pungă. Nu este nevoie să faceți duș după acest proces decât dacă există o senzație de arsură.

### **Pasul 5**

- q Dacă lucrurile merg bine, îl puteți menține încă câteva zile până când veți putea stabili dacă vă ajută sau nu. Dacă observați îmbunătățiri, păstrați-le atât timp cât vă ajută.

**Note**

† *Utilizați acest protocol pentru probleme de piele sau pur și simplu pentru a obține mai multe MMS în corpul dumneavoastră. Dacă vă ajută, amintiți-vă, continuați-l!*

† *Nu puteți utiliza CDS sau CDH pentru acest protocol.*

## **Protocolul pulmonar (Cupa)**

Este important să rețineți că acest protocol trebuie respectat în mod explicit. Vă rugăm să vă asigurați că ați citit acest protocol până la capăt de câteva ori și că aveți o înțelegere clară a fiecărui pas, înainte chiar de a încerca să faceți acest lucru. Dioxidul de clor gazos în sine, așa cum este utilizat în această procedură, este cel mai puternic mod în care îl ingerăm. Prin urmare, nu pot sublinia suficient nevoia de a ține cont de instrucțiuni sau altfel poate fi periculos. La fel, dacă veți urma cu atenție instrucțiunile, acesta poate, de asemenea, să respire o viață nouă în plămâni.

Dacă urmați aceste instrucțiuni la scrisoare, nu există niciun pericol, dar oamenii devin adesea prea entuziaști și fac prea multe și atunci pot suferi. Ezit să povestesc lumii despre acest protocol, nu din cauza a ceea ce vă spun aici, ci din cauza faptului că oamenii entuziaști exagerează uneori pentru că vor să se vindece repede. Unii ar putea lua ceea ce spun aici și să-l ducă prea departe. Deci, mergeți încet și nu exagerați. În acest caz, cu siguranță mai mult nu este mai bine.

## **Probleme pulmonare**

Vă pot oferi multe nume de boli pentru plămâni: astm, BPOC, fibroză chistică, pneumonie bacteriană, emfizem, embolie pulmonară și boli respiratorii ușoare până la grave de toate tipurile, cum ar fi răceala obișnuită, crupul, tuberculoza și cancerul pulmonar. Cele mai multe boli ale

plămâni provoacă simptome pe care le poți simți și multe dintre ele te vor face să tuși. Tusea, în general, nu este cauzată de o gâdilare în gât, ci în principal pentru că organismul încearcă să tuse mucus care tinde să blocheze tuburile care respira. Mucusul poate ascunde, de asemenea, diferite boli. A scăpa de mucusul din plămâni este esențial pentru vindecarea plămânilor. Acest protocol, pe care îmi place să-l numesc „cupa” este în acest scop. În plus față de eliminarea mucusului, dioxidul de clor gazos eliberat de MMS1 (MMS activat) poate ucide și agenții patogeni ai bolii din plămâni care nu se ascund în mucus.

## **Cum să vă ajutați plămâni cu gaz MMS1 (folosind cupa)**

### **Pasul 1**

- q Utilizați o ceașcă sau un pahar curat, uscat, care conține 8 uncii de lichid. (Un pahar care are un diametru de aproximativ 7,6 cm în partea de sus este ideal.) Absolut nu utilizați o ceașcă de metal, deoarece va reacționa negativ cu amestecul.
- q Activați 2 picături de MMS cu 2 picături de acid citric 50% sau 4% HCl. Țineți imediat mâna peste gura cupei, acoperind-o complet și numărați 10 secunde. (În timp ce numărați, învârtiți ușor picăturile din ceașcă pentru a le amesteca bine.)

### **Pasul 2**

- q După 10 secunde, aduceți cana la nas încet și apoi scoateți mâna. Așezându-vă nasul chiar peste marginea cupei, inspirați încet până când simțiți o „mușcătură” (o senzație de usturime sau înțepenire) la capătul nasului. Odată ce simți o mușcătură, oprește-te imediat. Faceți acest lucru o singură dată, respirând prin nas.

### **Pasul 3**

- q Apoi puneți mâna peste gura cupei din nou pentru încă 10 secunde.
- q După al doilea număr de 10 secunde, aduceți ceașca în gură, scoateți mâna din ceașcă și inspirați încet prin gură din gura paharului până când începeți să simțiți o „mușcătură” în plămâni, apoi opriți-vă .

Gata pentru această sesiune.

### **Tine minte**

- Când respirați prin nas și prin gură - respirați încet.
- Vrei să fii deosebit de atent să respiri doar suficient de adânc pentru a începe să simți o mușcătură (o senzație de usturime sau de înțepenire). Cheia este să ajungi în acel punct, dar nu mai mult.
- Debutul mușcăturii este semnalul de oprire.

### **Pasul 4**

- q După aproximativ opt până la zece ore, repetați pașii de la 1 la 3 așa cum s-a subliniat mai sus. Faceți această procedură doar de 2 ori pe zi, o dată dimineața și o dată seara.



## **Ce anume sa cauti**

Probabil cel mai important lucru pe care trebuie să îl căutați și să țineți cont de faptul că faceți acest proces este că MMS ar trebui să vă facă să vă simțiți mai bine, nu mai rău. Dacă vă simțiți mai rău atunci când utilizați acest protocol pulmonar, ceva nu este în regulă și ar trebui să vă retrageți. Reduceți cantitatea de picături din

pahar la 1 picătură de MMS1, respirați puțin mai puțin sau opriți-vă cu totul pentru o vreme. Mergeți încet până vă simțiți mai bine.

## **Puncte importante pentru procedura Cupei**

**1. Când urmați procedura cupei:** Dacă aveți o afecțiune pulmonară gravă, ar trebui să efectuați și protocoalele MMS. În mod normal, ați începe cu procedura de pornire și ați lucra până la Protocolul 1000, Protocolul 1000 Plus și veți trece la Protocolul 2000, dacă este necesar (conform Planului de recuperare a sănătății, așa cum este prezentat în această carte). Amintiți-vă, acumulați doza încet.

**2. Urmăți toate instrucțiunile:** Momentul acestei proceduri și dimensiunea paharului sau paharului pe care îl utilizați este extrem de important. Paharul / paharul ar trebui să fie cel puțin

8 uncii (aproximativ 250 ml), puțin peste această capacitate este OK, dar obțineți-o cât mai aproape de 8 uncii posibil. Aceasta este dimensiunea preferată pentru a putea crea suficient gaz în interiorul cupei. Numărul de 10 secunde este, de asemenea, foarte important, deoarece dacă așteptați mult mai mult, cantitatea de gaz care va fi inhalată va fi mai puternică și poate fi prea multă pentru a fi luată simultan. Așa cum am menționat mai sus, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni în mod explicit.

**3. Tuse:** Puteți avea o criză de tuse oriunde, imediat după ce ați respirat ceașca până la câteva ore sau chiar o zi după ce ați făcut această procedură. Acest lucru este normal, deoarece dioxidul de clor gazos lucrează la spargerea mucusului și trebuie expulzat. Va slăbi o parte

din mucusul care se formează în plămâni, care poate deține agenți patogeni. Apoi, acest mucus fie va curge în stomac și va ieși încet din sistem, fie corpul tău va tuse mucusul și îl veți putea scuipa. S-ar putea să tușiți mult și greu, posibil până la o oră sau cam așa, pentru a obține doar un pic mic de mucus - aceasta face parte din proces. S-ar putea să găsești atât de mare

cantități de mucus vă vor ieși prin nas, așa că aveți la îndemână multe țesuturi.

În cazul unei vrăji de tuse care nu se va opri, dacă continuă mai mult de o oră, poate fi necesar să mai slăbiți puțin din mucusul care se ține prea strâns (lipit de părțile laterale ale tuburilor de respirație). În acest caz particular, s-ar putea să vă simțiți mai rău din cauza tusei. Următorul pas în acest caz este să începeți să luați argilă aztecă (sau argilă bentonitică sau argilă montmorillonită). Luați câte o linguriță de lut în 1/2 cană de apă sau suc adecvat la fiecare oră timp de trei sau patru ore până când tusea se oprește.

Cu această procedură specială, când sunteți treaz, veți tuse de obicei mucusul care a fost eliberat din plămâni sau din tuburile de respirație, dar când dormiți, mucusul se scurge adesea în stomac și nu este rău. Corpul tău va avea grijă de el cu propriul acid stomacal și îl va procesa prin sistemul tău și nu te va răni.

## Note

† *Dacă vrăjile de tuse menționate mai sus (care pot apărea după respirația cupei) durează mai mult de o perioadă de o oră, aceasta este o indicație că trebuie să reduceți picăturile din cupă la 1 picătură, mai degrabă decât la 2 picături.*

† *Dacă tusea a atins punctul în care nu mai apare nimic, mergeți la Protocolul de tuse (pagina 131) și urmați instrucțiunile de acolo.*

**4. Răceală:** Este posibil să răciți în timp ce faceți acest protocol. Acest lucru se datorează faptului că mucusul se scurge din plămâni și, în rare ocazii, poate elibera germeni reci care au fost protejați de mucus. Dacă răciți, pur și simplu continuați procesul și ar trebui să dispară într-o zi

sau două, cu condiția să luați, de asemenea, MMS1 sau MMS2 oral, conform Protocolului 1000 sau 2000, în funcție de nevoile dvs.

**5. Mergi încet:** Procesul pulmonar este ceva ce poți exagera cu ușurință. Dar amintiți-vă, una dintre regulile mele de aur: Atâta timp cât vă îmbunătățiți, nu schimbați ceea ce faceți. Dacă starea dumneavoastră pare să se înrăutățească, opriți sau faceți cantități mai mici de MMS. Păstrați-l până când plămânii sunt sănătoși. Amintiți-vă, mergeți ușor. Și utilizați argilă (așa cum s-a menționat mai sus la punctul 3 despre tuse) atunci când este necesar.



**Bronșită:** Am suferit cu un caz sever de bronșită în fiecare an în iarnă timp de 5 ani la rând. Am găsit MMS și am început să-l iau la primul semn de simptome. Nu am avut bronșită de peste 3 ani acum. Îl iau o dată pe săptămână în timpul sezonului rece, la fel ca prevenirea și de fiecare dată când cineva din gospodăria noastră prezintă simptome de răceală, gripă etc., luăm MMS și începem dozarea. Funcționează de fiecare dată. —MR, Statele Unite

**Respira ușor:** Sunt fumător de mulți ani. Când amestec un lot de MMS și încep să iau doza de 3 picături în 4 uncii de apă, respirația mea este mult mai ușoară. Dacă aveți probleme de respirație sau congestie pulmonară, începeți să luați 3 picături de MMS în fiecare oră. —BS, Statele Unite



**Eczemă:** Am constatat că MMS a clarificat total eczema feței cu care am suferit foarte rău de doi ani. Am încercat totul, nimic nu a funcționat, dar în câteva zile MMS l-a lovit în cap. Uimitor. — Peter, Noua Zeelandă

# Capitolul 10

## **Indian Herb - Efortul suprem de recuperare a sănătății**

Dacă, după ce ați făcut toate protocoalele descrise în Planul de recuperare a sănătății, nu v-ați recuperat sănătatea, atunci folosirea plantei indiene este următorul curs de acțiune. Cu toate acestea, înainte de a trece la această procedură finală, vă rugăm să luați în considerare cu atenție, încă o dată, lista posibilelor motive pentru care este posibil să nu aveți succes complet cu MMS până acum. (Vezi Capitolul 8, Verificarea realității.)

Această procedură ar putea fi o parte foarte importantă pentru recuperarea sănătății cuiva. Există unele cazuri în care se pare că MMS nu ajută o tumoră să se micșoreze. Acest lucru ar putea fi temporar, dar poate că nu. După utilizarea Protocoalelor 1000, 1000 Plus, 2000, 3000, Mold / Ciupercă și toate diferitele Protocoale de susținere descrise în această carte pe măsură ce se aplică, dacă nu se observă progrese suficiente, abia atunci este timpul să luați în considerare luarea plantei indiene.



Indian Herb a ajutat mii de oameni în ultimii 80 de ani. Această soluție nu funcționează la fel ca MMS, așa că așteptați efecte secundare diferite. Acest amestec de plante poate provoca dureri, umflături, mâncărime și uneori febră, astfel preferăm MMS. Cu toate acestea, există oameni în viață astăzi care altfel nu ar fi aici dacă nu ar fi folosit Indian Herb. Mulți oameni au folosit analgezice pentru a rezista durerii plantei, dar mulți nu.

## **Instrucțiuni pentru Indian Herb**

### **Pasul 1**

- q Nu încetați să luați MMS. Continuați cu toate lucrurile pe care le-ați adăugat la protocolul dvs.: MMS1, MMS2, DMSO, clisme, băi etc. Cu alte cuvinte, continuați cu tot ceea ce ați folosit deja.

### **Pasul 2**

- q Includeți Indian Herb ca parte a ceea ce faceți deja. Puteți comanda de la Kathleen (McDaniel Life-Line Water) la:

<http://www.lifelinewater.com>

### **Pasul 3**

- q Urmați instrucțiunile trimise cu Indian Herb.

Instrucțiunile sugerează să o diluați cu 4 părți de vaselină până la 1 parte de plantă indiană. În unele cazuri grele, dacă planta indiană nu face treaba atunci când este amestecată cu vaselină, este posibil să trebuiască să folosiți planta cu toată puterea. Folosiți-l cu putere maximă numai după ce ați încercat amestecul 4-la-1 sugerat. Vă rugăm să rețineți, cu cât amestecul este mai

puternic, cu atât veți experimenta mai multă durere.

Cu alte cuvinte, ați putea folosi la fel de mult cât dublul cantității date în instrucțiuni și la fel de puternic ca și Indian Herb. Dar nu folosiți forța maximă imediat, deoarece cantitatea mai mică (4 la 1) va face probabil treaba și va da și mai puțină durere. (De asemenea, ați putea încerca un amestec mai puternic de 2 la 1, dacă 4 la 1 nu obține rezultate pentru a vedea dacă ajută înainte de a merge la putere maximă.)

## Pasul 4

- q Pentru cancerul din interiorul corpului ar trebui să luați Indian Herb pe cale orală. În general, folosim o capsulă de legume sau gel de dimensiunea 1, umplută cu 1/2, dar pentru început, umpleți doar 1/4 și luați-o de două ori pe zi. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu Indian Herb, dar vă rugăm să respectați comentariile de mai sus. Când luați planta indiană pe cale orală, distanțați-o din dozele MMS cu două ore.

## Black Salve

Black Salve vândut de Adrian Jones, în Australia, este similar cu planta indiană menționată mai sus - se aplică aproape aceleași instrucțiuni. Ingredientul principal al acestei balsamuri este același cu cel din planta indiană, și anume clorura de zinc. Celelalte ingrediente sunt ierburi foarte puternice și doar două din cele patru ierburi sunt diferite de formula Indian Herb. Dacă obțineți Black Salve de la Adrian, asigurați-vă că urmați instrucțiunile sale la scrisoare. Dacă, dintr-un anumit motiv, nu ați avea fișele de instrucțiuni ale lui Adrian, ar fi acceptabil să urmați instrucțiunile Indian Herb și invers.

Există și alte formule de vindecare oarecum similare disponibile. Termenii „Black Salve” și „Indian Herb” se referă adesea la salvarea cancerului în general. Există multe rețete diferite în scopuri diferite. Când spun Indian Herb și Black Salve, mă refer la Indian Herb de la Kathleen și Black Salve de la Adrian Jones, deoarece acestea sunt cele două formule pe care le cunosc. Am folosit Indian Herb pe scară largă pentru a depăși cancerul. Indian Herb a fost vândută de Kathleen în Texas și de tatăl ei în fața

ei, de peste 70 de ani. Ea a primit sute de scrisori care spuneau succesul împotriva cancerelor și a altor tumori. Black Salve de Adrian Jones a avut un succes similar.

Pentru cărți și produse, contactați-l pe Adrian la:

<http://www.adrianjonesnaturopath.com/products.htm>



**Vezica biliară:** Fiul meu (24 de ani) a fost internat la spital cu o conductă biliară blocată și calculi biliari. El a suferit mult și nu a putut mânca, deoarece a adus totul înapoi. Medicii au vrut să-i scoată vezica biliară, dar el a refuzat pentru că este acolo pentru un scop. A stat 10 zile în spital, deoarece medicii nu păreau să vrea să scoată blocajul fără vezica biliară. De asemenea, era foarte icterizat. Am rămas cu el tot timpul pentru că îi ofeream [cu atenție] MMS la fiecare oră ... Au făcut analize de sânge în fiecare zi și în a noua zi au spus că are pancreatită (care pune viața în pericol) și că vor opera în dimineața zilei. În acea după-amiază, a trecut de blocaj și a început să se simtă mult mai bine. Dimineața, când au făcut un test de sânge, totul scădea la normal. Au intrat în continuare pentru a elimina blocajul, dar acesta a dispărut. În schimb, au pus un stent pentru a ajuta la drenarea tuturor gunoiului care a rămas încă în

urmă. Când s-a întors în trei luni, pietrele biliare dispăruseră și ele. Nu a mai avut probleme cu vezica biliară. —Ruth B., Australia



**Diabet:** Vă mulțumesc cu amabilitate, este un produs minunat, bunicul își pierde acum pastilele pentru diabet (atât de multe dintre ele) și este mult mai fericit și atât de plin de viață din nou. Este un produs miraculos. — Nikki

# **Capitolul 11**

## **Protoaloale suplimentare**

### **Protocolul 6 și 6**

Protocolul 6 și 6 este ceva care poate fi utilizat singur - separat de toate celelalte protoaloale. Acest protoalo constă în administrarea unei doze de 6 picături de MMS1 și așteptarea unei ore și apoi administrarea unei alte doze de 6 picături de MMS1. Scopul acestui protoalo este de a gestiona multe lucruri acute care par să apară din când în când, cum ar fi răcelile, durerile de cap, febra, o atingere de intoxicație alimentară sau orice fel de boală care pare a fi abia la început sau imediat după ce a fost expus la o boală rea sau la germini. De asemenea, sa dovedit a avea succes cu dureri cronice, chiar și cu cele care au persistat de mai multe luni sau ani. Ar trebui să fie utilizat imediat după orice fel de accident, cu atât mai repede, cu atât mai bine, chiar și la locul accidentului. Protocolul 6 și 6 s-a dovedit a avea succes într-o gamă largă de situații,

### **Instrucțiuni pentru Protocolul 6 și 6**



## **Pasul 1**

- q Pregătiți o doză de 6 picături conform instrucțiunilor din Activarea MMS și amestecarea unei doze de bază de MMS1, la pagina 32. (Asigurați-vă că picăturile capătă culoarea chihlimbarului.)

16

9

- q Adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă sau alt lichid aprobat care este compatibil cu MMS1 conform instrucțiunilor de la paginile 41-45.
- q Bea doza de 6 picături.

## **Pasul 2**

- q Într-o oră pregătiți o altă doză de 6 picături și beți-o în jos.

## **Pasul 3**

- q Următoarea oră, după ce ați luat a doua doză de 6 picături, dacă vă simțiți bine, atunci asta este.

## **Pasul 4**

- q Dacă nu vă simțiți bine până la sfârșitul celei de-a doua ore, este timpul să începeți cu Protocoalele cheie ale planului de recuperare a sănătății - începeți cu procedura de pornire (vezi pagina 79). Din momentul în care ați luat ultima doză de 6 picături (din Protocolul 6 și 6), începeți cu doze de 1/4 picătură în fiecare oră pentru restul zilei.

## **Pasul 5**

- q A doua zi (a doua zi), mergeți chiar în a doua zi a procedurii de pornire, care ia doze de 1/2 picătură în fiecare oră timp de opt ore.
- q Continuați pentru a finaliza zilele trei și patru din procedura de pornire.

## Pasul 6

- q Când ați terminat procedura de pornire, treceți de acolo la Protocolul 1000 și continuați cu HRP după cum este necesar (a se vedea capitolul 5).

**Notă:** *Protocolul 6 și 6 tratează adesea rapid o varietate de boli viitoare prin distrugerea agenților patogeni înainte ca aceștia să poată obține un control puternic în organism. Cu toate acestea, am constatat că atunci când aceste două prime doze de 6 picături nu elimină problema în mugur, atunci cel mai bine este să mergeți la doze orare conform HRP (vezi Capitolul 5). Dacă continuați să luați doze de 6 picături în fiecare oră, veți provoca probabil o reacție Herxheimer și acest lucru va încetini vindecarea pe termen lung. Deci, dacă după două doze de 6 picături nu sunteți bine, începeți procedura de pornire și continuați cu HRP, după cum este necesar.*

## Protocolul 4000

Acest protocol presupune utilizarea MMS2 (hipoclorit de calciu) pe cont propriu, adică fără utilizarea MMS1 în același timp. Protocolul 4000 nu este utilizat în linia HRP (Health Recovery Plan) ca următorul pas după Protocolul 3000, ceea ce s-ar putea crede că implică numele acestuia. Acesta a fost inițial menit să fie utilizat mai ales în situații de urgență atunci când cloritul de sodiu (MMS) nu era disponibil.

Protocolul 4000 ia practic 5 capsule de MMS2 pe zi.

# **Instrucțiuni pentru Protocolul 4000**

## **Pasul 1**

- q Alcătuieste câteva capsule MMS2 și urmează procedurile cu privire la modul de creștere a dozelor, conform instrucțiunilor din Protocolul 2000, pașii 3 și 4 (vezi pagina

93). În prima zi luați în total 5 capsule de MMS2. Umpleți primele 2 capsule așa cum s-a sugerat la Pasul 3 și apoi continuați să măriți încet cantitatea conform instrucțiunilor din Pasul 4. (Vezi și MMS2 — Detalii, pagina 274.)

## **Pasul 2**

- q După ce ați atins doza maximă de dimensiune, continuați să luați 5 capsule de MMS2 pe zi. Distanțeați fiecare doză cu două ore.

## **Pasul 3**

- q Faceți acest lucru timp de 21 de zile sau până bine. Asigurați-vă că respectați cele trei reguli de aur ale MMS.

## **Note**

† *Amintiți-vă, în caz de greață sau diaree, reduceți cantitatea de hipoclorit de calciu din fiecare capsulă cu 50%. Când aceste simptome scad, creșteți încet cantitatea la cantitățile sugerate date la pagina 94.*

† ***Nu luați niciodată o capsulă MMS2 și o doză care conține DMSO în același timp!*** Pentru o explicație completă, consultați paginile 23-24.

† ***Întreținerea capsulelor MMS2:*** Luați o capsulă din doza maximă dată pentru MMS2 la pagina 94 o dată (fie dimineața, fie seara), în fiecare zi, pentru întreținere. Dacă nu ați luat MMS2 înainte de a începe administrarea unei doze de întreținere, treceți treptat la această doză sugerată.

## Procedura de vaccinare

Din câte știu, pe baza a 20 de ani de lucru cu MMS, cred că MMS poate ajuta la evitarea leziunilor cauzate de vaccinuri atunci când este urmat procesul descris mai jos. Din toate mii de oameni care au folosit MMS există numeroase dovezi că MMS elimină otrăvurile, toxinele și ucide agenții patogeni care cauzează boli. Conform fișelor informative incluse în vaccinuri, majoritatea vaccinurilor conțin aceste lucruri. Prin urmare, este evident că MMS ar fi eficient în neutralizarea oricăror efecte secundare negative posibile ale vaccinurilor, utilizate în câteva minute, ore sau chiar câteva zile după vaccinare. (Totuși, cel mai bine este să o faceți cât mai curând posibil după vaccinare.)

Mulți oameni sunt îngrijorați de posibilele leziuni de vaccin, iar un număr tot mai mare de părinți nu vor ca copiii lor să fie supuși lor. Prin urmare, vreau să prezint următoarea procedură. Include Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO, pe care l-am găsit a fi foarte eficient în neutralizarea otrăvurilor și toxinelor pielii.

Cei dintre voi din SUA și din alte țări unde este posibil, poate doriți să investigați cum să solicitați scutirea religioasă de la vaccinuri. Cu toate acestea, dacă vă aflați într-o poziție în care nu aveți de ales decât să luați un vaccin, poate doriți să încercați acest protocol.



**Notă:** *Vă sugerez să urmați această procedură folosind MMS1 picături amestecate proaspăt pe oră, nu alte forme de MMS (CDS sau CDH).*

## **Instrucțiuni pentru procedura de vaccinare - Dozarea pentru adulți**

### **Două săptămâni înainte de vaccinare**

- q Efectuați procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000 (consultați paginile 79-87).

### **Ziua Vaccinului**

- q Luați 6 picături de MMS1 (MMS activat) la fiecare două ore, (pentru un total de 4 ori) pe parcursul unei perioade de opt ore. Începeți această doză cu una până la două ore înainte de a primi vaccinul.
- q **Imediat după vaccinare** este injectat (de preferință când vă întoarceți la mașină sau în momentul în care ajungeți acasă - deși cu cât mai devreme cu atât mai bine), efectuați protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO (vezi pagina 135). Patch-ul MMS1 / DMSO va ajuta la neutralizarea toxinelor din vaccin.
- q Aplicați acest platură încă o dată în ziua vaccinării, la trei ore după prima aplicare. Dacă simțiți nevoia să aplicați un al treilea platură în alte trei ore, puteți face acest lucru. Dar trei patch-uri în total ar trebui să fie suficiente.

**Notă:** *Vă rugăm să fiți sânguincioși pentru a urma cu atenție instrucțiunile pentru realizarea unui plasture MMS1 / DMSO la pagina 135. Adăugați mai multă apă pe plasture sau întrerupeți utilizarea dacă există arsuri sau iritații. Urmăriți cu atenție.*

## **Ziua după vaccinare**

- q Continuați Protocolul 1000 timp de o săptămână pentru a vă asigura că toate toxinele sunt eliminate din organism.

## Note

† *Dacă în orice moment, în timp ce luați aceste doze, începeți să simțiți greață sau diaree, reduceți aportul de MMS1. Reduceți suma pe care o luați în jumătate, apoi reveniți de acolo atunci când sentimentele de rău se potoli.*

† *Pot exista momente în care nu aveți niciun avertisment înainte de a vă vaccina. Uneori, atunci când călătoriți, vaccinările pot fi necesare pentru a intra în diferite țări. Dacă nu aveți avertisment înainte de a vă vaccina, pur și simplu începeți cu punctele „Ziua vaccinului” enumerate mai sus. În acest caz, în funcție de modul în care reacționează corpul dumneavoastră, poate doriți să continuați Protocolul 1000 timp de trei săptămâni după vaccin, în loc de o săptămână.*

† Aceeași procedură se aplică vaccinărilor orale, cu excepția faptului că nu ar fi nevoie de protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO.

## Instrucțiuni pentru procedura de vaccinare - dozare pentru copii

Procedura de vaccinare pentru copii urmează o rutină similară cu cea a adulților. Adică cu două săptămâni înainte ca vaccinul să înceapă protocolul. Apoi, există sugestii de dozare specifice pentru ziua vaccinului și instrucțiuni suplimentare pentru ziua următoare vaccinului etc. Cantitatea de picături de MMS1 administrată copiilor trebuie ajustată în funcție de greutatea copilului.

Adulții respectă procedura inițială standard și Proto-col 1000 pentru o mare parte din această procedură pentru vaccinuri. În cazul copiilor, vă sugerez, de asemenea, să faceți procedura standard de pornire și Protocolul 1000 pentru copii (calculată în funcție de greutatea copilului), care este listată la paginile 256-258. Aceasta este atâta timp cât există o notificare în avans cu una sau două săptămâni înainte de a primi un vaccin. Dacă este mai puțin

cu o săptămână de avertizare în avans, dozați copilul în conformitate cu diagrama de dozare a vaccinului pentru copii (de mai jos) cu cât mai multe zile înainte de vaccin. Sau, dacă nu există niciun avertisment, puteți începe cu Diagrama Vaccinului în ziua vaccinului.

## **Două săptămâni înainte de vaccinare**

- q Începeți cu procedura de pornire urmată de Protocolul 1000 pentru copii (paginile 256-258) și rămâneți cu aceasta până în ziua vaccinului.
- q Dacă nu puteți începe cu una sau două săptămâni în avans, începeți totuși dozarea în conformitate cu diagrama de dozare a vaccinului pentru copii ori de câte ori puteți, fie cu o săptămână în avans, cu trei zile în avans, fie în orice caz.

### **Diagrama de dozare a vaccinurilor pentru copii**

<b>Greutate</b>	<b>MMS1 Dozare</b>
<b>Bebeluşii care cântăresc mai puțin mai mult de 3,2 kg</b>	<b>Porniți-le cu 1/4 picătură pe ora prima zi, apoi 1/2 aruncați o oră după aceea.</b>
<b>7-24 lbs (3,2-10</b>	<b>Începeți-le cu 1/2</b>

	<b>picătură per</b>
<b>kg)</b>	<b>ora pentru prima zi și</b>
	<b>3/4</b>
	<b>picătură pe oră după</b>
	<b>aceea.</b>

---

**Peste 25 kg (11 kg), regula de bază este de a da 1 picătură de MMS1 (MMS activat) pentru fiecare 25 kg suplimentar pentru un copil.**

<b>25-49 lbs (11-22</b>	
<b>kg)</b>	<b>1 picătură pe oră</b>

---

<b>50-74 lbs (22-33</b>	
<b>kg)</b>	<b>2 picături pe oră</b>

---

<b>75 kg (34 kg) și</b>	
<b>peste</b>	<b>3 picături pe oră</b>

---

## Ziua Vaccinului

- q Oferiți copilului cantitatea adecvată de picături de MMS1 (MMS activat) în conformitate cu Diagrama vaccinului pentru copii (vezi mai jos). Faceți acest lucru la fiecare două ore, (pentru un total de 4 ori) pe parcursul unei perioade de opt ore. Începeți această doză cu una până la două ore înainte de administrarea vaccinului.
  
- q **Imediat după vaccinare** este injectat (de preferință când vă întoarceți la mașină sau în momentul în care ajungeți acasă - deși cu cât mai devreme cu atât mai bine), efectuați protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO (vezi pagina următoare). Sau, în cazul unui bebeluș sau al unui copil cu piele foarte sensibilă, urmați instrucțiunile pentru ajustarea protocolului plasturelui pentru bebeluși și persoane cu piele sensibilă (vezi pagina următoare). Patch-ul MMS1 / DMSO va ajuta la neutralizarea toxinelor din vaccin.
  
- q Aplicați acest plasture încă o dată în ziua vaccinării, la trei ore după prima aplicare. Dacă simțiți nevoia să aplicați un al treilea plasture în alte trei ore, puteți face acest lucru. Dar trei patch-uri în total ar trebui să fie suficiente.

**Notă:** *Vă rugăm să fiți sânguincioși pentru a urma cu atenție instrucțiunile pentru realizarea unui plasture MMS1 / DMSO la pagina 135. Adăugați mai multă apă pe plasture sau întrerupeți utilizarea dacă există arsuri sau iritații. Urmăriți cu atenție.*



## **Ziua vaccinului MMS1 Doze pentru copii**

<b>Greutate</b>	<b>MMS1 Dozare</b>
<b>Bebeluși sub 3 kg (7 lbs)</b>	<b>3/4 picătură la fiecare 2 ore</b>
<b>7-24 lbs (3,2-10 kg)</b>	<b>1 picătură la fiecare 2 ore</b>
<b>25-49 lbs (11-22 kg)</b>	<b>2 picături la fiecare 2 ore</b>
<b>50-74 lbs (22-33 kg)</b>	<b>4 picături la fiecare 2 ore.</b>
<b>75 kg (34 kg) și peste</b>	<b>6 picături la fiecare 2 ore.</b>

## **Reglarea protocolului de patch-uri MMS1 / DMSO pentru ba-bies și persoanele cu piele sensibilă**

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți bine instrucțiunile pentru protocolul standard MMS1 / DMSO Patch (pagina 135). Acest protocol este practic aceeași procedură, dar cantitățile de picături de MMS1 / apă și momentul aplicării plasturelui sunt ajustate pentru a se potrivi pielii sensibile.

- q Începeți cu 5 picături de MMS1 (MMS activat). Adăugați 5 picături de DMSO și încă 10 picături de apă pentru a dilua soluția.
- q Pentru prima aplicație nu aplicați plasturele mai mult de cinci minute.
- q Când plasturele este îndepărtat, luați notă dacă există iritații. Dacă nu există iritații după cinci minute cu primul plasture, în două ore aplicați un alt plasture, de data aceasta lăsați-l să acționeze 15 minute. Dacă nu există iritații ale pielii sau arsuri la următoarea aplicare de 15 minute, este bine să continuați cu încă o aplicare (în cazul unui vaccin) dacă simțiți nevoia.
- q Dacă în orice moment există iritații ale pielii sau arsuri, atunci dublați cantitatea suplimentară de apă peste cea utilizată la ultima aplicare.

## **Ziua după vaccinare**

- q Continuați să administrați copilul în conformitate cu diagrama de dozare a vaccinurilor pentru copii (pagina 176) timp de 1 săptămână pentru a vă asigura că toate toxinele sunt eliminate din organism.

## Note

† *Pentru instrucțiuni despre măsurarea unei fracțiuni de picătură, consultați Procedura de pornire, pagina 79.*

† ***Nu depășiți niciodată cantitatea maximă de MMS1 pe oră pentru fiecare categorie de greutate.***

† *Amintiți-vă, dacă în orice moment în timp ce luați aceste doze, copilul dumneavoastră începe să simtă greață sau diaree, reduceți aportul de MMS1. Reduceți cantitatea în jumătate, apoi reveniți de acolo atunci când sentimentele de rău se potoli.*



**Infecție a sinusurilor:** Am o stare sinusală de ani de zile. Sinusurile mele au fost întotdeauna blocate, mai ales dimineața. De asemenea, am primit sânge în țesuturi destul de des când mi-am suflat nasul pentru a ameliora blocajele. Inițial luam MMS pentru că îmi era mereu foame și din cauza asta supraponderală. Aceasta a fost doar o simplă lovitură în întuneric după ce am citit poveștile de succes ale altor oameni. Rezultatele administrării MMS au fost că foamea mea constantă a dispărut și, spre surprinderea mea, și starea sinusală a dispărut.

Am afecțiunea sinusală atât de mult, încât mi s-a părut normal. În retrospectivă, cred că ambele au fost cauzate de candi-da. —Chris, Statele Unite



**Recuperarea Nefritului:** Aveam nefrit și ambele picioare mi s-au umflat de peste doi ani. A apărut Protocolul 1000 și în 10 zile umflăturile s-au retras și acum amândouă picioarele mele au revenit la normal. Mulțumesc Jim. —Andy Z., Statele Unite

## **Protocolul asupra malariei**

Malaria este una dintre cele mai simple boli de tratat cu MMS, deoarece necesită doar 1 sau 2 doze de picături de MMS1. Cu toate acestea, spre deosebire de utilizarea MMS1 pentru alte afecțiuni, pentru malarie se administrează o doză inițială foarte puternică de picături activate (MMS1), urmată de o doză mai puternică o oră sau două mai târziu. În alte circumstanțe, în mod normal nu ați da o doză atât de puternică și, dacă ați face-o, persoana ar fi probabil greață sau ar putea vomita, cu excepția cazului în care a lucrat până la această cantitate încet. Dar, în cazul malariei, acest lucru se întâmplă foarte rar, iar doza mare pare să scoată parazitul malariei în aproximativ patru ore, în mod normal fără greață sau boli suplimentare.

În cărțile din trecut, am sugerat utilizarea unei doze de 15 picături de MMS1 pentru a trata malarie. Dar, deoarece parazitul malariei pare să varieze mult în ceea ce privește capacitatea sa de a rezista la oxidarea cauzată de MMS1 (dioxid de clor) în timp ce se află în organism, am constatat necesitatea ajustării acestei doze. Rămân doar patru tulpini de malarie care afectează oamenii. Cu toate acestea, aceste patru tulpini variază foarte mult în ceea ce privește rezistența sau slăbiciunea de la o regiune la alta și, prin urmare, rezistența lor la puterea de oxidare a MMS1.

În mod normal, o doză unică de 18 picături activate de MMS va ucide majoritatea tulpinilor de malarie la un adult, dar, din păcate, nu întotdeauna. Pentru unele zone de

malaria din lume este nevoie de până la 30 de picături într-o singură doză pentru a elimina malaria, în timp ce în alte zone este nevoie de doar 6 picături pentru a ucide total malaria la un adult. Așa cum am spus mai sus, în mod normal, o doză de 18 picături va face față majorității malariei, iar asta sugerăm pentru doza de bază de malaria. Nu ați dori să începeți pe cineva cu o doză de 30 de picături de MMS1 dacă nu este necesar, deoarece acest lucru ar putea face oamenii extrem de greați.

Deci, mai ales când cineva se află într-o zonă de malarie și încearcă să ajute multe cazuri de malarie, el / ea trebuie să determine doza minimă necesară pentru a ucide malarie, în regiunea lor specifică. Voi prezenta cum să merg mai departe în această secțiune.

Femela țânțar *Anopheles* este purtătorul parazitului malariei. Când cineva este mușcat de un țânțar care transportă malarie, paraziții malariei călătoresc la ficat, unde se înmulțesc și, în cele din urmă, își fac drumul în sânge după șapte zile sau mai mult. Când sunt în sânge, încep să preia și să distrugă globulele roșii. Acesta este punctul în care victima se îmbolnăvește și simte toate simptomele malariei. Nu se va simți niciun simptom până când malarie nu se deplasează afară din ficat și în sânge. MMS1 poate ucide paraziții malariei înainte de a părăsi ficatul sau poate ucide paraziții din sânge.

Când MMS1 se administrează pe cale orală, pare să aibă cel mai bun efect împotriva malariei. În mod normal, 98% din totalul malariei este tratat cu 2 doze orale de MMS1 și nu trebuie să mergeți mai departe pentru a ajuta victima malariei. Cu toate acestea, am adăugat instrucțiuni suplimentare mai jos pentru situația în care sunt necesare doze mai mari și, de asemenea, pentru zonele care nu necesită doze mari de 18 picături.

Fâșiile de testare rapide (teste rapide de diagnostic pentru RDT ale malariei) care sunt utilizate pentru a determina dacă o persoană are malarie sunt considerate eficiente. Cu toate acestea, benzile de testare rapide nu pot fi utilizate pentru a spune dacă o persoană este liberă de malarie după ce a luat MMS1 sau oricare dintre celelalte tratamente diferite pentru malarie. Acest lucru se datorează faptului că antigenele malariei vor fi prezente în sânge timp de săptămâni. Antigenele sunt cele care dau o



lectură pozitivă care poate fi falsă. Testarea precisă pentru a determina dacă o persoană nu prezintă malarie implică examinarea sângelui la microscop. (Vezi pagina 185.)

### **O uncie de prevenire ...**

Pentru toți cei care trăiesc într-o regiune cunoscută a malariei sau călătoresc într-o regiune cunoscută a malariei, sugerez cu tărie o doză zilnică de întreținere a MMS1. Prevenirea este mai bună decât boala. (Consultați pagina 200 pentru detalii despre doza de întreținere atât pentru adulți, cât și pentru copii.)

## **Instrucțiuni pentru Protocolul Malariei**

### **Adulți**

#### **Pasul 1**

- q O persoană trebuie să ia o doză de 18 picături de MMS1 (MMS activat) în 3/4 cană (6 oz sau 180 ml) de apă purificată, dacă este posibil.

#### **Pasul 2**

- q În decurs de una până la două ore după prima doză, repetați Pasul 1 de mai sus - adică luați o altă doză de 18 picături de MMS1.

**Notă:** *Două doze de 18 picături vor depăși 90% din totalul malariei cazuri. De fapt, de obicei, prima doză de 18 picături ucide malaria, dar vă sugerez să administrați o a doua doză de 18 picături doar pentru a vă asigura că malaria dispare complet. Aceasta este procedura de dozare de bază pentru malarie.*

### **Acțiuni suplimentare care pot fi necesare pentru doza de bază a malariei**

q Când urmați doza de bază pentru malarie, (dată mai sus), dacă prima doză de 18 picături pare să producă malaria

victima mai bolnavă, aceasta indică faptul că este nevoie de mai puțin MMS1. Persoana ar trebui să bea apă până când trece boala provocată de doza de MMS1 și ar trebui să fie în regulă. Dacă simptomele sale de malarie nu s-au calmat și nu se simte mai bine, atunci îi sugerez să ia o a doua doză de MMS1, dar cu 25% mai puține picături - aceasta ar fi o doză de 13 picături. Chiar dacă simptomele sale de malarie au dispărut după prima doză de 18 picături și chiar dacă doza respectivă l-ar fi îmbolnăvit puțin inițial, ar fi înțelept să-i mai dai o doză de 13 picături, pentru a fi sigur că toată malaria este eradicat.

q Dacă primele 2 doze (fie două doze de 18 picături, fie o doză de 18 picături și o doză de 13 picături) nu depășesc malaria în decurs de patru ore, cu alte cuvinte în patru ore dacă persoana nu se simte mult mai bine, apoi administrați a treia doză la sfârșitul celor patru ore. Această a treia doză trebuie să fie de 18 picături de MMS1 dacă victima malariei nu a prezentat nicio boală suplimentară cu primele două doze de 18 picături. Sau, dacă persoana respectivă a trebuit deja să coboare la o doză de 13 picături, așa cum este explicat în paragraful de mai sus, atunci dați o altă doză de 13 picături pentru a treia doză. După această a treia doză, așteptați două ore. Dacă simptomele malariei au dispărut, puteți presupune că totul este în regulă și individul poate pleca acasă. (În cazul în care încep să se simtă din nou rău a doua zi, ar trebui să se întoarcă și să ia mai multe MMS1. Ar putea exista o varietate de motive pentru care persoana ar putea începe să se simtă din nou rău. Vedeți explicații suplimentare mai jos.)

q Dacă simptomele malariei continuă după administrarea a 3 doze de MMS1, victima trebuie să continue să ia MMS1 la fiecare oră, dar să reducă doza la 6 picături de MMS1 la fiecare oră. Dacă victima se îmbolnăvește în timp ce ia cele 6 picături pe oră, opriți imediat MMS1; nu ar trebui să oferiți persoanei mai

mult MMS1 până când boala sa suplimentară cauzată de MMS1 nu dispare.

q În cazul în care o persoană a trebuit să renunțe la dozele de 6 picături, așteptați până când boala adăugată dispare și apoi el

ar trebui să înceapă la Protocolul 1000, pe care ar trebui să-l continue urmând instrucțiunile din această carte, crescând sau mergând la protocolul următor, așa cum este sugerat în Planul de recuperare a sănătății (HRP). El poate opri administrarea MMS1 atunci când malaria dispare, cu excepția cazului în care este prezentă o boală suplimentară sau boală care ar indica, de asemenea, continuarea respectării Protocolului 1000 și respectarea celor Trei Reguli de Aur ale MMS.

## Note

q *După cum am menționat mai sus, dozarea standard MMS1 a două doze de 18 picături va eradica cel mai adesea malaria. Dacă găsiți necesitatea de a continua să administrați doze de MMS1, așa cum am explicat mai sus, acest lucru poate fi necesar din mai multe motive. Pot exista mulți factori implicați în ecuație, care ar necesita continuarea cu MMS1. De exemplu, un motiv major ar putea fi faptul că victima malariei are, de asemenea, o altă boală - sau chiar mai multe boli - în plus față de malarie, iar acest lucru ar necesita mai mult MMS1 și, eventual, MMS2.*

q *În plus, rețineți toate motivele pentru care MMS ar putea să nu aibă un efect, așa cum este subliniat în capitolul 8 al acestei cărți. Din fericire, malaria este eliminată foarte repede cu MMS1, cu toate acestea persoana nu ar trebui să mănânce sau să bea lucruri care nu sunt compatibile cu MMS1 în timp ce iau dozele și așa mai departe. Amintiți-vă, dacă MMS1 pare să nu funcționeze - ar putea exista multe motive pentru care. Deci, într-un caz în care MMS1 pare să nu funcționeze, cel mai bun mod de acțiune ar fi ca persoana să înceapă cu Protocolul 1000 la 1 picătură activată pe oră și să urmeze*

*conform instrucțiunilor de protocol conform Planului de recuperare a sănătății.*

q *Au existat cazuri în care cineva a avut încă malarie a doua zi și s-a descoperit că nu-i plăcea gustul și scuipa doza fără ca nimeni să știe. Dacă*

*persoana nu ia întreaga doză, s-ar putea foarte bine să nu funcționeze. Aceasta poate fi o problemă cu copiii mici care au probleme cu gustul.*

## **Ajutarea maselor să se refacă după malarie**

Următoarele instrucțiuni țin cont de faptul că cineva se află într-o zonă a malariei din lume, cu intenția de a ajuta mulți oameni să se recupereze din malarie. Așa cum am menționat mai sus, am constatat că există momente în care trebuie să acordați fie o cantitate mai bună sau mai mică din doza standard de malarie pentru a ajuta oamenii să-și revină sănătatea. Din nou, acest lucru se datorează faptului că diferitele tipuri de malarie par a fi mai strânse sau mai slabe în diferite zone, din mai multe motive, pe care nu le voi analiza aici. Dar concluzia este că veți dori să determinați ce doză standard de MMS1 ar trebui să fie pentru tipul special de malarie care prevalează în zona în care vă aflați.

Într-o situație în care aveți doar unul sau două cazuri de malarie de gestionat, este posibil să nu fie important dacă trebuie să vă alocați victimelor malariei mai multe doze - acestea se vor face bine, deși ar putea dura puțin mai mult. Dar într-o situație în care s-ar putea să aveți sute sau chiar mii de oameni pentru a ajuta, veți dori să uciideți malaria cu prima doză, urmată de a doua în două ore, deoarece mulți nu vor putea reveni pentru mai multe doze dintr-o varietate de motive. Prin urmare, cel mai bine este să aveți grijă de el cât mai repede posibil. Acesta este motivul principal și foarte important pentru care vă recomand să determinați cu ce doză să începeți, astfel încât să eliminați rapid malaria într-o anumită regiune.

## **Microscop**



Mulți oameni care și-au propus să ajute la eliminarea malariei cred că trebuie să aibă un microscop pentru a determina dacă malaria este prezentă și când este eliminată. Ar fi frumos dacă unul

trebuia să aibă un microscop și un tehnician pentru a determina dacă malaria dispare complet, dar din păcate în Africa și în multe locuri ale lumii acest lucru nu este întotdeauna posibil din cauza finanțelor și din alte motive. Dacă aveți un microscop și puteți determina prezența sau absența malariei în sânge, este util, dar este departe de a fi o necesitate absolută.

Crede-mă, în zonele din lume ale malariei, oamenii știu dacă au sau nu malarie. Ei trăiesc cu ea an de an; din păcate, este o parte din viața lor. Știu când sunt bolnavi de ea și știu când se simt bine. Deci, determinați cum se simte persoana, deoarece atunci când utilizați MMS dacă cineva se simte mult mai bine, este în mod normal un indiciu clar că a depășit malaria. Acest lucru poate să nu fie adevărat în cazul altor medicamente împotriva malariei, dar după ce a luat MMS1 și victima malariei spune că se simte bine, poți fi destul de sigur că nu are malarie. Când folosiți microscopul, va trebui să așteptați 24 de ore pentru a dovedi că toată malaria a dispărut, în timp ce sunt necesare doar aproximativ patru ore, întrebând pur și simplu persoana cum se simte. A fost experiența mea după ce am ajutat mii de victime ale malariei,

Mulți oameni care se simt bine merg acasă după patru ore și nu se mai întorc niciodată. Cu toate acestea, după ce ați luat MMS1, un test de mic-scop după doar patru ore nu va fi probabil corect. Acest lucru se datorează faptului că, deși MMS ucide otrăvurile, paraziții morți și alte materiale rămân în sânge mai mult timp. Perioada standard de timp înainte de testarea cu microscopul pentru a vedea dacă unul este

liber de malarie, ar fi să așteptați 24 de ore după ultima doză a persoanei pentru a fi siguri că malaria dispare.

**Mai slab decât tulpinile normale ale malariei - Când se reduc picăturile din doza standard de 18 picături**

q Dacă după ce mai multe victime ale malariei au luat doze de 18 picături și par să se îmbolnăvească la început, acest lucru indică faptul că tipul de malarie din zonă este o tulpină mai slabă și puteți da mai puține picături pentru a începe. În acest caz, următoarea victimă a malariei din rând poate lua mai puține picături. Reduceți picăturile cu 25% din doza standard de 18 picături. Aceasta înseamnă că ați începe să administrați doze de 13 picături de MMS1. Dacă acest lucru începe să îi ajute pe oameni să se îmbunătățească sau nu se simt mai bolnavi la două ore după administrarea primei doze, dați întotdeauna o a doua doză de 13 picături (după două ore) doar pentru a vă asigura că malaria dispăre.

q Am menționat mai devreme că am fost în zone din lume în care malaria a fost tratată cu o doză de 6 picături de MMS1. Regula generală și principiul de bază al MMS este că, în cazul în care victima se îmbolnăvește mai mult decât boala sa îl face deja cu dozele de MMS1, atunci trebuie să reduceți doza, dar nu încetați să administrați MMS1. Deci, în cazul în care doza de 13 picături încă îmbolnăvește, reduceți din nou doza. Încercați o doză de 8 picături data viitoare sau pentru următoarea persoană, continuați procesul până când găsiți doza confortabilă care îi ajută pe oamenii din acea regiune să se simtă bine și să nu-i îmbolnăvească. În acest caz, în general vorbind, vorbim despre acordarea următoarei persoane în linie o doză mai mică.

**Notă:** *Amintiți-vă, dacă prima doză a fost prea mare sau primele 2 doze au fost prea mari și a făcut ca victima malariei să se îmbolnăvească în vreun fel, apoi să se retragă și să nu facă nimic timp de câteva*

*ore, deoarece persoana va fi probabil în regulă imediat ce corpul său va elimina majoritatea otrăvurilor. Dă-i apă să bea până se simte mai bine, dar nu forța niciodată apă asupra lui.*

## **Mai puternic decât tulpinile normale de malarie - Când să creșteți picăturile din doza standard de 18 picături de MMS1**

q În cazul în care o persoană are nevoie de trei doze de 18 picături pentru a-și reveni de malarie, puteți fi destul de sigur dacă continuați să ajutați oamenii să-și recupereze sănătatea în aceeași zonă, că următorii oameni care vin la dumneavoastră din acea zonă vor avea nevoie o primă doză mai puternică decât 18 picături. Dacă aveți câțiva oameni care au nevoie de trei doze de 18 picături, acesta este un indicator că este timpul să măriți cantitatea de picături în doza de oameni, dacă doriți să tratați malarie într-o singură doză, urmată de a doua doză sugerată pentru a fi sigur. (În multe zone de malarie oamenii nu pot să stea câteva ore pentru a lua dozele. Deseori există o mică fereastră de timp pentru a-i ajuta. Dacă malarie poate fi eliminată mai repede, cu o doză mai mică, cu atât mai bine). În acest caz, aș crește MMS1 la 25 picături pentru prima doză,

q În cazul în care o doză de 18 picături nu are un efect suficient și oamenii nu se simt bine după 3 doze (pentru mai multe victime ale malariei), începeți să creșteți până când găsiți ce funcționează. Încercați mai întâi doze de 25 de picături și apoi mergeți la 30 dacă este necesar. Poate dura până la 30 de picături pentru a ucide malarie în unele zone.

**Notă:** *Odată ce ați stabilit o doză adecvată pentru în zona în care vă aflați, folosind apă pentru a amesteca dozele, este acceptabil să folosiți sifon sau un suc compatibil cu MMS1 (consultați paginile 42-45 pentru mai multe informații) pentru dozele, deoarece mulți oameni au probleme cu gustul. Apoi, dacă se dovedește, din orice motiv, că sifonul sau sucul nu funcționează, cu alte cuvinte, oamenii nu se mai fac bine, puteți reveni oricând*

*la apă. Nu este niciodată sigur că sifonul sau sucul dintr-o anumită zonă nu vor distruge MMS1 (vezi paginile 42-45).*

## Copii

Doza standard pentru a ajuta copiii să se refacă după malarie trebuie să fie determinată de greutatea copilului. În afară de aceasta, se aplică aceleași principii ca cele menționate mai sus. Cu alte cuvinte, dacă oferiți unui copil doza „nor-mal” de MMS1 pentru malarie și el / ea se îmbolnăvește sau nu se vindecă după 3 doze, atunci urmați aceeași procedură descrisă mai sus pentru a scădea sau crește picăturile. Graficul de la pagina 190 vă va ajuta să determinați doza pentru copii în funcție de greutate.

**Doze MMS suplimentare:** În toate cazurile, dacă dozele de malarie date mai sus nu funcționează și copilul este încă bolnav, există o mare probabilitate de a exista o a doua boală prezentă la victimă. În acest caz, cei care încă prezintă boală ar trebui să înceapă procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000 conform instrucțiunilor pentru copii de la paginile 256-258.



**Alzheimer:** După ce mamei mele i s-a diagnosticat Al-zheimer, a urât atât de mult efectele pilulei încât a fost dispusă să încerce MMS. Simptomele ei au dispărut aproape peste noapte. A doua zi dimineață, după ce a băut doar 6 picături de 3 ori, mi-a spus povestea



despre cum l-a întâlnit pe tatăl meu cu 60 de ani înainte, ceea ce era imposibil cu o zi înainte. A continuat să o ia timp de o săptămână și apoi s-a simțit atât de bine încât a încetat să o mai ia. În decurs de o lună simptomele au revenit. După ce a luat din nou MMS, simpaticii au dispărut din nou. Trebuia să ia o doză zilnică de întreținere pentru a o ține la distanță. Mulțumesc Jim Humble ești eroul meu. —Keith P., Statele Unite

**Notă:** Toate picăturile din graficul următor se referă la picături activate de MMS (MMS1).

Protocolul împotriva malariei pentru copii					
	Sunt necesare picături MMS1				
	Minim	Scăzut	Normal	Mai puternici	Maxim
Greutate	Putere	Putere	Putere	Putere	Putere
	Malarie	Malarie	Malarie	Malaria	Malarie
Bebeluși sub 12 lbs (5,5 kg)	1 picătură doza	2 picături doza	2 picături doza	3 picături doza	3 picături doza
12-24 lbs (5,5 -11 kg)	3 picături doza	3 picături doza	4 picături doza	5-drop doza	7-drop doza
25-49 lbs (11-23 kg)	4 picături doza	5 picături doza	6-picătură doza	8-drop doza	9-drop doza
50-74 lbs.	6-picătură	8-picătură	10 picături	13-picătură	15-picătură

<b>(23-34 kg)</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>
<b>75-100 lbs</b>	<b>8-picătură</b>	<b>11-picătură</b>	<b>14-picătură</b>	<b>18-picătură</b>	<b>22-picătură</b>
<b>(34-45 kg)</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>
<b>100 lbs</b>	<b>10 picături</b>	<b>13-picătură</b>	<b>18-picătură</b>	<b>23-picătură</b>	<b>29-picătură</b>
<b>(45 kg) și sus</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>	<b>doza</b>

## Chikungunya și

## Protocolul privind febra dengue

Atât chikungunya, cât și febra dengue sunt boli virale cauzate de țânțari. Se prezintă din ce în ce mai mult în întreaga lume. Se susține că ambele boli nu au tratament medical specific. Cu toate acestea, organismul poate depăși aceste boli, uneori, după suferințe prelungite și / sau cu complicații dificile. Ambele boli pot provoca moartea. MMS este eficient în a ajuta oamenii să-și recupereze sănătatea într-un timp scurt, atât de chikungunya, cât și de febra dengue.

**Chikungunya:** În general, această boală începe cu apariția bruscă a febrei, adesea însoțită de dureri articulare. Alte simptome frecvente includ dureri musculare, dureri de cap, greață, oboseală și erupții cutanate. De asemenea, poate afecta ochii, urechile și digestia. Este similar cu dengue în anumite moduri și poate fi diagnosticat greșit în zonele în care dengue este obișnuită. În general, organismul se vindecă de boală în câteva săptămâni, dar este posibil ca această boală să devină cronică și, astfel, să dureze luni sau ani. În mod normal, chikungunya apare undeva între patru și douăsprezece zile după ce a fost mușcat de un țânțar purtător de virus.

**Dengue:** Această boală apare de obicei cu febră. Este similar cu chikungunya, dar există unele diferențe importante. Există dureri musculare și articulare extreme și, în general, o erupție cutanată și adesea durere în spatele ochilor. S-ar putea să dispară în patru sau cinci zile sau mai mult, dar după două-patru zile revine cu o erupție care acoperă complet corpul, cu excepția feței. Erupția va fi, de asemenea, adesea în palmele mâinilor și fundul picioarelor. Poate dispărea în câteva zile sau poate dura mult mai mult. În timpul acestei boli pot apărea și frisoane. Uneori devine foarte sever și poate provoca hemoragii și moarte, în special la copiii mici. Febra dengue apare la un interval de trei până la cincisprezece zile după ce a fost mușcat de țânțarul care transporta virusul dengue.

Atât febra dengue, cât și chikungunya pot fi depășite de MMS1 sau MMS2, care ucide virusul și apoi corpul poate reconstrui rapid sănătatea. Depășirea acestor boli nu este la fel ca în cazul malariei. Malaria este un parazit care este un microorganism mult mai mare și necesită un șoc inițial mare (doză) de MMS1 pentru a eradica. Virușii necesită prezența MMS 1 sau 2 pe o perioadă de timp pentru a le

distruge. Am avut cel mai bun succes cu aceste două boli, începând cu două mai puternice decât

doze normale de MMS1, trecând apoi direct la Protocolul 1000, care menține MMS1 prezent în organism timp de opt ore sau puțin mai mult în fiecare zi. MMS2 poate fi înlocuit cu MMS1 (când nu este disponibil) în acest protocol, conform instrucțiunilor de mai jos.

## **Instrucțiuni — Utilizarea MMS1 pentru Dengue și Chikun-gunya**

### **Pasul 1**

- q Faceti protocolul 6 și 6, care ia o doză de 6 picături de MMS1, apoi așteptați o oră și luați a doua doză de 6 picături de MMS1. (Vezi pagina 169 pentru instrucțiuni complete despre Protocolul 6 și 6.)

**Notă:** *Dacă prima doză de 6 picături provoacă greață, scade la 1/2 din aceasta (o doză de 3 picături), pentru a doua doză.*

### **Pasul 2**

- † După două doze de 6 picături (sau doza de 6 picături / 3 picături dacă ați trebuit să reduceți) continuați Protocolul 1000 conform instrucțiunilor de la pagina 84. Continuați Protocolul 1000 timp de cel puțin trei săptămâni (21 de zile).

## Copii

† Dacă ajutați un copil, vă rugăm să urmați dozele adecvate pentru copii pentru Protocolul 6 și 6 și Protocolul 1000. Amintiți-vă, dozarea pentru copii este stabilită în funcție de greutatea copilului. Consultați Capitolul 13 pentru instrucțiuni despre modul de ajustare a dozelor de protocol pentru copii. Respectați toate regulile; de exemplu, reduceți doza atunci când apare greață sau boală crescută.

## **Instrucțiuni — Utilizarea MMS2 pentru Dengue și Chikun-gunya**

Dacă MMS1 nu este disponibil, dar MMS2 (hipoclorit de calciu) este, puteți înlocui MMS2 cu MMS1 cu dengue și chikungunya. Urmăriți cu atenție pașii de mai jos:

### **Pasul 1**

- † Mai întâi, citiți cu atenție instrucțiunile din secțiunea Detalii MMS2, pagina 274, referitoare la MMS2. Nu utilizați MMS2 fără să înțelegeți clar cum funcționează.

### **Pasul 2**

- † Odată ce ați înțeles MMS2 și sunteți pe deplin conștienți de măsurile de precauție necesare pentru utilizarea acestuia, alcătuiți-vă gelul sau capsulele vegetale. Utilizați capsule cu dimensiunea # 0 sau # 1, conform instrucțiunilor de la paginile 275-278.
- † Vă rugăm să rețineți că trebuie să umpleți capsulele cu o cantitate mică de MMS2 la început și să lucrați până la cantitatea recomandată. Acest protocol necesită administrarea a 5 doze (5 capsule în total, 1 capsulă pe doză) de MMS2 pe zi. În prima zi începeți cu cea mai mică cantitate pentru a umple capsulele pentru primele 2 doze, apoi începeți să umpleți capsulele cu mai mult MMS2 în trepte, conform instrucțiunilor de la



pagina 276, Pasul 3). Dacă aveți boală, mai mult decât ceea ce aveți deja din cauza bolii, atunci reduceți cantitatea de MMS2 și mergeți într-un ritm mai lent pentru a ajunge la cantitatea recomandată de MMS2 în fiecare capsulă. Urmați cele trei reguli de aur ale MMS.

### Pasul 3

- Luați 1 capsulă MMS2 la fiecare două ore până când ați luat 5 capsule într-o zi.
- Continuați să luați 5 capsule pe zi până când boala dispăre. În general, dengue și chikungunya vor dispărea în trei sau patru zile, dar totuși continuați cu acest protocol. Nu vă opriți timp de trei săptămâni. Acest lucru este pentru a vă asigura că sunteți în totalitate peste boală și pentru prevenirea împotriva recidivelor.

### Copii

**Nu recomand MMS2 pentru copii mici și nici pentru toți copiii, indiferent de vârsta sau greutatea lor.**

Există excepții de la aceasta, dar nu continuați să oferiți copiilor MMS2 până când nu citiți instrucțiunile și instrucțiunile referitoare la MMS2 și copiii de la paginile 259-260. Dacă după ce ați citit că determinați că copilul poate lua capsule MMS2, procedați conform instrucțiunilor următoare.

- q Utilizați capsulele de legume sau gel de dimensiunea 3 pentru copii, umplute 1/8 pline cu MMS2 pentru a începe și lucra până la umplerea lor 3/4 pline.
- q Dacă apare greață sau boală crescută, reduceți pulberea din capsule la jumătate. Dacă este necesar,

continuați să reduceți până când capsulele nu cauzează boli suplimentare sau greață. Puteți încerca din nou să măriți încet pulberea la doza recomandată, dar reduceți-o de fiecare dată când apare o boală suplimentară.

- q Amintiți-vă, dați acest lucru numai unui copil suficient de în vârstă și de încredere pentru a înghiți în mod corespunzător o capsulă fără a o rupe în proces.

## **Virusul Ebola**

Boala virusului Ebola este severă și adesea fatală. La momentul scrierii acestui articol, se spune că ucide până la 50% dintre persoanele infectate. Se răspândește mai ales prin contactul cu o persoană infectată și uneori prin contactul cu o suprafață, cum ar fi un birou, un scaun sau o masă cu care o persoană infectată a luat contact. Simptomele pot include febra, greață, vărsături, diaree, ochi roșii, erupții cutanate ridicate, dureri în piept, tuse, dureri de stomac, pierderea în greutate, sângerări de la ochi, urechi, nas, rect și multe sângerări interne.

În Africa de Vest, miniștrii Bisericii Genesis II au avut succes în a ajuta oamenii să depășească boala virusului Ebola. Acest lucru a fost confirmat, atunci când este posibil, în testele de laborator înainte și după în unele dintre cazuri.

Protocolul utilizat a fost practic același cu Protocolul Chikungunya / Febra Dengue (vezi pagina 190). Victimele și-au recuperat sănătatea în șapte până la zece zile. Cu toate acestea, sugerez cu tărie că, chiar dacă vă simțiți bine într-o săptămână până la zece zile, să completați cele 21 de zile complete ale protocolului pentru a evita o posibilă recidivă.

## **Virusul Zika**

În momentul scrierii acestei cărți, virusul Zika, răspândit și de un țânțar cu similitudini atât cu chikungunya, cât și cu febra dengue, devine din ce în ce mai răspândit în lume.

În prezent, conform CDC (Centre for Disease Control and Prevention), majoritatea persoanelor infectate cu boala virusului Zika nu vor avea simptome. Perioada de incubație pentru boala virusului Zika nu este cunoscută, dar este probabil să fie de câteva zile până la o săptămână. Cele mai frecvente simptome ale Zika sunt febră, erupții cutanate, dureri articulare sau conjunctivită (ochi roșii), dureri musculare și cefalee.

Până în prezent, nu am primit suficiente dovezi continue de succes folosind MMS1 sau MMS2 cu virusul Zika. Cu toate acestea, am primit confirmarea de la unii miniștri ai sănătății, a persoanelor care își recuperează sănătatea completă de la Zika după ce am urmat protocolul prezentat în această carte pentru chikungunya și febra dengue.

Dacă vă aflați într-o zonă Zika și bănuți că ați fost infectat sau doriți să îi ajutați pe ceilalți care sunt infectați, aș sugera același protocol. Păstrați dozele orare, așa cum sunt date în protocol, până când simptomele dispar complet și sănătatea este restabilită.

## **Mușcături de țânțar**

Când este mușcat de un țânțar, tamponați o picătură de MMS neactivat chiar pe mușcătură și frecați-l ușor. Mâncărimea ar trebui să se oprească în câteva minute. De obicei, nu este necesar să spălați MMS după ce îl frecați, dar dacă preferați, spălați zona cu apă și săpun după ce ați așteptat cel puțin cinci minute.

## **Protocolul MRSA**

MRSA (Staphylococcus Aureus rezistent la metilicilină), este cunoscut sub numele de stafilococ. Atât în interiorul cât și în exteriorul corpului, această infecție poate deveni o problemă. Este o infecție rezistentă la

toate antibioticele cunoscute. Din păcate, în fiecare an MRSA ucide mulți oameni. Din fericire cu MMS, este ușor de controlat.

MRSA poate fi o problemă atât internă, cât și externă, manifestându-se în erupții dureroase din exteriorul corpului. Oricine are MRSA ar trebui să ia protocoale MMS1 conform Planului de recuperare a sănătății, începând cu procedura de pornire și apoi cu Protocolul 1000 și continuând cu mai multe protocoale, dacă este necesar, așa cum este subliniat în

această carte. Cei cu erupții cutanate ar trebui, de asemenea, să utilizeze dioxid de clor gazos (așa cum se explică în instrucțiunile următoare) pentru aceste erupții externe, deoarece aceasta tratează infecția destul de ușor. Aceeași procedură este, de asemenea, eficientă pentru orice fierbere standard.

## **Instrucțiuni pentru depășirea MRSA (și fierbe)**

### **Pasul 1**

- q Începeți luând MMS1 cu procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000 (consultați paginile 79-87).

**Notă:** *Pentru cei care au MRSA care se manifestă pe în afara corpului sau a celor care fierb, începe imediat pașii următori folosind dioxid de clor gazos, în timp ce începe simultan pasul 1 de mai sus. Dacă se preferă, protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO poate fi utilizat și pe răni sau furuncule MRSA în locul următoarei proceduri (vezi pagina 135).*

### **Pasul 2**

- q Găsiți un pahar, o ceașcă sau un castron care să se potrivească peste infecția cu MRSA sau fierbe. Cel mai bine este dacă vasul sau ceașca este din sticlă transparentă, astfel încât să puteți vedea prin el și să observați ce se întâmplă. Sticla este de preferat, dar un recipient din plastic transparent ar funcționa.



Dacă nu găsiți acest lucru, atunci utilizați o ceașcă sau un castron de cafea obișnuit.

### **Pasul 3**

- q Goliți zona din jurul infecției cu MRSA sau fierbeți astfel încât ceașca sau paharul să poată sta în siguranță peste și în jurul infecției și astfel încât niciun gaz MMS să nu poată scăpa. Veți ține paharul în loc. Nu va fi acolo mai mult de cinci minute.

## Pasul 4

- q Determinați câte picături de MMS1 (MMS activat) să utilizați. În funcție de mărimea infecției, utilizați de la 5 la 20 de picături de MMS1 (folosind 4% HCl sau 50% acid citric pentru activare). Utilizați 5 picături pentru o infecție cu MRSA sau pentru a fierbe cu diametrul de aproximativ 1,25 cm (1/2 inch). Utilizați 10 picături de MMS1 pentru o infecție cu MRSA sau fierbeți 2,5 cm. Pentru orice durere de 2 inci (5 cm) sau mai mare în diametru, utilizați 15 până la 20 de picături.

## Pasul 5

- † Folosind Pasul 4 de mai sus ca ghid pentru numărul de picături de utilizat, puneți aceste picături în recipient și acoperiți imediat infecția sau fierbeți. Aveți grijă să țineți recipientul, astfel încât MMS1 să nu vă curgă pe piele și, astfel, să nu permiteți scăparea gazului. Este posibil să trebuiască să vă întindeți sau să vă aplecați, în funcție de locul fierberii.
- † **Nu aplicați acest lucru mai mult de cinci minute maximum**, pentru a evita arderea pielii. Dacă aveți o piele deosebit de sensibilă, cel mai bine ar fi să faceți această procedură timp de doar trei minute prima dată pentru a vedea cum reacționează pielea. Dacă pielea reacționează bine, se poate repeta din nou în patru ore (a se vedea instrucțiunile de mai jos) și timp de până la cinci minute a doua oară, dacă este necesar. Dar nu uitați, nu mai mult de cinci minute.

## Pasul 6

- q Dioxidul de clor gazos generat de MMS activat va acoperi infecția în câteva secunde și veți putea vedea infecția deschizându-se, iar interiorul infecției se va scurge în câteva minute. Ridicați-vă, stați sau culcați-vă, astfel încât infecția - fie ea pe partea brațului, a feței sau a piciorului - să se poată scurge,

permițând puroiului să se scurgă în jos în container.

- † Aveți câteva țesuturi la îndemână pentru a absorbi puroiul rămas când scoateți recipientul.

## **Pasul 7**

- q După ce ați făcut pașii de la 1 la 6 o singură dată, acoperiți zona cu vaselină, ceea ce va ajuta la prevenirea oricărei alte infecții.

## **Pasul 8**

- † Dacă se pare că unele puroi pot rămâne în continuare în infecție, puteți repeta pașii de la 1 la 6 a doua oară. Faceți acest lucru numai după ce așteptați cel puțin patru ore după prima aplicare și numai după ce ați spălat vaselina cât mai bine cu apă și săpun.
- † După ce ați repetat pașii de la 1 la 6 a doua oară, acoperiți încă o dată zona cu vaselină pentru a preveni infecția.

## **Pasul 9**

- † Puteți repeta pașii de la 1 la 6 a treia oară, dar din nou, numai după ce așteptați cel puțin patru ore după a doua aplicare și numai după ce ați spălat vaselina cât mai bine posibil cu apă și săpun.

## **Pasul 10**

- q Într-un caz rar în care durerea și durerea persistă, puteți repeta pașii de la 1 la 6 o dată la patru ore până când starea se elimină. În acest moment, așteptați patru ore între fiecare aplicare a pașilor de la 1 la 6. Fiecare

de când repetați pașii de la 1 la 6, ar trebui să acoperiți zona cu vaselină pentru a preveni infecția ulterioară și asigurați-vă că spălați vaselina înainte de alte aplicații de la pasul 1 până la 6

## **Pasul 11**

- q Cel mai probabil, va exista o gaură în piele și carne unde a fost localizată infecția. Puteți pune puțină vaselină în gaură. Ar trebui să se vindece în două sau trei zile. Vaselina previne reinfectarea în continuare. Puteți pulveriza cu flaconul de pulverizare MMS1 (consultați instrucțiunile de la pagina 76), dar acest lucru este rar necesar.

## **Pasul 12**

- q Conform pasului 1 de mai sus, persoana cu MRSA ar trebui să finalizeze procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000. Dacă utilizează MMS1 și pe rănila de piele, iar rănila se elimină înainte de încheierea perioadei de 3 săptămâni la care solicită Protocolul 1000, ar fi totuși cel mai bine să încheiem cele 21 de zile ale Protocolului 1000. Acest lucru va curăța în continuare corpul de bacterii și toxine nedorite.

# **Doza zilnică de întreținere MMS1**

**O doză zilnică de întreținere a MMS este foarte importantă.** Având o cantitate imensă de toxine, otrăvuri și

alte pericole pentru sănătate care cauzează boli în societatea actuală, prevenirea este esențială pentru a ne ajuta să ne bucurăm de o viață sănătoasă și echilibrată. MMS1 vă poate ajuta să atingeți acest obiectiv. Un moment bun pentru a lua doza de întreținere este înainte de culcare, ceea ce ajută la procesul de detoxifiere în timpul somnului. În perioadele de stres sau când boala locală „înconjoară” gripa, tuse, răceli etc. sau oricând aveți o expunere suplimentară la toxine, cum ar fi în timpul călătoriilor și așa mai departe, vă sugerez dublarea dozei de întreținere. Adică, dacă luați o zi

doza de întreținere și aveți o expunere suplimentară, luați-o de două ori pe zi (dimineața și seara) în loc de o dată. Dacă luați o doză de întreținere de 3 ori pe săptămână, luați-o zilnic în aceste perioade.

Veți observa pe diagramele de dozare de mai jos. Sugerez că adulții cu vârsta sub 60 de ani iau o doză de întreținere de 3 ori pe săptămână și totuși sugerez copiilor să ia o doză zilnică de întreținere (ajustată în funcție de greutatea lor). Acest lucru se datorează faptului că, de regulă, copiii sunt expuși la o mare varietate de toxine pe tot parcursul zilei; se joacă pe podea sau în murdărie, își pun mâinile murdare în gură etc.

<b>Doza zilnică de întreținere - copii</b>	
<b>Vârsta și greutatea</b>	<b>Doza zilnică</b>
<b>12 lbs sau mai puțin (5,5 kg sau mai puțin)</b>	<b>1 picătură zilnic</b>
<b>12-24 lbs (5,5-11 kg)</b>	<b>2 picături pe zi</b>
<b>25-49 lbs (11-23 kg)</b>	<b>3 picături pe zi</b>
<b>50-74 lbs (23-34 kg)</b>	<b>4 picături zilnic</b>
<b>75-100 lbs (34-45 kg)</b>	<b>5 picături zilnic</b>
<b>100 lbs și mai mult (45 kg și mai mult)</b>	<b>6 picături pe zi</b>
<b>Doza zilnică de întreținere - Adulți</b>	



<b>Vârsta și greutatea</b>	<b>Doza zilnică</b>
<b>Adulți de 60 de ani și peste, 100 - 200 lbs</b>	<b>6 picături pe zi</b>
<b>Adulți de 60 de ani și peste, 200 kg și peste</b>	<b>8 picături pe zi</b>
<b>Adulți de 60 de ani și sub, 100 - 200 lbs</b>	<b>6 picături de 3 ori pe săptămână</b>
<b>Adulți de 60 de ani și sub, 200 kg și peste</b>	<b>8 picături de 3 ori pe săptămână</b>

**Notă: Dacă trebuie să utilizați MMS2 pentru doza zilnică de întreținere, vă rugăm să consultați notele Protocolului 4000, la pagina 172 pentru instrucțiuni.**



**Morgellans și MMS:** Vă spun că a fost un miracol cum am primit MMS în mâinile mele. Sufeream cu ceea ce cred acum că sunt Morgellons. Medicul meu mi-a spus: „Nu pot diagnostica și nu pot trata” și a ieșit din cameră. De asemenea, mă luptam cu Candida de ani de zile fără să funcționeze nimic, avea să se îmbunătățească și să revină. Fiica mea mă rugase să găsesc un produs care să o ajute cu probleme de sănătate. Am găsit un produs pe care credeam că îl vrea ea. În curând am primit un e-mail prin care spuneam că MMS-ul meu era expediat. Am cercetat MMS. Nu-mi venea să cred ceea ce vedeam, era exact ceea ce aveam nevoie pentru simptomele pe care le aveam. Am început protocolul și aproape imediat rănilile și mâncărimea se îmbunătățeau.

Astăzi Morgellons și Candida au dispărut. Am fost la iridolog și când m-a văzut a spus. „Doamne, nu am văzut pe nimeni să se vindece așa, ce ai făcut?” I-am spus cum am primit MMS. Ea a spus că trebuie să scrieți acest lucru și să îl împărtășiți cu alții care ar putea suferi cu Morgellons. Sunt viu și sănătos astăzi din cauza MMS. Mă gândeam la sinucidere din cauza

durerii și mâncărimilor și a incapacității de a dormi cu un an înainte de a găsi acest produs minunat. Cred că Dumnezeu m-a lăsat să dau peste un produs ieftin care să-mi vindece corpul. Mulțumesc Jim Humble. —Joy S., Statele Unite



**Edemul a dispărut:** Am avut un caz rău de edem pe picioare și am crezut că am un cheag de sânge. M-am tratat cu Protocolul 1000 și în câteva zile - picioarele mele au revenit la normal. Fără sâmburi, umflături etc. —CP, Statele Unite

# Capitolul 12

## Protocoloale de urgență

Ideea de bază atunci când apare o urgență este să acționezi rapid. Vrei să pătrunzi ceva în corp care să te ajute să rezolvi starea și să ucizi otrăvurile care ar putea fi prezente. Mai jos, veți găsi câteva situații de urgență în care am considerat că MMS este deosebit de util. Aceasta nu este, desigur, o listă cuprinzătoare. MMS va funcționa și pentru multe alte situații de urgență. Rețineți cu aceste protocoale poate fi necesar să nu luați în considerare sfaturile date în altă parte în această carte de a nu lua prea multe MMS, în același timp, având grijă să nu mergeți prea departe. Urmați aceste instrucțiuni și ascultați ce vă spune corpul - fie că este vorba despre corpul vostru sau al altuia.

### **Declinare de responsabilitate**

Aceste protocoale de urgență reprezintă o alternativă pentru acei indivizi care se găsesc într-o situație gravă și nu pot căuta ajutor medical obișnuit dintr-un motiv sau altul, fie că este vorba de logistică, financiară sau altfel, cum ar fi decizia personală de a nu dori să meargă spital și supuneți-vă procedurilor alopate. Decizia de a alege o alternativă este o alegere personală. Responsabilitatea este de 100% pentru fiecare persoană pentru orice

utilizare a oricărei informații făcute aici. Dacă cineva nu este pregătit să își asume întreaga responsabilitate pentru propria sănătate, fie că este vorba de un caz sever sau mai puțin sever, îi sfătuiesc cu tărie să solicite asistență medicală convențională.

## **Înțepături și mușcături**

Insecte, scorpioni sau păianjeni care înțepă sau mușcă pot fi periculoase pentru sănătatea cuiva. Rezultatele înțepăturilor sau mușcăturilor de la aceste creaturi variază de la a fi iritant, la grav, la posibil fatal, dacă nu este tratat. Decizia de a urmări informațiile prezentate mai jos revine individului. În orice situație dată, fiecare persoană trebuie să decidă ce să facă.

Pentru cei care sunt alergici la înțepăturile de albine și alte înțepături care sunt otrăvitoare, experiența mea personală a fost că MMS a fost eficient în tratarea afecțiunii, eliminând în același timp riscul de efecte secundare grave ale farmaceuticelor. De exemplu, atât mușcătura de păianjen, cât și antiveninul de scorpion listează aproape întotdeauna mai multe efecte secundare adverse, inclusiv posibilitatea morții. MMS, din câte știm, nu a cauzat niciodată efecte secundare permanente nimănui. Următoarele proceduri pentru mușcături și înțepături au funcționat pentru mulți oameni, cu toate acestea, nu există nicio garanție de 100%.

## **Scorpion Stings**

Majoritatea înțepăturilor de scorpion nu sunt mortale, sunt doar dureroase. Totuși, nu poți depinde de ideea că cel care tocmai te-a înțepat nu este mortal. Există o specie de scorpion în SUA care este mortală. Există peste 2.000 de specii de scorpioni în întreaga lume, doar câteva dintre acestea fiind din specia mortală, dar, din nou, nu presupuneți că cea care tocmai v-a înțepat nu este un scorpion mortal. Dacă ar fi înțepat de un scorpion, aș

Încerca următorii pași. Dacă nu mă îmbunătățeam într-un timp rezonabil și păreau că se înrăutățesc, aș merge la un spital sau clinică cu ser antiveninic. Rugați-vă ca antivenina să nu aibă niciun efect negativ, deoarece aceeași problemă există pentru înțepăturile de scorpion ca mușcăturile de păianjen, deoarece moartea este unul dintre posibilele efecte secundare enumerate adesea pentru antivenină.

## Imediat după ce a fost înțepat de un Scorpion

### Pasul 1

- † În cazul unei înțepături de scorpion, începeți imediat să luați MMS1 pe cale orală. Luați o doză de 6 picături de MMS1 în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă, urmată de o a doua doză de 6 picături de MMS1, o jumătate de oră mai târziu.

**Notă:** Acest lucru este similar cu Protocolul 6 și 6 (vezi pagina 169), cu toate acestea, în acest caz, dozele sunt luate mai aproape, la o jumătate de oră distanță, în loc de o oră distanță. În cazul în care urmați această procedură pentru un copil, urmați aceleași reguli de dozare ca Protocolul 6 și 6, ajustând doza în funcție de greutate conform graficului de la pagina 265.

- † Dacă prima doză de MMS1 vă face greață sau vă provoacă vărsături, beți mai multă apă (8 uncii) și încercați să vomăți din nou, dacă puteți. În acest caz, vărsăturile sunt bune și vor ajuta la expulzarea otrăvii.

### Pasul 2

Concomitent cu Pasul 1, imediat după ce ați luat prima doză orală de MMS1 - începeți să neutralizați otravă:



4. Într-un pahar curat și uscat, activează 3 picături de MMS cu 3 picături de activator acid. Numără 30 de secunde. Nu adăugați apă.
5. Scufundați capătul degetului în amestecul MMS1 și tamponați-l pe locul înțepăturii. (Încercați să îl obțineți direct în punctul în care scorpionul a atacat și nu prea mult pe pielea din jur.) Încercați să aplicați presiune pentru a forța MMS1 în jos în gaură. Faceți acest lucru la fiecare cinci minute sau cam așa ceva. Clătiți degetul după fiecare aplicare.

6. Amestecați o doză proaspătă de MMS1 conform instrucțiunilor de mai sus, la fiecare 15 până la 20 de minute.
7. Nu mai aplicați amestecul MMS1 direct pe înțepătură odată ce durerea înțepăturii a dispărut.
8. Continuați o perioadă mai lungă de timp dacă înțepătura continuă să doară sau să mănânce.

**Notă:** *Opriti utilizarea MMS1 câteva ore dacă pielea începe să se irite grav în jurul înțepăturii.*

### **Pasul 3**

6. După administrarea celei de-a doua doze de 6 picături de MMS1, continuați să luați o doză de 3 picături de MMS1 la fiecare oră de veghe, până când toate simptomele negative scad. Faceți acest lucru chiar dacă durează câteva zile.

**Notă:** *O doză de 3 picături este doza standard Protocol 1000. În cazul în care un copil este înțepat de un scorpion, urmați ghidul de dozare conform greutateii pentru Protocolul 1000 pentru copii (vezi pagina 258).*

## **Înțepături de albină și viespe**

Pentru mulți oameni, înțepăturile de albine și viespi nu prezintă o problemă mare și provoacă mici probleme. Există câteva remedii casnice care sunt eficiente pentru aceste înțepături, cum ar fi prepararea unei paste de bicarbonat de sodiu pentru o înțepătură de albină sau utilizarea oțetului pentru o înțepătură de viespe. La fel, dacă aveți o reacție minoră la o înțepătură, acest protocol vă poate ajuta. Dacă sunteți alergic la înțepăturile de albine sau viespi și aveți o reacție gravă la acestea, vă sugerez să mergeți direct la acest protocol.

Înțepătura albinei este de natură acidă și poate fi neutralizată cu MMS neactivat (soluție de clorit de sodiu 22,4% în

apă), aceasta fără a se amesteca cu un activator acid. Înțepătura de viespe este alcalină și trebuie neutralizată cu acid. Puteți utiliza fie acid HCl 4%, fie acid citric 50%. Următoarele sunt instrucțiunile pentru neutralizarea otrăvii la locul înțepăturii unei albine sau viespi.

## **Instrucțiuni pentru înțepăturile de albine și viespe**

### **Pasul 1**

8. În cazul unei înțepături de albină sau viespe, începeți imediat să luați MMS1 pe cale orală. Luați o doză de 6 picături de MMS1 în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă, urmată de o a doua doză de 6 picături de MMS1, o jumătate de oră mai târziu.

**Notă:** Acest lucru este similar cu Protocolul 6 și 6 (vezi pagina 169), cu toate acestea, în acest caz, dozele sunt luate mai aproape, la o jumătate de oră distanță, în loc de o oră distanță. În cazul în care urmați această procedură pentru un copil, urmați aceleași reguli de dozare ca Protocolul 6 și 6, ajustând doza în funcție de greutate conform graficului de la pagina 265.

12. Dacă prima doză de MMS1 vă face greață sau vă provoacă vărsături, beți mai multă apă (8 uncii) și încercați să vomăți din nou, dacă puteți. În acest caz, vărsăturile sunt bune și vor ajuta la expulzarea otrăvii.

### **Pasul 2**

15. Concomitent cu Pasul 1, imediat după ce ați luat prima doză orală de MMS1 - începeți să neutralizați otravă. Vă rugăm să rețineți că aceste instrucțiuni pentru

**Pasul 2 sunt diferite pentru înțepătura albinei și a viespei.**

## **Intepatura de albina**

17. **Utilizați MMS (clorit de sodiu, 22,4% în apă purificată)** dar fără a o activa. MMS-ul neactivat

este foarte alcalin și neutralizează acidul  
înțepăturii albinei.

19. Puneți 4 sau 5 picături de MMS într-un pahar curat și uscat. Nu adăugați apă.
20. Scufundați capătul degetului în MMS neactivat și frecați-l cu atenție pe înțepătură. Apăsăți puternic pentru a forța o cantitate mică în înțepătură. Repetați acest lucru la fiecare cinci minute sau cam așa ceva.
21. Ssus aplicând cloritul de sodiu (MMS neactivat) direct pe intepatura odata ce durerea intepaturii a disparut.
22. Continuați pentru o perioadă mai lungă de timp, până la o oră, dacă înțepătura continuă să doară sau să mănânce.
23. După ce ați încetat să aplicați MMS, clătiți bine zona cu apă curată.

### **Dacă înțepătura continuă să doară după o oră**

20. Clătiți bine zona cu apă curată.
21. După aplicarea doar MMS (MMS neactivat) timp de o oră, natura acidă a intepăturii de albine este suficient neutralizată. Dacă încă te doare, acum poți aplica MMS activat (MMS1) pentru a distruge orice otravă care ar putea rămâne. Activați 3

picături de MMS (clorit de sodiu) cu 3 picături de acid activator și numărați 30 de secunde. Nu adăugați apă.

22.Împingeți-l pe înțepătură și frecați-l cu grijă.

23.Acest lucru poate fi repetat la fiecare cinci minute aproximativ până la jumătate de oră.

## **Înțepătură de viespe**

22. **Nu utilizați MMS. Utilizați acidul activator singur**, (4% HCl sau 50% acid citric). Dacă acestea nu sunt disponibile, următorul lucru cel mai bun este suc de lămâie sau oțetul drept.
23. Puneți 4 sau 5 picături de acid într-un pahar curat și uscat. Nu adăugați apă.
24. Scufundați capătul degetului în acid și tamponați-l pe locul înțepăturii. (Încercați să-l obțineți direct pe locul înțepăturii și nu prea mult pe pielea din jur.) Frecați-l cu grijă în orificiul înțepăturii, dar apăsați cu putere pentru a obține acid în orificiu pentru a neutraliza otravă.
25. Faceți acest lucru la fiecare cinci minute sau cam așa ceva. Clătiți degetul după fiecare aplicare.
26. Sdeasupra aplicând acidul direct pe intepătură odată ce durerea intepaturii a dispărut.
27. Continuați pentru o perioadă mai lungă de timp, până la o oră, dacă înțepătura continuă să doară sau să mănânce.
28. După ce ați oprit aplicarea acidului, clătiți bine zona cu apă curată.

**Dacă înțepătura continuă să doară după o oră**



- † Clătiți bine zona cu apă curată.
  
- † După ce s-a aplicat numai acid pe înțepătura de viespe timp de o oră, natura alcalină a înțepăturii ar trebui neutralizată. Dacă încă te doare, acum poți aplica MMS activat (MMS1) pentru a distruge oricare dintre otrava rămasă. Activați 3 picături de MMS (clorit de sodiu) cu 3 picături

de acid activator și se numără 30 de secunde. Nu adăugați apă.

- q Împingeți-l pe înțepătură și frecați-l cu grijă.
- q Acest lucru poate fi repetat la fiecare cinci minute aproximativ până la jumătate de oră.

### **Pasul 3**

- q După a doua doză de 6 picături de MMS1, continuați să luați o doză de 3 picături de MMS1 la fiecare oră de veghe, până când toate simptomele negative scad. Faceți acest lucru chiar dacă durează câteva zile.

**Notă:** *O doză de 3 picături este doza standard Protocol 1000. În cazul în care un copil este înțepat de o albină sau viespe, urmați ghidul de dozare conform greutății pentru Protocolul 1000 pentru copii (vezi pagina 258).*

## **Mușcături de păianjen**

Atât păianjenii Black Widow, cât și Brown Recluse nu sunt doar dureroși, ci sunt mortali. Le-am enumerat separat, fiecare cu un protocol distinct. Dacă bănuți că mușcătura dvs. este o văduvă neagră sau o recluză maro, vă rugăm să consultați respectivul protocol specific, deoarece se știe că aceste

protocoale funcționează (până acum) de fiecare dată. (Vezi paginile 213, 217.)

Dacă bănuți că v-a mușcat un alt păianjen otrăvitor (există mulți păianjeni otrăvitori în întreaga lume), următorul remediu simplu poate fi eficient. Dacă acest remediu nu depășește durerea și umflarea într-un interval rezonabil de timp (câteva ore), vă sugerez să mergeți la un spital sau la o clinică care are antivenin.

**Notă:** *MMS este un oxidant și se știe că oxidează și distruge multe tipuri de otravă. Cu toate acestea, nu există nicio modalitate prin care să putem testa capacitatea MMS de a distruge literalmente sute de tipuri de otravă păianjen care există. Din experiența noastră, MMS va ajuta în majoritatea situațiilor otrăvitoare, dar decizia de a utiliza sau nu MMS în cazul unei mușcături de păianjen este responsabilitatea completă a individului.*

## **Imediat după ce a fost mușcat de un Spi-der otrăvitor**

### **Pasul 1**

- q Citiți paragrafele introductive atât în Protocoalele Vaduva Neagră, cât și în Protocoalele Păianjenului Recluse Brown (vezi paginile 213, 217), pentru a vă asigura că mușcătura nu a fost una dintre acestea.
- q În cazul unei mușcături de păianjen, începeți imediat să luați MMS1 pe cale orală. Luați o doză de 6 picături de MMS1 în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă, urmată de o a doua doză de 6 picături de MMS1, o jumătate de oră mai târziu.

**Notă:** *Acest lucru este similar cu Protocolul 6 și 6 (vezi pagina 169), cu toate acestea, în acest caz, dozele sunt luate mai aproape, la o jumătate de oră distanță, în loc de o oră distanță. În cazul în care urmați această procedură*

*pentru un copil, urmați aceleași reguli de dozare ca Protocolul 6 și 6, ajustând doza în funcție de greutate conform graficului de la pagina 265.*

- † Dacă prima doză de MMS1 vă face greață sau vă provoacă vărsături, beți mai multă apă (8 uncii) și încercați să vomăți din nou, dacă puteți. În acest caz, vărsăturile sunt bune și vor ajuta la expulzarea otrăvii.

## **Pasul 2**

- q Concomitent cu Pasul 1, imediat după ce ați luat prima doză orală de MMS1 - începeți să neutralizați otravă.
- q Într-un pahar curat și uscat, activează 3 picături de MMS cu 3 picături de activator acid. Numără 30 de secunde. Nu adăugați apă.
- q Scufundați capătul degetului în amestecul MMS1 și tamponați-l pe mușcătură. (Încercați să îl obțineți direct pe mușcătură și nu prea mult pe pielea din jur.) Faceți acest lucru la fiecare cinci minute sau cam așa ceva. Clătiți degetul după fiecare aplicare.
- q Amestecați o doză proaspătă de MMS1 conform instrucțiunilor de mai sus, la fiecare 15 până la 20 de minute.
- q Opriți aplicarea amestecului MMS1 direct pe mușcătură odată ce durerea mușcăturii a dispărut.
- q Continuați pentru o perioadă mai lungă de timp dacă mușcătura continuă să doară sau să mănânce.

**Notă:** *Opriți utilizarea MMS1 câteva ore dacă pielea începe să se irite grav în jurul mușcăturii.*

### **Pasul 3**

- q După administrarea celei de-a doua doze de 6 picături de MMS1, continuați să luați o doză de 3 picături de MMS1 la fiecare oră de veghe, până când toate simptomele negative scad. Faceți acest lucru chiar dacă durează câteva zile.

**Notă:** *O doză de 3 picături este doza standard Protocol 1000. În cazul în care un copil este mușcat de un păianjen otrăvitor,*

*urmați ghidul de dozare conform greutății pentru Protocolul 1000 pentru copii (vezi pagina 258).*

## Protocolul Brown Recluse

În general, păianjenul Recluse Brown este considerat cea mai periculoasă mușcătură de păianjen pe care ar putea să o primească oricine (în afara speciilor rare din junglă). Mulți oameni au murit din cauza mușcăturilor Brown Recluse. Un site web listează că în fiecare an 25% dintre persoanele mușcate mor din cauza mușcăturii. Acest lucru poate fi sau nu adevărat; cu toate acestea, nu există nicio îndoială că o astfel de mușcătură poate da unei persoane mari probleme. Încă nu am întâlnit un medic care poate oferi un tratament de succes pentru o mușcătură Brown Recluse. Cu toate acestea, am constatat că procedura de mai jos este destul de eficientă. Cu Brown Recluse, doriți să fiți sigur că aveți tendința la orice mușcătură cât mai curând posibil.

**Notă:** *Am trăit 40 de ani în deșerturile din California și Nevada, timp în care am tratat personal 20-25 de persoane pentru mușcăturile Brown Recluse cu soluția de oxid de zinc menționată mai jos. În ultimii ani am adăugat și MMS. Soluția de oxid de zinc a funcționat întotdeauna cu sau fără MMS. Decizia de a utiliza sau nu acest protocol este în totalitate responsabilitatea dumneavoastră. În opinia mea, acest protocol vă poate salva viața, deoarece sistemul medical nu are un tratament eficient pentru mușcătura de păianjen Brown Recluse.*

**De unde știi dacă ai o mușcătură de reclusiv maro?**



În mod normal, nu veți ști imediat că ați fost mușcat de un Recluse Brown, cu excepția cazului în care vedeți că păianjenul vă mușcă. Cu un Recluse Brown, nu simți niciodată mușcătura. Dar dacă ați fost mușcat, de obicei după aproximativ patru ore, veți începe să simțiți mâncărime. La început nu se va simți foarte puternic, nici măcar suficient pentru a zgâria, dar apoi o va face

devin mai intense. Când vă uitați la zona care mănâncă, veți observa o mică pată roșie de dimensiunea unui bob de grâu și, până la acel moment, este probabil că ați fi zgâriat-o de mai multe ori. Din acel moment lucrurile se agravează destul de rapid. Mâncărimea devine extrem de rea și apoi se transformă în mâncărime dureroasă, iar aceasta devine apoi durere acută. Timpul necesar pentru a ajunge la acest punct de durere acută poate varia, de obicei de la 8 la 24 de ore.

Dacă nu se face nimic, durerea se va agrava până când mergeți la medicul unde vi se prescrie medicamente pentru durere. Analgezicul poate elimina durerea, dar nu abordează cauza care stă la baza durerii. În curând începe să se dezvolte o mică gaură. Gaura poate deveni din ce în ce mai mare și în cele din urmă va merge până la os. În funcție de locul în care este mușcătura, se știe că oamenii își pierd jumătate din picior sau cea mai mare parte a feței pe măsură ce gaura se mărește. În cazurile severe, unii oameni suferă cu până la doi ani înainte de a muri. Împărtășesc aceste detalii, în speranța că puteți evita această situație și, de asemenea, puteți ajuta pe altcineva, dacă este necesar.

## **Instrucțiuni pentru mușcătura de păianjen Recluse Brown**

### **Pasul 1**

q Începeți o ușoară variație a Protocolului 6 și 6 (vezi pagina 169). Luați o doză de 6 picături de

MMS1, apoi luați a doua doză de 6 picături după numai o jumătate de oră, spre deosebire de o oră.

- q O jumătate de oră după administrarea celei de-a doua doze de 6 picături începe Protocolul 1000. Dar începeți prin a lua o doză de 1/2 picătură în prima oră și creșteți cantitatea în fiecare oră cu 1/2 picătură, crescând până la o doză de 3 picături. în fiecare oră. Continuați cu Protocolul 1000 timp de două săptămâni și, dacă este necesar, pentru a treia săptămână sau cât este necesar.

## **Pasul 2**

- † Simultan, imediat după prima doză de MMS1, începeți să aplicați oxid de zinc. Se amestecă părți egale de oxid de zinc și vaselină vaselină. Faceți din aceasta o pastă.

## **Pasul 3**

- † Răspândiți o porție generoasă de balsam pe zona mușcăturii și frecați-o ușor timp de un minut sau două.
- † Apoi, după un minut sau două, adăugați mai multă unguent în zona mușcăturii pentru a vă asigura că este plăcută și groasă. Acoperiți zona cu tifon și bandă adezivă. Bandați-l bine, dar nu atât de strâns încât să nu primească puțină aer.

## **Pasul 4**

- q Repetați Pasul 3 (de mai sus) după patru ore. Nu este necesar să spălați aplicația anterioară.

## **Pasul 5**

- q Repetați din nou pasul 3 (de mai sus), după alte patru ore. Aceasta va fi a treia aplicare a soluției de oxid de zinc.

## **Pasul 6**

- q După trei aplicări ale unguentului cu oxid de zinc (fiecare dintre ele cu patru ore distanță) durerea și mâncărimea ar trebui să dispară. Dacă totuși, există încă disconfort, începeți să utilizați sticla de pulverizare MMS1, care este o soluție de 10 picături activate de MMS la 1 uncie de apă purificată (vezi pagina 76). Spălați zona înainte de a utiliza sticla de pulverizare.
- q Pulverizați zona afectată la fiecare 20 de minute aproximativ, până când totul este clar.

## Note

q *Amintiți-vă, pe parcursul acestei proceduri, victima ar trebui să ia MMS1 conform Protocolului 1000, la fiecare oră pe oră timp de opt ore consecutive pe zi. Continuați timp de două săptămâni sau mai mult dacă este necesar.*

q *În cazul în care nu puteți obține oxid de zinc, este posibil să găsiți clorură de zinc care poate fi utilizată în schimb. Clorura sau oxidul de zinc vor produce de obicei rezultate în mai puțin de patru ore, dar dacă aveți orice problemă continuă de la utilizarea clorurii de zinc, încercați tot posibilul să obțineți oxid de zinc și repetați procedura din nou.*

q *Există diverse mărci de vaselină pe piață. Recomand marca originală „Vaselină” pentru amestecare cu argilă sau oxid de zinc pentru a face o cremă. Vaseline (originalul, care este triplu purificat pentru a fi 100% pură) are capacitatea unică de a se uda și de a pătrunde și de a rămâne pe piele ore mai lungi decât majoritatea uleiurilor. Uneori uleiul de cocos, uleiul de măsline și alte uleiuri pot fi folosite pentru a transporta diferite substanțe medicinale pe piele și a le ține acolo. Cu toate acestea, nimic nu se potrivește cu capacitatea Vase-line de a ține substanțe vindecătoare în contact cu pielea ore întregi, acționând în același timp ca agent de vindecare în sine. Utilizați diferitele alte uleiuri numai dacă nu puteți obține vaselina.*

q *Se știe că procedura de mai sus cu oxid de zinc ameliorează mușcătura de păianjen Brown Recluse în decurs de patru ore.*

**Variație:** Dacă este disponibil în țara dvs., Desitin Baby Diaper Rash Unguent - Extra Power, a avut, de asemenea, succes în vindecarea mușcăturilor de păianjen recluse maro. Această formulă conține oxid de zinc. Verificați ingredientele pentru a vă asigura că obțineți cel care conține 40% oxid de zinc, care este Formula de rezistență suplimentară. Formulele care conțin

20-25% oxid de zinc poate funcționa, dar formula de 40% este mai sigură că va funcționa.

## Protocolul văduvei negre

Nu este o fabulație; văduva neagră are într-adevăr o formă de clepsidră roșie aprinsă pe burtă. Mulți oameni sunt mușcați de păianjenul Black Widow anual, dar foarte puțini mor din mușcătura ei. Probabil mai puțin de 5 persoane mor în SUA în fiecare an, conform majorității site-urilor web.

**Notă:** *Am trăit 40 de ani în deșerturile din California și Nevada, timp în care personal am ajutat mai mult de 20 de persoane mușcate de un păianjen Black Widow cu protocolul dat mai jos. A funcționat întotdeauna. În plus, am fost mușcat de două ori de un păianjen Black Widow și a funcționat pentru mine. Utilizarea Aloe vera în acest protocol este ceva ce am găsit într-o carte veche de remedii, când eram tânăr, în vârstă de aproximativ 20 de ani. Deci, oamenii folosesc această parte a protocolului pentru a face față mușcăturilor de văduvă neagră de mulți ani! De atunci am adăugat MMS1 și am găsit combinația celor două pentru a aduce rezultate bune. Cu toate acestea, decizia de a urma această procedură este în totalitate responsabilitatea dumneavoastră.*

Mușcătura văduvei negre este diferită de păianjenul Recluse Brown. În mod normal, cu această mușcătură există durere imediată, urmată de o serie de reacții posibile. Pot exista crampe musculare, dureri abdominale (dureri de stomac), slăbiciune, tremurături, dureri de corp și, în cazuri mai severe, greață, vărsături, leșin, amețeli, dureri în piept și dificultăți de respirație.



Pentru mușcătura Black Widow, există un antivenin disponibil. Nu vă spun într-un fel sau altul să luați antiveninul. Nu l-am folosit eu când am fost mușcat de o văduvă neagră, dar mulți l-au folosit. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea medicamentelor farmaceutice, există o listă lungă de efecte secundare

din acest medicament, inclusiv posibila deces pentru cei care au antecedente de astm. Alte reacții includ erupții cutanate, urticarie, mâncărime, dificultăți de respirație, dificultăți la înghițire, senzație de strângere în piept și umflarea gurii, feței, buzelor și limbii. O alternativă la administrarea antiveninei dacă alegeți acest lucru este MMS1 și Aloe vera.

## **Instrucțiuni pentru Black Widow Bite**

### **Pasul 1**

- q Primul lucru de făcut este să începeți o ușoară variație a Protocolului 6 și 6 (a se vedea pagina 169).
- q Luați o doză de 6 picături de MMS1, dar în cazul unei mușcături de văduvă neagră, luați a doua doză de 6 picături după doar o jumătate de oră, spre deosebire de o oră.

### **Pasul 2**

- q În același timp, imediat după administrarea primei doze de 6 picături de MMS1, conform pasului de mai sus, și în timp ce așteptați să luați a doua doză de 6 picături, faceți următoarele:
- q Obțineți o frunză mare de Aloe vera proaspătă.

- q Tăiați marginile zimțate și apoi tăiați frunza pe lungime. Apoi tăiați o bucată de aproximativ 5 cm x 5 cm (2 inci x 2 inci) și puneți Aloe vera proaspătă - cu carnea în jos - chiar pe mușcătură. Țineți piesa pe loc și acoperiți-o cu tifon și fixați-o ferm cu bandă adezivă. Asigurați-vă că aerul nu poate pătrunde între frunza de Aloe vera și mușcătura de pe piele.
- q În caz de urgență, utilizați tot ceea ce este disponibil pentru a menține Aloe vera la locul său până când veți obține corectul

provizii (adică tifon / bandă adezivă), dar fixați-l bine, astfel încât să nu ajungă aer la mușcătură.

- † Lăsați acest lucru timp de 12 ore și mușcătura ar trebui să fie OK. Cu toate acestea, pentru a vă asigura, repetați această procedură încă o dată cu o bucată proaspătă de Aloe vera. Înregistrați-l pentru încă 12 ore și ar trebui să fie tot ce este necesar.

### **Pasul 3**

- q La o jumătate de oră după administrarea primei doze de 6 picături și, sperăm, aplicarea Aloe vera, luați a doua doză de 6 picături.

### **Pasul 4**

- q La o jumătate de oră după administrarea celei de-a doua doze de 6 picături (sperăm că veți fi aplicat prima aplicare de Aloe vera în acest timp) începeți Protocolul 1000. Dar începeți prin a lua o doză de 1/2 picătură în prima oră și creșteți cantitatea fiecare oră cu 1/2 picătură, crescând până la o doză de 3 picături în fiecare oră, așa cum prevede Protocolul 1000.
- q Urmați protocolul 1000 timp de două săptămâni, luând MMS1, opt ore consecutive pe zi. Dacă este necesar, continuați o a treia săptămână pe Protocolul 1000 sau cât este necesar.

# **Protocolul de mușcătură de șarpe**

Acest protocol nu a fost utilizat pe scară largă sau dovedit, din cauza lipsei unor cazuri de mușcături de șarpe care ne vin. Am avut un caz de testare a unui șarpe cu zgomot care mușca un câine mic. Cu MMS, la două zile după mușcătură, câinele a fost bine. Cu toate acestea, faptul este că MMS1 neutralizează otrăvurile de cele mai multe feluri. Otrava de

varietatea de șarpe este o moleculă foarte complexă, iar MMS1 (dioxid de clor) distruge moleculele complexe prin oxidare. Deci, în caz de urgență, ar fi mai bine să faceți ceva, mai degrabă decât nimic. Și, în orice caz, ar fi o idee bună să aplicați acest protocol în plus față de orice tratament medical utilizat, dar nu permiteți nimănui să vă taie mușcătura de șarpe, deoarece poate agrava situația.

## **Instrucțiuni - Mușcătură de șarpe**

**Atenție: cu o mușcătură de șarpe nu doriți să pierdeți timpul!** Este vital ca, cât mai repede posibil, să începeți să introduceți MMS1 în organism, conform dozelor date mai jos.

### **Pasul 1**

q Luați imediat o doză de 12 picături de MMS1.

### **Pasul 2**

- Simultan, împreună cu administrarea dozelor de MMS1, aplicați patch-ul Snake Bite Patch pe zona mușcăturii. Faceți acest lucru imediat după administrarea primei doze de MMS1 conform pasului 1 de mai sus. Vă rugăm să rețineți, patch-ul de mușcătură de șarpe este o formulă semnificativ diferită de patch-ul MMS1 / DMSO de la pagina 135 din această carte. Nu puneți niciodată, niciodată, DMSO pe o mușcătură de șarpe, deoarece aceasta va duce otrăvul mai departe în corp, nu o va scoate.

Consultați Efectuarea unui patch de mușcătură de șarpe, urmând pasul 6 al acestui protocol, pagina 221.)

### **Pasul 3**

- q O jumătate de oră mai târziu, după prima doză de 12 picături de MMS1, luați a doua doză de MMS1, de data aceasta, o doză de 6 picături.

## Pasul 4

3. O jumătate de oră mai târziu, după a doua doză de MMS1, luați a treia doză. A treia doză va fi o doză de 6 picături de MMS1.

**Recapitulare:** Când cineva a fost mușcat de un șarpe, ar trebui să ia imediat o doză de 12 picături de MMS1. O jumătate de oră mai târziu, ar trebui să ia o doză de 6 picături de MMS1. După o jumătate de oră, luați o altă doză de 6 picături de MMS1. Este vorba de 3 doze MMS1 luate la o jumătate de oră distanță. După prima doză de 12 picături de MMS1, aceștia ar trebui să aplice plasturele pentru o mușcătură de șarpe.

## Pasul 5

- 9 O jumătate de oră mai târziu, (după administrarea celor 3 doze de MMS1 menționate în pașii 2, 3 și 4 de mai sus) începeți Protocolul 1000. Adică, luați o doză de 3 picături de MMS1 în fiecare oră timp de opt ore consecutive pe zi. În cazul unei mușcături de șarpe, puteți sări peste procedura de pornire.

## Pasul 6

4. Continuați Protocolul 1000 timp de cel puțin două săptămâni sau mai mult dacă există vreo indicație a mușcăturii de șarpe care încă provoacă probleme. Reduceți numărul de picături orare la jumătate dacă există greață, diaree sau sentimente de rău. Reduceți, dar nu încetați să le luați pe oră.



## **Efectuarea unui patch de mușcătură de șarpe așa cum este necesar la pasul 3 de mai sus**

**Notă și atenție:** *Rețeta pentru plasturele unui șarpe mușcătura este diferită de cea descrisă în Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO la pagina 135 din această carte. Plasturele pentru mușcătura de șarpe nu conține DMSO. Nu utilizați DMSO într-un plasture pentru mușcătura de șarpe. Aceasta poate fi o greșeală gravă.*

*DMSO va răspândi otrava și o va duce mai adânc în țesuturi, agravând problema.*

## **Pasul 1**

- † Activați 10 picături de MMS cu 10 picături de acid citric 50% sau HCl 4%. Numărați până la 30 de secunde, apoi adăugați 20 de picături de apă.
- † Se toarnă imediat acest amestec pe o bucată de tifon de aproximativ 2 cm pe 2 inci (5 cm pe 5 cm) și cel puțin două straturi groase. Dacă acest amestec nu este suficient pentru a înmuia complet plasurele, atunci dublați rețeta. Activați încă 10 picături de MMS și adăugați 20 de picături de apă conform aceleiași formule din punctul de mai sus, pentru a putea înmuia plasurele din amestec.
- † În cazul unei mușcături de șarpe foarte mari, puteți ajusta plasurele pentru a include mai mult de 10 picături de MMS activat. (Vă rugăm să rețineți, patch-ul Snake Bite Patch necesită adăugarea a 2 picături de apă pentru fiecare 1 picătură de MMS activat.)

## **Pasul 2**

5. Bandați tifonul îmbibat pe mușcătura de șarpe, lăsați-l timp de 15 până la 20 de minute - nu mai mult!

6. Amintiți-vă, plasturele pentru mușcătura de șarpe nu conține DMSO.

### **Pasul 3**

6. Aplicați un plasture proaspăt (un al doilea plasture) într-o oră. Acest lucru va însemna că în primele două ore după ce ați fost mușcat, veți fi aplicat două patch-uri MMS1. Adăugați mai multă apă pe plasture dacă observați iritarea pielii.

**Pasul 4**

- q După primele două patch-uri, așteptați trei ore și aplicați un alt patch nou și continuați să aplicați un plasture proaspăt la fiecare trei ore.

**Note**

q *În total, ar trebui să continuați să aplicați patch-urile în conformitate cu aceste instrucțiuni, la fiecare trei ore, pentru o perioadă de 24 de ore. (Setați o alarmă în timpul orelor de somn și ridicați-vă pentru a aplica patch-ul.) Amintiți-vă, faceți și Protocolul 1000 în acest timp.*

q *Dacă plasturele MMS1 vă arde pielea, continuați adăugând mai multă apă până când plasturele nu arde, dar nu adăugați mai multă apă decât este necesar.*

## **Protocolul de otrăvire a alimentelor**

### **(sau orice otravă primită de gură)**

Potrivit CDC (Centers for Disease Control), peste 5.000 de persoane mor în fiecare an din otrăvurile sau bolile transmise de alimente în Statele Unite, cu cifre similare la nivel mondial. Ideea este că este avantajos să știm ce să facem în ceea ce privește otrăvirea alimentară.

Un prieten de-al meu a fost otrăvit o dată în timp ce lua masa cu mine și cu ceilalți. S-a ridicat de la masă și s-a prăbușit imediat și a căzut pe podea. L-am ajutat să se ridice. M-a asigurat că este în regulă și că vrea să meargă la toaletă. Nu era în nici un fel intoxicat. A plecat să folosească toaleta și după un minut l-am verificat și l-am găsit întins pe spate pe podea. A reușit să se sprijine pe un cot și s-a uitat la mine și a încercat să spună ceva, dar nu a putut vorbi.

Am amestecat rapid o doză de 15 picături de MMS1 (încerc să port mereu sticle mici cu mine) și i-am dat-o. A băut-o imediat. În cinci minute a spus: „Băiete, asta a fost o nebunie”. Apoi se ridică. El a spus, înainte de a lua doza, totul i se întuneca. În 10 minute s-a simțit bine și am putut să-l ajut să se ridice. Ne-am întors la masă unde a cerut un nou platou cu mâncare și a fost bine.

Acesta servește ca un exemplu minunat despre modul în care MMS1 poate anula unele otrăvuri chiar la fața locului.

Primul pas al protocolului de otrăvire a alimentelor este o doză mare de MMS1, în același mod ca și în cazul protocolului privind malarie. Cu otrăvirea, doriți să o loviți puternic cu prima doză. Dar nu vă așteptați să se clarifice întotdeauna imediat; poate că va trebui să persistați puțin. Am ajutat multe cazuri de intoxicații alimentare. Nu întotdeauna se clarifică la fel de repede ca și prietenul meu, dar MMS1 s-a dovedit de multe ori că are succes în astfel de cazuri. Ar trebui să purtați întotdeauna două sticle mici (MMS și activ-tor) cu dvs. în orice moment. Fiți gata - dacă suspectați otrăvirea alimentară sau orice alt tip de otrăvire, introduceți MMS1 în corp cât mai repede posibil.

## **Instrucțiuni pentru protocolul de otrăvire a alimentelor**

Când o persoană suspectează otrăvire:

### **Pasul 1**

- q Luați o doză de 15 picături de MMS1 (MMS activat). Consultați pagina 32 pentru modul de preparare a unei doze de MMS1.

## **Pasul 2**

- q Așteptați 15 minute după prima doză de 15 picături, apoi luați o doză de 6 picături de MMS1.

### Pasul 3

- q Așteptați încă 15 minute și luați o altă doză de 6 picături, aceasta ar fi a treia doză. (Aceasta înseamnă că într-o perioadă de 30 de minute, de la punctul de plecare, s-ar fi luat 3 doze de MMS. Prima și cea inițială - 15 picături activate. A doua și a treia doză - 6 picături activate de MMS.)

**Notă:** *Dacă persoana este provocată să vomite în timpul acestui lucru timpul - întâmpinați-l, nu luptați cu el, pentru că acest lucru va ajuta la expulzarea otrăvii din corp. Vărsăturile pot sau nu să apară dacă MMS1 neutralizează toată otrava din corp. Poate să-l elimine fără a fi nevoie de vărsături.*

### Pasul 4

- q Dacă nu apare vărsături în timp ce luați primele 3 doze, nu vă faceți griji. Dar, luați cel puțin încă două doze (a 4-a și a 5-a doză); acestea ar trebui să fie MMS1, doze de 3 picături, distanțate cu 15 minute.

### Pasul 5

- q În mod normal, cantitatea de MMS1 de mai sus va rezolva problema, dar dacă sunteți încă foarte bolnav de otrăvire, poate fi necesar să luați mai mult MMS1 și să vă faceți să vărsați. Nu este nimic în neregulă dacă te faci să vomi dacă ai nevoie să faci asta. În caz de otrăvire, vărsăturile pot fi necesare în unele cazuri, așa că nu ezitați



dacă este nevoie - cel mai bine este să scoateți otravă.

- q Este posibil să trebuiască să folosești vechiul truc de a-și pune degetul pe gât pentru a provoca vărsăturile. Acest lucru nu este la fel de agresiv ca a merge la o clinică de urgență și a-ți face pompa stomacului. Puteți calcula nevoia de a vărsa în funcție de cât de bolnav sunteți. Dacă esti

încă bolnav, este posibil să trebuiască să vărsați și / sau să luați mai mult MMS1, deoarece nu există nicio parte negativă a administrării mai multor MMS1, în afară de a avea unele greață și apoi posibil vărsături, diaree sau dureri de cap.

**Notă:** *Cu otrăvire, deși neplăcută, vărsături și diareea sunt ambele modalități eficiente de a scăpa organismul de toxine.*

## Pasul 6

q Dacă după ce ați făcut toate cele de mai sus sunteți încă foarte bolnav, este posibil să trebuiască să vi se pompeze stomacul. În acest caz, nu ezitați; mergi la o clinică. Cu toate acestea, în mod normal, în majoritatea condițiilor de otrăvire, dacă ați luat protocolul de mai sus, veți fi bine până acum.

## Protocolul de comotie cerebrală

Mulți oameni au folosit DMSO pentru a depăși o contuzie. Unii manageri de arene sportive țin DMSO la îndemână în orice moment. Cartea DMSO in Trauma and Disease de renumitul doctor în cercetare DMSO, Dr. Stanley W. Jacob, recomandă DMSO în toate cazurile de comotie. Alți practicieni din domeniul sănătății și manageri sportivi recomandă, de asemenea, DMSO pentru tratamentul unei contuzii.

O comotie cerebrală este, în general, considerată a fi o leziune traumatică ușoară a creierului, deși contuziile apar în diferite grade de gravitate. Unele simptome ale contuziei sunt:

- q Oboseală
- q Dureri de cap
- q Tulburări de somn
- q Amețeli și dezechilibru
- q Probleme de vedere / Extra sensibilitate la lumină

- q Probleme de auz și zgomot
- q Probleme musculare și motorii
- q Tulburări senzoriale și metabolice
- q Probleme cronice de durere
- q Disfuncție sexuală
- q Convulsii

De câțiva ani încoace, am încorporat DMSO împreună cu MMS1 în mai multe dintre protocoalele noastre, deoarece aceste două se completează reciproc. În cazul unei comotii cerești, vă recomandăm să efectuați următorul protocol de accident vascular cerebral de urgență.

## Protocolul accident vascular cerebral

Aproximativ 700.000 de accidente vasculare cerebrale se întâmplă în Statele Unite în fiecare an, iar din acest număr apar aproximativ 150.000 de decese. Deci loviturile nu sunt nimic de ignorat. Când apare un accident vascular cerebral, urmați protocolul de mai jos. Utilizarea DMSO și MMS1 îl poate opri în urmele sale. Atât DMSO, cât și MMS1 vor dizolva cheaguri de sânge în tot corpul, inclusiv în creier. DMSO este utilizat în SUA din 1955 și mulți oameni au mărturisit despre modul în care a ajutat la depășirea accidentelor vasculare cerebrale. De asemenea, DMSO și MMS1 au fost utilizate împreună pentru un beneficiu crescut de mii.

**Notă:** *Folosesc MMS de 20 de ani. La începutul anului 2012, am ajutat personal peste 50.000 de oameni din întreaga lume folosind MMS (și am obținut mai multe scoruri de atunci, dar am pierdut numărul). Am ajutat doar o persoană care a*

*suferit un accident vascular cerebral, iar acest lucru a avut succes. Sfatul pe care îl dau aici este ceea ce aş face eu dacă aş avea un accident vascular cerebral şi un spital nu mi-ar fi fost disponibil. Dacă ar fi disponibil un spital, aş face tot acest lucru: aş începe protocolul în timp ce sunt încă acasă şi aş continua să fac acest lucru în drum spre spital, oricât de mult ar fi durat. Când m-aş întoarce de la spital, aş continua*

*protocolul. În opinia mea, utilizarea DMSO și MMS1 ar putea însemna diferența dintre viață și moarte sau diferența dintre a avea efecte secundare pe termen lung sau nu. Cu toate acestea, este complet responsabilitatea dumneavoastră să faceți sau să nu faceți acest protocol.*

### **Semnele unui accident vascular cerebral sunt:**

- q **Face Drooping**—O parte laterală a feței cade sau este amorțită? Roagă persoana să zâmbească. Zâmbetul persoanei este inegal?
- q **Slăbiciunea brațului**—Este un braț slab sau amorțit? Rugați persoana să ridice ambele brațe. Un braț se deplasează în jos?
- q **Dificultate de vorbire**—Vorbirea este neclară? Persoana este incapabilă să vorbească sau este greu de înțeles? Rugați persoana să repete o propoziție simplă, de genul „Iarba este verde”. Propoziția se repetă corect?

Dacă cineva prezintă oricare dintre aceste simptome, chiar dacă simptomele dispar, este timpul să porniți protocolul de mai jos sau să duceți persoana la spital imediat dacă aceasta este alegerea lor. Verificați ora, astfel încât să știți când au apărut primele simptome. În cazul solicitării asistenței medicale, puteți începe cu primele doze de DMSO, urmate de MMS1 conform următoarelor instrucțiuni. Introducerea DMSO și MMS1 în corp imediat poate salva o viață. Și dacă faceți acest

lucru, persoana ar putea fi OK până când veți putea ajunge la spital. Dacă se ia decizia de a merge la spital, cel mai bine este să sunați întotdeauna la o ambulanță sau să faceți ca altcineva să conducă. O persoană nu ar trebui să încerce niciodată să se conducă la spital dacă are un accident vascular cerebral.

## **Instrucțiuni pentru depășirea unui accident vascular cerebral cu MMS1 și DMSO**

Cheagurile de sânge pot provoca accidente vasculare cerebrale. DMSO este capabil să dizolve cheagurile de sânge. MMS1 funcționează și pentru dizolvarea cheagurilor. Utilizarea DMSO împreună cu MMS1 poate fi foarte eficientă atât în depășirea unui accident vascular cerebral, cât și în repararea daunelor provocate de un accident vascular cerebral. Atunci când un cheag de sânge împiedică fluxul de sânge în orice zonă a creierului, poate apărea un accident vascular cerebral și poate determina închiderea acelei zone particulare a creierului. Cu toate acestea, dacă cheagul de sânge poate fi dizolvat prin utilizarea DMSO și MMS1, oxigenul va putea curge din nou în acea zonă a creierului, astfel încât zona creierului să poată începe să funcționeze corect.

Deși instrucțiunile de mai jos explică ce trebuie făcut la apariția unui accident vascular cerebral, este important să știm că, deși o persoană a suferit deja un accident vascular cerebral și mai sunt câteva ore până la o zi sau două mai târziu, se poate începe și urma prin intermediul acestor instrucțiuni începând cu prima zi (vezi graficul de pe Ghidul de dozare pentru Protocolul AVC Ziua 1) Există încă speranța că daunele pot fi evitate sau inversate. S-a raportat că, deși au trecut multe luni sau câțiva ani după un accident vascular cerebral, dacă se va urma un regim obișnuit de administrare a DMSO împreună cu MMS1, aceasta poate inversa parțial sau toate daunele.

Gustul DMSO este departe de a fi plăcut. Cu toate acestea, beneficiul utilizării acestuia depășește cu mult gustul prost. Gradul farmaceutic DMSO a fost descris ca având aproape nici un miros sau un gust



prost. Poate fi găsit pe internet și în unele farmacii. Costul este substanțial mai mare.

## **Ziua 1 - la debutul unui accident vascular cerebral**

Instrucțiunile de mai jos sunt foarte detaliate. Pentru a vă ajuta, am inclus un grafic cu ghid de dozare la sfârșitul acestei secțiuni

facilitează unul urmând acest protocol. Cu toate acestea, vă rugăm să nu tăiați colțurile și să mergeți direct la diagramă; citiți în detaliu toate instrucțiunile de mai jos pentru a înțelege bine procedura.

## Prima oră

- q **La debutul unui accident vascular cerebral** În primul rând, amestecați 2 linguri pline (30 ml) de DMSO diluat în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Bea-l imediat. Acesta este punctul de plecare al Protocolului Stroke.
- q **De asemenea, la debutul unui accident vascular cerebral,** începe Protocolul 6 și 6. Este vorba de două doze cu 6 picături de MMS activat (MMS1), la o oră distanță. (Vezi pagina 169 pentru detalii complete ale Protocolului 6 și 6.) MMS1 și DMSO funcționează împreună unul cu celălalt, prin urmare prima doză de 6 picături de MMS1 pentru un accident vascular cerebral, trebuie luată în mai puțin de două minute după prima doză de DMSO. MMS1 trebuie amestecat într-o a doua 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. (Trebuie administrat imediat după doza de DMSO, dar nu se amestecă cu DMSO). Dacă în orice moment pierdeți limita de două minute, continuați întotdeauna și luați doza chiar dacă au trecut trei, cinci, zece minute sau mai mult. Încercați să nu ratați limita de două minute.
- q **La cincisprezece minute de la punctul de plecare** din acest protocol, ar trebui să luați a doua doză de 2 linguri (30 ml) de DMSO în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Nu se ia MMS1 în acest moment.

- q **La 30 de minute de la punctul de plecare** Trebuie luată a treia doză de 2 linguri (30 ml) de DMSO în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Nu se ia MMS1 în acest moment.
  
- q **La patruzeci și cinci de minute de la punctul de plecare**, a patra 2 linguri (30 ml) doză de DMSO în 1/2 cană

(4 uncii / 120 ml) ar trebui luate. Nu se ia MMS1 în acest moment.

## **A doua oră**

- q **La o oră după pornire** acest protocol de accident vascular cerebral, (care este începutul celei de-a doua ore), continuă să ia DMSO la fiecare 15 minute, reduceți doza la 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă.
- q **De asemenea, la o oră după pornire** acest protocol de accident vascular cerebral, în termen de două minute de la administrarea dozei de DMSO, ia o altă doză de 6 picături de MMS1. Aceasta este a doua doză de 6 picături, administrată la o oră după prima doză de 6 picături. Nu luați mai mult de două doze de 6 picături de MMS1, o oră pe parte.

## **A treia oră**

- q **La două ore după punctul de plecare**, (care va fi începutul celei de-a treia ore), luați o altă doză de DMSO. Continuați să luați 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă la fiecare 15 minute a treia oră.
- q **De asemenea, la două ore după punctul de plecare**, la începutul celei de-a treia ore, începeți să luați Protocolul 1000. Aceasta este o doză de 3 picături de MMS1 la fiecare oră timp de opt ore pe zi. Această doză de 3 picături de MMS1 trebuie

administrată în două minute de la prima doză de DMSO la începutul celei de-a treia ore.

- q În general, vă sugerăm să munciți treptat până la doza de 3 picături când începeți Protocolul 1000. Trecerea directă la 3 picături pe oră pentru Protocolul AVC este o excepție de la regulă. Dacă totuși, cineva are o reacție Herxheimer și se simte greață, are diaree sau vărsături,

reduceți doza de MMS1 în jumătate. Dacă este necesar, continuați să o reduceți la jumătate până când aceste simptome se potolesc. Când simptomele trec, reveniți treptat la o doză de 3 picături la fiecare oră sau la o doză la fel de mare, care vă este confortabilă, fără a provoca o reacție Herxheimer. Dar nu depășiți mai mult de 3 picături pe oră în timp ce utilizați Protocolul 1000.

## Note

q *Amintiți-vă, dacă o persoană este condusă să scadă doza de MMS1, ar trebui să o reducă, dar nu încetați să o mai luați cu totul.*

q *Până în acest moment, persoana din acest protocol va fi terminat trei ore în total, luând DMSO la fiecare 15 minute.*

q *Vă rugăm să rețineți că atunci când reduceți suma*

***DMSO în doză, este important să reduceți și cantitatea de apă pe care o amestecați cu ea.***

## A patra până la ora a opta

- **După primele trei ore** de a lua DMSO la fiecare 15 minute în diferitele doze descrise mai sus, continuați să luați DMSO pentru restul primei zile, dar reduceți frecvența dozelor. O dată pe oră, luați 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă. Persoana ar fi trebuit deja să ia Protocolul 1000, care este o doză orară de 3 picături de MMS1. Doza orară

de DMSO și doza orară de MMS1 trebuie luate  
întotdeauna în interval de două minute (maxim).

## Note

### 4. ***Nu amestecați doza MMS1 cu amestecul DMSO.***

*Nu confundați acest lucru cu alte protocoale în care solicită adăugarea de picături DMSO în doza MMS1. În acest caz, doza de DMSO este mult mai mare decât în alte protocoale, de aceea se recomandă să nu amestecați DMSO în aceeași doză cu MMS1. Luați doza MMS1 în mai puțin de două minute după doza DMSO, dar separat, nu în aceeași cană cu apă.*

5. *Am menționat aici ce trebuie făcut în „prima zi” la debutul unui accident vascular cerebral. Cu toate acestea, un accident vascular cerebral poate apărea oricând și, dacă de exemplu, simțiți un accident vascular cerebral, ar fi înțelept să urmați dozarea menționată mai sus, în noapte. Cu alte cuvinte, rămâneți ridicat sau setați o alarmă dacă trebuie, pentru a vă lua dozele, deoarece accidentele vasculare cerebrale pot afecta oamenii în somn.*

## Ziua 2 până la 7

- A doua zi după un accident vascular cerebral și după ce una a urmat procedura pentru prima zi de mai sus, continuați să luați MMS1, conform Protocolului 1000. Aceasta ia o doză de 3 picături de MMS1 în fiecare oră timp de opt ore consecutive. Vă recomandăm să completați cele trei săptămâni complete sugerate de protocol 1000, chiar dacă începeți să vă simțiți mult mai bine, ca măsură de precauție.
- A doua zi după un accident vascular cerebral, se poate reduce aportul de DMSO la 1 lingură (15 ml) dimineața și 1 lingură (15 ml) seara. Această cantitate de DMSO trebuie luată în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă.



Aceste doze de DMSO trebuie luate în coordonare cu doza de MMS1. Unul ar trebui să facă parte din Protocolul 1000, așa că le sugerez să ia doza DMSO în două minute de la prima doză MMS1 a zilei și ultima doză MMS1 a zilei.

## **Ziua 8 până la 21**

- † Continuați Protocolul 1000, până când completați perioada de 21 de zile.
- † Scăpați aportul de DMSO până când luați 1 lingură (15 ml) de DMSO doar o dată pe zi (în decurs de două minute de una dintre dozele de MMS1), pentru restul de 21 de zile.
- † Dacă simțiți că nu faceți progrese în recuperarea dvs., vă recomand să vă întoarceți la prima zi din Protocolul privind accident vascular cerebral și să începeți din nou întregul proces, așa cum am subliniat mai sus. Cu alte cuvinte, începeți de la început și continuați până când ați finalizat cele 21 de zile.

## **Note**

† *Dacă unul a avut un accident vascular cerebral și s-a recuperat complet, recomand totuși o doză zilnică de întreținere de MMS1 (doză de 6 picături) și 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60ml) de apă. Dacă în orice moment simptomele unui accident vascular cerebral apar din nou, trebuie urmată procedura completă descrisă mai sus.*

† *Aruncați o privire la dieta și obiceiurile de exercițiu pentru a vedea dacă există loc de îmbunătățire.*

† *Din păcate, nu există nicio garanție completă de recuperare după accident vascular cerebral. Cu toate acestea, mulți oameni și-au revenit din accident vascular cerebral folosind DMSO, iar MMS1 a fost, de asemenea, un ajutor în acest domeniu.*

Următoarele sunt două diagrame pentru a vă ghida prin acest protocol. Este important să începeți ora 00:00 imediat când este necesar și să continuați cu intervalele de 15 minute de la punctul de plecare (de exemplu, dacă un accident vascular cerebral apare la 12:20 pm începeți să luați DMSO și MMS1 imediat, apoi 15 minute mai târziu ar fi 12 : 35 pm și așa mai departe).

<b>Ghid de dozare pentru Protocolul de accident vascular cerebral Ziua 1</b>				
<b>Începeți ora 00:00 imediat ori de câte ori este nevoie, indiferent de ora reală. Nu aștepta.</b>				
<b>Eta pa</b>	<b>Ora</b>	<b>Ora/ Min.</b>	<b>MMS1</b>	<b>DMSO / Apă</b>
<b>1</b>	<b>Ora de început 1</b>	<b>00:00</b>	<b>6 Picături</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>2</b>		<b>00:15</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>3</b>		<b>00:30</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>4</b>		<b>00:45</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>5</b>	<b>Ora 2</b>	<b>01:00</b>	<b>6 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>
<b>6</b>		<b>01:15</b>	<b>0</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>

7		01:30	0	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
8		01:45	0	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
9	Ora 3	02:00	3 Picături	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
10		02:15	0	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
11		02:30	0	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
12		02:45	0	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
13	Ora 4	03:00	3 Picături	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
14	Ora 5	04:00	3 Picături	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)
15	Ora 6	05:00	3 Picături	1 lingură (15 ml)
<hr/>				2 oz (60 ml)

<b>16</b>	<b>Ora 7</b>	<b>06:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml)</b>
				<b>2 oz (60 ml)</b>
<hr/>				
<b>17</b>	<b>Ora 8</b>	<b>07:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml)</b>
				<b>2 oz (60 ml)</b>
<hr/>				

<b>Ghid de dozare pentru Protocolul AVC</b>				
<b>Etapă</b>	<b>Ora</b>	<b>Ziua 2 - 7</b>		<b>DMSO / Apă</b>
		<b>Ora/ Min.</b>	<b>MMS1</b>	
<b>1</b>	<b>Ora de început 1</b>	<b>00:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>
<b>2</b>	<b>Ora 2</b>	<b>01:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ora 3</b>	<b>02:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Ora 4</b>	<b>03:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ora 5</b>	<b>04:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Ora 6</b>	<b>05:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Ora 7</b>	<b>06:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Ora 8</b>	<b>07:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>

**Ziua 8 - 21**

- q **Continuați cu Protocolul 1000, până când completați perioada de 21 de zile.**
- q **Scăpați doza de DMSO de la 2 linguri (30 ml) la 1 lingură (15 ml) de DMSO zilnic, pentru restul de 21 de zile.**
- q **Dacă nu faceți progrese, reveniți la Ziua 1. Începeți din nou întregul proces.**
- q **Consultați protocolul complet la pagina 227 pentru detalii.**

## **Protocolul de atac de cord**

Aproximativ 600.000 de decese prin atac de cord se întâmplă în SUA în fiecare an. Când apare un atac de cord, urmând protocolul combinat DMSO / MMS1 de mai jos, îl poate opri în urmele sale. DMSO este utilizat în SUA din 1955 și există multe mărturii despre modul în care a ajutat la depășirea atacurilor de cord. În plus, MMS1 a fost utilizat pe scară largă începând cu anul 2000, iar DMSO și MMS1 au fost utilizate împreună pentru un beneficiu crescut de mii.



**Notă:** *Folosesc MMS de 20 de ani. La începutul anului 2012, am ajutat personal peste 50.000 de oameni din întreaga lume folosind MMS (și am obținut mai multe scoruri de atunci, dar am pierdut numărul). Am ajutat doar trei persoane care au avut un atac de cord, fiecare caz a avut succes. Sfatul pe care îl dau aici este ceea ce aș face eu dacă aș avea un infarct și un spital nu mi-ar fi disponibil. Dacă ar fi disponibil un spital, aș face în continuare acest lucru: aș începe protocolul în timp ce sunt încă acasă și aș continua să îl fac în drum spre spital, oricât de mult ar fi durat. Când m-am întors de la spital, aș continua cu protocolul. În opinia mea, utilizarea DMSO și MMS1 ar putea însemna diferența dintre viață și moarte sau diferența dintre a avea efecte secundare pe termen lung sau nu.*

Semnele unui atac de cord sunt durerea în piept, brațe (în special stânga), spate, gât, maxilar și stomacul superior; și dificultăți de respirație, greață, senzație de amețeală și transpirații reci.

Dacă cineva suspectează că apare un atac de cord, este timpul să începeți cu protocoalele sau să duceți persoana imediat la spital dacă aceasta este alegerea lor. Verificați ora, astfel încât să știți când au apărut primele simptome. În cazul solicitării asistenței medicale, puteți începe cu primele doze de DMSO, urmate de MMS1 conform instrucțiunilor de mai jos. Introducerea DMSO și MMS1 în corp imediat poate salva o viață. Și dacă faceți acest lucru, persoana ar putea fi OK până când veți putea ajunge la spital. Dacă se ia decizia de a merge la spital, cel mai bine este să sunați întotdeauna la o ambulanță sau să faceți ca altcineva să conducă. O persoană nu ar trebui niciodată să încerce să se conducă la spital dacă are un atac de cord.



## **Instrucțiuni pentru depășirea unui atac de cord cu MMS1 și DMSO**

Deși instrucțiunile de mai jos explică ce trebuie făcut la debutul unui atac de cord, este important să știm că, deși o persoană a suferit deja un atac de cord, și mai sunt câteva ore până la o zi sau două mai târziu, încă se poate începe și urmați aceste instrucțiuni începând cu prima zi (a se vedea diagrama de pe Ghidul de dozare pentru Protocolul de atac de cord Ziua 1, pagina 244). Există încă speranța că daunele pot fi evitate sau inversate. Dacă se va urma un regim regulat de administrare a DMSO împreună cu MMS1, aceasta poate inversa parțial sau total daunele.

Gustul DMSO este departe de a fi plăcut. Cu toate acestea, beneficiul utilizării acestuia depășește cu mult gustul prost. Gradul farmaceutic DMSO a fost descris ca având aproape nici un miros sau un gust prost. Poate fi găsit pe internet și în unele farmacii. Costul este substanțial mai mare.

### **Ziua 1 - la debutul unui atac de cord**

Instrucțiunile de mai jos sunt foarte detaliate. Am inclus o diagramă de ghidaj de dozare la sfârșitul acestei secțiuni pentru a facilita urmărirea acestui protocol. Cu toate acestea, vă rugăm să nu tăiați colțurile și să mergeți direct la diagramă, citiți în detaliu toate instrucțiunile de mai jos pentru a obține o bună înțelegere a procedurii.

## Prima oră

- † **La debutul unui infarct** În primul rând, amestecați 2 linguri pline (30 ml) de DMSO diluat în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Bea-l imediat. Acesta este punctul de plecare al Protocolului Heart Attack.

- † **De asemenea, la debutul unui atac de cord,** începe Protocolul 6 și 6. Este vorba de două doze cu 6 picături de MMS activat (MMS1), la o oră distanță. (Vezi pagina 169 pentru detalii complete ale Protocolului 6 și 6.) MMS1 și DMSO funcționează împreună unul cu celălalt, prin urmare, prima doză de 6 picături de MMS1 pentru un atac de cord, trebuie luată în mai puțin de două minute după prima doză. din DMSO. MMS1 trebuie amestecat într-o a doua 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. (Ar trebui să fie luat imediat după doza de DMSO, dar nu amestecați cu DMSO.) Dacă în orice moment pierdeți limita de două minute, continuați întotdeauna și luați doza chiar dacă trei, cinci, zece minute sau mai mult am trecut. Încercați să nu ratați limita de două minute.
- † **La cincisprezece minute de la punctul de plecare** din acest protocol, ar trebui să luați a doua doză de 2 linguri (30 ml) de DMSO în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Nu se ia MMS1 în acest moment.
- † **La 30 de minute de la punctul de plecare** Trebuie luată a treia doză de 2 linguri (30 ml) de DMSO în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Nu se ia MMS1 în acest moment.
- † **La patruzeci și cinci de minute de la punctul de plecare** trebuie administrată a patra doză de 2 linguri (30 ml) de DMSO în 1/2 cană (4 uncii / 120 ml). Nu se ia MMS1 în acest moment.

## **A doua oră**

- **La o oră după pornire** acest protocol de atac de cord, (care este începutul celei de-a doua ore),

continuă să ia DMSO la fiecare 15 minute, dar reduceți doza la 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă.

- **De asemenea, la o oră după pornire** acest protocol de atac de cord, în termen de două minute de la administrarea dozei de DMSO, ia o altă doză de 6 picături de MMS1. Aceasta este a doua doză de 6 picături, administrată la o oră după prima doză de 6 picături. Nu luați mai mult de două doze de 6 picături de MMS1, o oră pe parte.

### **A treia oră**

- † **La două ore după punctul de plecare**, (care va fi începutul celei de-a treia ore), luați o altă doză de DMSO. Continuați să luați 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă la fiecare 15 minute a treia oră.
- † **De asemenea, la două ore după punctul de plecare**, la începutul celei de-a treia ore, începeți să luați Protocolul 1000. Aceasta este o doză de 3 picături de MMS1 la fiecare oră timp de opt ore pe zi. Această doză de 3 picături de MMS1 trebuie administrată în două minute de la prima doză de DMSO la începutul celei de-a treia ore.
- † În general, vă sugerăm să treceți treptat până la doza de 3 picături când începeți Protocolul 1000. Trecerea directă la 3 picături pe oră pentru Protocolul de inimă este o excepție de la regulă. Dacă totuși, cineva are o reacție Herxheimer și se simte greață, are diaree sau vărsături, reduceți doza de MMS1 în jumătate. Dacă

este necesar, continuați să o reduceți la jumătate până când aceste simptome se potolesc. Când simptomele trec, reveniți treptat la o doză de 3 picături la fiecare oră sau la o doză la fel de mare, care vă este confortabilă, fără a provoca o reacție Herxheimer. Dar nu depășiți mai mult de 3 picături pe oră în timp ce utilizați Protocolul 1000.



## Note

† *Amintiți-vă, dacă o persoană este condusă să scadă doza de MMS1, ar trebui să o scadă, dar nu încetați să o mai luați cu totul.*

† *Până în acest moment, persoana din acest protocol va fi terminat trei ore în total, luând DMSO la fiecare 15 minute.*

† *Vă rugăm să rețineți că atunci când reduceți cantitatea de DMSO în doză, este important să reduceți și cantitatea de apă pe care o amestecați cu ea.*

## A patra până la ora a opta

† **După primele trei ore** de a lua DMSO la fiecare 15 minute în diferitele doze descrise mai sus, continuați să luați DMSO pentru restul primei zile, dar reduceți frecvența dozelor. O dată pe oră, luați 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă. Persoana ar fi trebuit deja să ia Protocolul 1000, care este o doză orară de 3 picături de MMS1. Doza orară de DMSO și doza orară de MMS1 trebuie luate întotdeauna în interval de două minute (maxim).

## Note

q ***Nu amestecați doza MMS1 cu amestecul DMSO.*** Nu confundați acest lucru cu alte protocoale în care solicită adăugarea de picături DMSO în doza MMS1. În acest caz, doza de DMSO este mult mai mare decât în alte

*protocoale, de aceea se recomandă să nu amestecați DMSO în aceeași doză cu MMS1. Luați doza MMS1 în mai puțin de două minute după doza DMSO, dar separat, nu în aceeași cană cu apă.*

q *Am menționat aici ce trebuie făcut în „prima zi” la debutul unui infarct. Cu toate acestea, un atac de cord poate lovi oricând și, dacă de exemplu, simțiți un atac de cord, ar fi înțelept să urmați dozarea menționată mai sus, în noapte. Cu alte cuvinte, rămâneți ridicat sau setați o alarmă, dacă trebuie, pentru a vă lua dozele, deoarece un atac de cord poate afecta oamenii în somn.*

## **Ziua 2 până la 7**

q A doua zi după un atac de cord și după ce una a urmat procedura pentru prima zi de mai sus, continuați să luați MMS1, conform Protocolului 1000. Aceasta ia o doză de 3 picături de MMS1 în fiecare oră timp de opt ore consecutive. Vă recomandăm să completați cele trei săptămâni complete sugerate de protocol 1000, chiar dacă începeți să vă simțiți mult mai bine, ca măsură de precauție.

q A doua zi după un atac de cord, se poate reduce aportul de DMSO la 1 lingură (15 ml) dimineața și 1 lingură (15 ml) seara. Această cantitate de DMSO trebuie luată în 1/4 cană (2 uncii / 60 ml) de apă. Aceste doze de DMSO trebuie luate în coordonare cu doza de MMS1. Unul ar trebui să facă parte din Protocolul 1000, așa că le sugerez să ia doza DMSO în două minute de la prima doză MMS1 a zilei și ultima doză MMS1 a zilei.

## **Ziua 8 până la 21**

q Continuați Protocolul 1000, până când completați perioada de 21 de zile.

- q Scăpați aportul de DMSO până când luați 1 lingură (15 ml) de DMSO doar o dată pe zi (în decurs de două minute de una dintre dozele de MMS1), pentru restul de 21 de zile.

- q Dacă simțiți că nu faceți progrese în recuperarea dvs., vă recomand să vă întoarceți la prima zi din Protocolul de atac de cord și să începeți din nou întregul proces, așa cum am subliniat mai sus. Cu alte cuvinte, începeți de la început și continuați până când ați finalizat cele 21 de zile.

## Note

q *Dacă cineva a avut un atac de cord și s-a recuperat complet, recomand totuși o doză zilnică de întreținere de MMS1 (doză de 6 picături) și 1 lingură (15 ml) de DMSO în 1/4 cană (2 uncii / 60ml) de apă. Dacă în orice moment simptomele unui atac de cord apar din nou, trebuie urmată procedura completă descrisă mai sus.*

q *Aruncați o privire la dieta și obiceiurile de exercițiu pentru a vedea dacă există loc de îmbunătățire.*

q *Din păcate, nu există nicio garanție de recuperare după un atac de cord, dar mii de oameni și-au revenit după atacuri de cord folosind DMSO, iar MMS1 a fost, de asemenea, un ajutor în acest domeniu.*



Următoarele sunt două diagrame pentru a vă ghida prin acest protocol. Este important să începeți ora 00:00 imediat când este necesar și să continuați cu intervalele de 15 minute de la punctul dvs. de plecare (de exemplu, dacă apare un atac de cord la 12:20 pm, începeți imediat să luați DMSO și MMS1, apoi 15 minute mai târziu 12:35 pm și așa mai departe).

<b>Ghid de dozare pentru protocolul de atac de cord Ziua 1</b>				
<b>Începeți ora 00:00 imediat ori de câte ori este nevoie, indiferent de ora reală. Nu aștepta.</b>				
<b>Eta pa</b>	<b>Ora</b>	<b>Ora/ Min.</b>	<b>MMS1</b>	<b>DMSO / Apă</b>
<b>1</b>	<b>Ora de început 1</b>	<b>00:00</b>	<b>6 Picături</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>2</b>		<b>00:15</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>3</b>		<b>00:30</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>4</b>		<b>00:45</b>	<b>0</b>	<b>2 lingurițe (30 ml) 4 oz (120 ml)</b>
<b>5</b>	<b>Ora 2</b>	<b>01:00</b>	<b>6 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>
<b>6</b>		<b>01:15</b>	<b>0</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>

				1 lingură (15 ml)
7		01:30	0	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
8		01:45	0	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
9	Ora 3	02:00	3 Picături	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
10		02:15	0	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
11		02:30	0	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
12		02:45	0	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
13	Ora 4	03:00	3 Picături	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
14	Ora 5	04:00	3 Picături	2 oz (60 ml)
				1 lingură (15 ml)
15	Ora 6	05:00	3 Picături	2 oz (60 ml)



<b>16</b>	<b>Ora 7</b>	<b>06:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml)</b>
				<b>2 oz (60 ml)</b>
<b>17</b>	<b>Ora 8</b>	<b>07:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml)</b>
				<b>2 oz (60 ml)</b>

<b>Ghid de dozare pentru Protocolul de atac de cord</b>				
<b>Ziua 2 - 7</b>				
<b>Etapă</b>	<b>Ora</b>	<b>Ora/ Min.</b>	<b>MMS1</b>	<b>DMSO / Apă</b>
<b>1</b>	<b>Ora de început 1</b>	<b>00:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>
<b>2</b>	<b>Ora 2</b>	<b>01:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ora 3</b>	<b>02:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Ora 4</b>	<b>03:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ora 5</b>	<b>04:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Ora 6</b>	<b>05:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Ora 7</b>	<b>06:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Ora 8</b>	<b>07:00</b>	<b>3 Picături</b>	<b>1 lingură (15 ml) 2 oz (60 ml)</b>

**Ziua 8 - 21**

- q **Continuați cu Protocolul 1000, până când completați perioada de 21 de zile.**
- q **Scăpați doza de DMSO de la 2 linguri (30 ml) la 1 lingură (15 ml) de DMSO zilnic, pentru restul de 21 de zile.**
- q **Dacă nu faceți progrese, reveniți la Ziua 1. Începeți din nou întregul proces.**
- q **Consultați protocolul complet la pagina 236 pentru detalii.**

## **Protocol de ardere**

Arsurile determină generarea de acid în piele și țesuturile care au fost arse. MMS neactivat (soluție de clorit de sodiu 22,4% în apă) este foarte alcalin și apa alcalină anulează acidul, astfel, atunci când se freacă ușor MMS neactivat pe arsură, cea mai mare parte a acidului va fi neutralizată, ceea ce va elimina o mare parte din durere. Acidul din arsură poate activa o parte din cloritul de sodiu din MMS, oxidând astfel unele dintre otrăvurile arsurilor și, de asemenea, reducând durerea. În mod normal, durerea dispare instantaneu sau în câteva minute când se utilizează MMS neactivat, dar uneori activat

arsuri foarte rele poate dura mai mult. Timpul de vindecare pentru arsuri atunci când se utilizează MMS neactivat poate fi de până la 4 ori mai rapid decât în mod normal. Următorul protocol poate fi utilizat pentru arsurile de gradul I, II și III.

Vă rugăm să rețineți că acest protocol este o excepție de la regula generală a activării MMS cu un acid de calitate alimentară. Recomand utilizarea MMS neactivat într-o cantitate foarte mică, direct pe mușcătura de țânțar și alte mușcături de insecte (vezi paginile 196, 206-208). De asemenea, vă recomand să utilizați MMS neactivat pentru arsuri (cantitatea depinde de mărimea arsurii). Dacă utilizați MMS neactivat pentru o arsură, vă rugăm să urmați instrucțiunile explicite de mai jos. În general, pentru toate celelalte protocoale din această carte, vă recomandăm să activați MMS cu un acid alimentar, apoi să adăugați cantitatea indicată de apă înainte de utilizare.

## **Instrucțiuni pentru arsuri - Utilizarea MMS neactivat**

### **Pasul 1**

- q În caz de arsură oriunde pe corp, imediat sau cât mai curând posibil, puneți o mulțime de MMS neactivate pe zona arsă. (Dacă arsura este pe față, aveți grijă să evitați ochii.) Nu vă îngrijorați de obținerea unui MMS puțin activat pe pielea ne-arsă. (Vezi mai jos: Îl vei spăla în cinci minute.)
- q Cu vârful degetelor frecați ușor (atingând abia arderea, dar suficient pentru a vă asigura de

contact) MMS-ul direct în arsură. Durerea va începe să se diminueze imediat.

## **Pasul 2**

- q **Nu permiteți ca MMS-ul neactivat să rămână pe piele mai mult de cinci minute!** Trebuie clătit cu apă curată, rece sau rece. Dacă uiți și

permite MMS să rămână pe arsură, aceasta va agrava arsura și vindecarea va dura mai mult decât de obicei.

### Pasul 3

- q În funcție de gravitatea arsurii, durerea se va opri în mod normal în termen de cinci minute. Dacă durerea nu dispare complet la sfârșitul celor cinci minute, puteți aplica o a doua cantitate de MMS neactivat, dar numai după clătirea primei aplicații. Urmați procedura exactă, așa cum este prezentată în pașii 1 și 2 de mai sus.

### Note

q *În cazul arsurilor severe, dacă ați aplicat 2 aplicații de MMS neactivat și durerea continuă, puteți aplica MMS neactivat la fiecare jumătate de oră timp de până la două ore. (Dar amintiți-vă, fiecare aplicație trebuie clătită după cinci minute.)*

q *Dacă durerea continuă după această perioadă de două ore, puteți aplica MMS neactivat de încă două ori, dar de data aceasta, cu o oră distanță. Fiecare dintre aceste aplicații trebuie să fie conform pașilor 1 și 2 de mai sus.*

q *În general, durerea va dispărea în termen de patru ore, dar dacă nu, puteți continua procesul descris în pașii 1 și 2 la fiecare patru ore.*

q *După ce durerea dispare, dacă aveți acces la Aloe vera proaspătă, acest lucru vă poate ajuta la vindecarea arsurilor.*

*Tăiați (în funcție de lungime) o frunză a plantei proaspete și aplicați gelul proaspăt pe zona de arsură. Acest lucru poate fi repetat de câte ori este necesar.*

**Prudență!** Amintiți-vă, nu lăsați niciodată MMS neactivat pe piele mai mult de cinci minute, clătiți-l întotdeauna cu apă rece.

## **Instrucțiuni pentru arsuri solare - Utilizarea MMS neactivat**

### **Pasul 1**

- q În caz de arsuri solare, fie severe sau foarte ușoare, cel mai bine este să pulverizați MMS neactivat direct pe zona arsă.
- q După pulverizare, frecați foarte ușor MMS-ul neactivat pe pielea arsă.

### **Pasul 2**

- q Asigurați-vă că clătiți MMS-ul cu apă rece sau rece curată în cinci minute sau mai puțin. Nu lăsați-l să rămână pe piele mai mult de cinci minute sau vă va face să vă curățați pielea.

### **Pasul 3**

- q Cu arsurile solare, unele dureri pot relua în câteva ore, în acest caz aplicați din nou MMS neactivat, dar nu mai mult de cinci minute, apoi clătiți cu apă curată, rece sau rece.

### **Note**



† *Arsurile solare sunt diferite de alte arsuri, deoarece sunt mai mult la suprafața pielii, prin urmare sunt tratate diferit. Nu aplicați MMS neactivat de mai mult de 5 ori în total la arsurile solare și nu mai mult de o dată pe oră. Nu lăsați-l să rămână niciodată pe piele mai mult de cinci minute.*

† *În general, arsurile solare se curăță într-o oră, până la o zi.*

## Protocolul One Week to Live

Dacă medicul spune că mai ai doar una sau două săptămâni de trăit, așa spune că merită să încerci MMS. De ce nu? Știința medicală nu a funcționat și nu mai este nimic de pierdut. Am primit e-mailuri de la mulți oameni care spuneau că au reînviat de aproape moartea, când, potrivit medicilor, mai aveau doar o săptămână sau două. Nu există garanții în viață. Dar nu renunța niciodată la tine sau la altcineva. Chiar dacă unei persoane îi mai rămâne doar o oră, introduceți MMS în corp.

În cazul în care o persoană are de trăit una sau două săptămâni, așa sugera să urmăriți rapid HRP după cum urmează:

### Procedura de pornire

Începeți procedura de pornire, dar în acest caz, eliminați toate opririle. Urmăriți rapid procedura de pornire - faceți-o într-o zi, parcurgeți fiecare pas.

- † Luați o doză de 1/4 picături timp de două ore.
- † Creșteți la o doză de 1/2 picătură pentru următoarele două ore.
- † Creșteți la o doză de 3/4 picături pentru următoarele două ore.

- † În cele din urmă, creșteți la o doză de 1 picătură pentru încă două ore.

## Note

† *Acestea sunt opt ore în total, luând MMS1, crescând aportul de la 1/4 picătură la 1 picătură în perioada respectivă.*

† *În orice moment al acestui proces, dacă aveți o senzație suplimentară de boală, reduceți doza cu jumătate din cantitatea ultimei doze. De exemplu, dacă o doză de 1/2 picătură vă face să vă simțiți rău, reduceți din nou la 1/4 dintr-o picătură. Începe*

*creșterea din nou a picăturilor atunci când simți că corpul tău este capabil să tolereze mai mult. Dacă ar trebui să fie cazul, poate trece mai mult de o zi pentru a trece prin procedura de pornire. Fiți atent la modul în care corpul reacționează și ajustați doza în consecință.*

### **Protocolul 1000, 1000 Plus și 2000**

După ce ați urmărit rapid procedura de pornire, ideea este să treceți la Protocolul 1000 și să treceți la Protocolul 1000 Plus și la Protocolul 2000 cât de repede puteți, dar fără a vă permite să vă simțiți mai rău decât boala vă face deja să vă simțiți .

- † După finalizarea procedurii de pornire rapidă descrisă mai sus, continuați cu Protocolul 1000. Începeți cu o doză de 1 picătură în prima oră și creșteți picăturile cu fiecare doză, în funcție de ceea ce corpul dumneavoastră poate tolera, până când ajungeți la 3 picături pe doză.
- † Când ajungeți la o doză de 3 picături, dacă totul merge bine și nu vă confrunțați cu vreo boală suplimentară, după trei până la patru doze de 3 picături de MMS1, puteți începe să adăugați DMSO la dozele dumneavoastră (conform instrucțiunilor Protocol 1000 Plus ).
- † După ce ați luat 2 până la 3 doze de MMS1 cu DMSO adăugat, treceți la Protocolul 2000 cât de repede îl

poate gestiona corpul dumneavoastră. Aceasta înseamnă să continuați să creșteți cantitatea de picături MMS1 și DMSO cu fiecare doză orară în funcție de ceea ce corpul dumneavoastră poate tolera. (Raportul dintre DMSO și MMS1 este de 3 picături de DMSO la fiecare 1 picătură de MMS1.) Dacă nu aveți DMSO, nu lăsați acest lucru să vă oprească, continuați să măriți picăturile de MMS1 la fiecare oră.

- După două zile de creștere a scăderii MMS1 și DMSO, din nou, dacă totul merge bine, adăugați MMS2 conform instrucțiunilor din Protocolul 2000.
- În orice moment al acestui proces, dacă aveți o boală suplimentară, reduceți doza cu jumătate din cantitatea ultimei doze. Începeți din nou să creșteți picăturile atunci când simțiți că corpul dvs. este capabil să tolereze mai mult. Vrei să găsești cantitatea potrivită de picături pe care le poți tolera fără să te simți mai rău decât simți deja.

## Note

q *Amintiți-vă Regulile de Aur ale MMS (vezi paginile 83-84), în special cea care spune că de fiecare dată când vedeți îmbunătățiri nu schimbă nimic; continuați cu ceea ce faceți. Deși acest protocol sugerează să accelerați, totuși, dacă vă îmbunătățiți, rămâneți cu ceea ce faceți. Atâta timp cât vă îmbunătățiți, rămâneți la doza respectivă de MMS1, DMSO și MMS2, indiferent de punctul în care vă aflați - orice doză aduce îmbunătățire, continuați să o faceți. Când ajungeți într-un punct în care nu vedeți nicio îmbunătățire pentru o perioadă de una sau două zile, creșteți aportul, trecând la nivelul următor.*

q *Nu luați vitamine sau suplimente în acest timp. Așteptați până când agenții patogeni ai bolii sunt eradicați, apoi puteți lucra la dezvoltarea nutriției.*

## Protocolul 3000

- q Puteți adăuga Protocol 3000 cât mai curând posibil în timp ce luați dozele orale menționate mai sus, cu excepția cazului în care vă îmbunătățiți deja, caz în care nu este necesar să mergeți la Protocol 3000.

- q Dar când nu vedeți nicio îmbunătățire pentru o perioadă de una până la două zile, adăugați Protocol 3000 la ceea ce faceți deja.

## **Protocoale de sprijin**

- q Adăugați pe oricare dintre protocoalele de susținere unul câte unul, mai ales dacă acestea sunt în concordanță cu ajutorul bolii dumneavoastră. De exemplu, dacă problema este cancerul de colon, adăugați clisme. Dacă problema este cancerul ovarian, adăugați pe dușuri. Dacă problema este cancerul de piele, utilizați sticla de pulverizare și așa mai departe.
- q Continuați cu Protocoalele de susținere dacă acestea par să ajute, dar să vă retrageți oricând nu par să le ajute.

## **Inconștient sau nu se poate înghiți**

Nu administrați MMS cuiva inconștient sau care nu poate înghiți. Este posibil să se administreze MMS printr-o picurare IV. Nu recomand acest lucru sau următoarea metodă cu tub, cu excepția cazului în care o persoană calificată supraveghează procedura. Pentru o picurare IV, utilizați o pungă de 250 ml cu soluție salină IV sau soluție de glucoză. Puneți 20 de picături de MMS activat în soluție. Reglați picurarea astfel încât să pătrundă în corp pe o perioadă de o oră. Acest lucru poate fi repetat de mai multe ori pe zi, dar ar trebui folosite și alte protocoale aplicabile de sprijin și de adăugare.



Dacă persoana are un tub de alimentare, îi puteți administra doze de MMS chiar prin tub. Se amestecă doza adecvată de MMS1 (în funcție de protocolul pe care se află persoana respectivă) și se toarnă doza în tub. Acest lucru se poate face orar. Urmăriți procedura de pornire așa cum este subliniat mai sus în acest protocol și continuați cu celelalte protocoale conform instrucțiunilor.

În funcție de situație, în cazul unei persoane inconștiente sau care nu poate înghiți aici sunt alte modalități de a introduce MMS în organism: Protocolul 3000 (aplicația externă a DMSO și MMS1). Protocolul Bag este o altă opțiune dacă sunt conștienți, dar au probleme cu înghițirea. Dacă utilizați geanta, asigurați-vă absolut că persoana respectivă nu poate obține o gură de gaz, deoarece ar putea provoca daune. În funcție de circumstanțe, se poate face și o baie MMS. (O baie de picioare ar putea fi, de asemenea, utilă dacă persoana nu poate intra într-o cadă.) Dacă sunteți cel bolnav, veți avea nevoie de cineva care să vă ajute, de preferință cineva care să cunoască MMS. Dar dacă, dintr-un anumit motiv, persoana respectivă nu este disponibilă, angajați pe cineva în care vă simțiți sigur că vă poate ajuta și cereți-i să citească această carte.



**Avocat al MMS:** Absolut, sunt un avocat imens, masiv de MMS. Am suferit intens sub îngrijirea medicului timp de 3 decenii și aproape că m-au ucis de două ori pentru că, sincer, nu aveau nici o idee despre ce să fac, așa că au împins aproximativ 15 rețete diferite, de la anti-depresivi la beta-blocante la metadonă pentru doi zeci de ani și am pierdut organe din cauza nesăbuintei și neglijenței lor. Le-aș fi luat toate licențele [dacă aș putea], toți cei 80 de medici care se presupune că mi-au acordat asistență

medicală. Deci, MMS, este destul de bine singurul lucru pe care îl iau acum dacă mi se face chiar și cea mai mică răceală și tipul de infecție recunoscută în organism, de la tuse la frisoane și fiori la infecția cu urină (cu uva uva combinată) doar pentru precauție suplimentară pentru urina ... este cel mai bun și mai ieftin mod eficient și eficient de a vă trata corpul. Nu am' Nu am mai fost la doctor acum 2 ani! —Mel, Canada



**SIDA:** În urmă cu câțiva ani, o femeie matură cu SIDA plină a fost adusă la biserica noastră pentru rugăciune. Pastorul meu mi-a cerut să o ajut. Întrucât ea a refuzat deja să ia medicamentele anti-retrovirale din proprie inițiativă, am pus-o pe Protocolul 1000. I-am oferit și mini-linia mea trampo cu sărituri moi. Întrucât nu putea să meargă singură, am dat instrucțiuni pentru rudele ei să o ajute pe trambulină până când ea ar putea sări singură. De asemenea, avea mai multe scripturi vindecătoare pe care trebuia să le citească de 8 ori pe zi, la fel ca în cazul utilizării MMS și a trambulinei.

Două săptămâni mai târziu, o femeie care potrivea descrierea unui instructor de sală de gimnastică a pășit în întâlnirea noastră de rugăciune. A fost nevoie de unele convingeri pentru a confirma că aceasta era aceeași umbră a unei femei cu SIDA complet! Am rămas uimiți: E ADEVĂRAT! MMS este adevărata afacere! Știam că MMS funcționează - dar nu atât de repede - și atât de minuțios. Chiar în acea zi a sărit pe trambulină timp de 1 1/2 ore! Ea a explicat că, în timp ce prima săptămână a fost extrem de provocatoare, ea a perseverat și s-a simțit enorm mai bine la începutul celei de-a doua săptămâni ... și a fost doar la 2 picături pe oră! MMS este o centrală autonomă și face ca

alte protocoale să funcționeze incredibil de bine!  
—Stephen, Trinidad / Tobago



**Gripa:** Dacă ți-aș spune că există un antiviral pe care îl poți pregăti în bucătăria ta pentru a preveni gripa într-o zi, m-ai crede? Fiica mea s-a trezit plângând ieri dimineață cu febră de 104 grade și frisoane ca să nu mai vorbim de nau-sea și dureri de cap. Saraca fata. Era timpul să intrăm în modul de vindecare pentru ea. Amândoi am luat aproximativ 5 doze de MMS ieri-zi. Douăzeci și patru de ore mai târziu nu are febră și nu m-am îmbolnăvit niciodată. - HP, Arizona

# **Capitolul 13**

## **Ajustarea dozelor de protocol pentru copii**

### **Un cuvânt pentru părinți**

În această carte presupunem că fiecare părinte este total responsabil pentru sănătatea copiilor lor. În mod ideal, dacă aveți de gând să oferiți MMS unui copil, ar trebui să aveți suficientă experiență cu acesta pentru a fi folosit mai întâi dvs. Citiți această carte în întregime și consultați câteva dintre linkurile din spatele cărții pentru mai multe informații și mărturii.

Cu toate acestea, dacă există o situație de urgență în ceea ce privește copilul dumneavoastră, este posibil să trebuiască doar să aveți încredere în informațiile din aceste pagini și să urmați aceste instrucțiuni, dacă alegeți acest lucru, chiar dacă nu ați folosit MMS personal.

Am scris această carte având grijă extremă să o facem ușor de înțeles, dar ne așteptăm ca fiecare persoană să își asume întreaga responsabilitate pentru utilizarea

datelor. Am făcut tot posibilul să vă oferim cele mai recente informații disponibile despre MMS. Protocoalele din această carte au fost perfecționate ca urmare a primirii de feedback de la mii de utilizatori de MMS din întreaga lume.

Atunci când se oferă protocoale MMS copiilor, se aplică aceleași principii ca și adulților. De exemplu, dacă un protocol solicită doze orare pentru un adult, ar solicita și doze orare pentru un copil. Este important să luați MMS pe oră.

De asemenea, dacă copilul devine greață sau are diaree, reduceți doza cu 50% (sau mai mult dacă este necesar) până când problema dispare și apoi creșteți înapoi până la cantitatea indicată pentru protocolul special pe care se află copilul.

Lucrul care variază pentru copii este dimensiunea dozelor - numărul de picături pe care le dați sau dimensiunea capsulei. Cantitatea de MMS1 și MMS2 pe care o dați unui copil este determinată de greutatea copilului. Următoarele sunt instrucțiuni cu privire la modul de determinare a cantității de MMS1 și MMS2 pe care copiii trebuie să le ia atunci când utilizează diferite protocoale din această carte.

## Procedura de pornire pentru copii

Procedura de pornire trebuie făcută întotdeauna înainte ca un copil să treacă la Protocolul 1000. Pentru informații suplimentare despre procedura de pornire, inclusiv modul de măsurare a fracțiunii unei picături, consultați paginile 80-81 și urmați detaliile date acolo.

<b>Procedură de pornire</b>	<b>Ghid de dozare</b>	<b>MMS1</b>		
	<b>pentru copii</b>			



<b>Picături pe oră</b>	<b>Ziua 1</b>	<b>Ziua 2</b>	<b>Ziua 3</b>	<b>Ziua 4</b>
<b>Bebeluși mai puțin de 7 kg (3,2 kg)</b>	<b>1/8 picătură</b>	<b>1/8 picătură</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>
<b>Copii 7-24 lbs (3,2-11 kg)</b>	<b>1/8 picătură</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>
<b>Copii 25-49 lbs (11-23 kg)</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>	<b>3/4 picătură</b>
<b>Copii 50-74 lbs (23-34 kg)</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>	<b>3/4 picătură</b>
<b>Copii 75-100 lbs (34-45 kg)</b>	<b>1/4 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>	<b>1/2 picătură</b>	<b>3/4 picătură</b>

## **Protocolul 1000 pentru copii**

Protocolul 1000 ia o doză de MMS1 în fiecare oră timp de opt ore consecutive pe zi. Doza maximă pentru adulți pentru Protocolul 1000 este de 3 picături de MMS1 pe oră; cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiți, conform instrucțiunilor pentru acest protocol începând cu pagina 86, trebuie să mergeți până la doza de 3 picături. Același principiu se aplică și copiilor.

Regula de bază pentru dozarea copiilor cu MMS1 este atunci când copilul cântărește peste 25 kg (11 kg), dați o picătură de MMS1 (MMS activat) pentru fiecare 25 kg suplimentar. Cu toate acestea, am furnizat diagrame pentru determinarea dozelor. Vă rugăm să utilizați aceste diagrame. Și, din nou, amintiți-vă regula de aur a MMS - ori de câte ori un copil (sau oricine altcineva) devine greață, are diaree sau suferă de disconfort dincolo de ceea ce provoacă deja boala, reduceți doza cu 50% sau mai mult dacă este necesar , până când simptomele scad și apoi revin la doza adecvată pentru greutatea copilului. În general, acest lucru ar fi într-o zi sau trei.

Nu depășiți niciodată aceste cantități de picături pe oră, în funcție de greutatea respectivă a copilului, în timp ce utilizați Protocolul 1000.

**Notă:** Pentru a obține o doză de picătură de  $1/4$ ,  $1/2$  sau  $3/4$ , consultați procedura de pornire (paginile 80-81). Pentru a face o doză de  $1-1 / 2$  picături, faceți o doză de 2 picături de MMS1 în  $1/2$  cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Se toarnă 1 uncie din lichid (sau  $1/4$  din  $1/2$  ceașcă) și veți avea o doză egală cu  $1-1 / 2$  picătură.

<b>Protocol 1000 MMS1 Ghid de dozare pentru copii</b>	
<b>Greutate</b>	<b>MMS1 picături pe oră</b>
	<b>1/2 picătură pe oră în prima zi</b>
<b>Bebelușii care cântăresc mai puțin de 7 lbs</b>	<b>din Protocolul 1000, apoi lucrați</b>
<b>(3,2 kg)</b>	<b>la 3/4 picătură pe oră pentru</b>
	<b>perioada rămasă de 21 de zile de</b>
	<b>protocol.</b>

**1/2 picătură pe oră pentru a începe și**

**Copii 7-24 lbs (3,2-10 kg) lucrați până la 1 picătură pe oră pentru perioada rămasă de 21 de zile.**

**Începeți cu 3/4 picătură pe oră și**

**Copii între 11 și 22 kg (25-49 lbs) se lucrează până la 1-1 / 2 picături pe oră**

**pentru perioada rămasă de 21 de zile.**

**Începeți cu 1 picătură pe oră și**

**Copii între 22 și 33 kg (50-74 lbs)      lucrați până  
la 2 picături pe oră pentru  
perioada rămasă de 21 de  
zile.**

**Începeți cu 1 picătură pe  
oră și**

**Copii de 34 kg și peste 75 lbs      lucrați până la 3  
picături pe oră pentru  
perioada rămasă de 21 de  
zile.**

## **Protocol 1000 Plus pentru copii**

Protocolul 1000 Plus pentru copii este același raport ca pentru o doză pentru adulți atunci când se adaugă DMSO. Adică, pentru fiecare 1 picătură de MMS1 (MMS activat) pe care o dați unui copil, adăugați 3 picături de DMSO. Asigurați-vă că citiți cu atenție secțiunea pentru Protocolul 1000 Plus, pagina 87, pentru a vă asigura că amestecați corect doza și adăugați DMSO la momentul potrivit.

## **Protocolul 2000 pentru copii**

Protocolul 2000 pentru un copil funcționează la fel ca pentru Protocolul 2000 pentru un adult, dar din nou, cantitatea de MMS1 și MMS2 pentru un copil va fi diferită de cea a unui adult. Vă rugăm să citiți secțiunea privind Protocolul 2000, pagina 89, precum și secțiunea despre Detalii MMS2, la pagina 274.

Când folosiți Protocolul 2000, acordați unui copil MMS1 cât poate tolera (dar nu depășiți cantitățile maxime din graficul de mai jos) fără a adăuga la boala pe care boala o cauzează deja. Acest lucru necesită o observare foarte atentă a copilului. Fiți gata să reduceți doza dacă există semne de greață sau diaree (din nou, dincolo de ceea ce provoacă deja boala). Deși doriți să ridicați doza de MMS1 la ceea ce copilul poate tolera, există un punct de oprire. Nu dați niciodată copilului mai mult decât cantitățile maxime de MMS1 enumerate mai jos, care sunt calculate în funcție de greutatea copilului. Vă rugăm să rețineți, scala de greutate pentru MMS1 este calculată diferit față de Protocolul 1000, deoarece cantitățile de MMS1 sunt semnificativ mai mari în timp ce se utilizează Protocolul 2000.

<b>Protocolul 2000 pentru copii</b>	
<b>Ghid de dozare</b>	<b>maximă pentru MMS1</b>
<b>Greutate</b>	<b>Picături pe oră</b>
<b>10 lbs sau mai puțin (4,5 kilograme sau Mai puțin)</b>	<b>Nu luați mai mult de 3 picături pe oră.</b>
<b>10-20 lbs (5-9 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 5 picături pe oră.</b>
<b>20-40 lbs (9-18 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 5 picături pe oră.</b>
<b>40-60 lbs (18-27 kg)</b>	<b>Nu luați mai mult de 6 picături pe oră.</b>

---

---

**60-80 lbs (27-36 kg)**

---

---

---

**Nu luați mai mult de 7  
picături pe oră.**

---

## **Protocol 2000 pentru copii - Doze MMS2**

Protocolul 2000 solicită luarea MMS2 sub formă de capsulă, în timp ce se ia MMS1. Nu sugerez să oferiți MMS2 copiilor sub 75 lbs. Dacă copilul are peste 75 de kilograme și are o boală care pune viața în pericol, vă recomandăm să-i administrați MMS2, mai ales dacă MMS1 nu este disponibil. Totuși, nu utilizați MMS2 pentru copii, cu excepția cazului în care copilul știe cum să ia capsule și poate avea încredere în înghițirea imediată, nu lăsarea să persiste în

gura, nu mușcați-o, mestecați-o sau rupeți-o în gură, deoarece aceasta nu ar fi o experiență plăcută. Vă rugăm să aveți grijă.

Nu oferiți unui copil MMS 2 (numai pentru 34 kg) sau mai mult de 75 lbs) decât dacă ați citit și studiat cu atenție instrucțiunile din secțiunea Protocol 2000, pagina 89 și secțiunea MMS2 — Detalii, pagina 274 pentru instrucțiuni despre cum să faceți capsule MMS2 și avertismente cu privire la MMS2 și DMSO.

<b>Protocolul 2000 pentru copii</b>	
<b>Ghid de dozare pentru MMS2</b>	
<b>Greutate MMS2</b>	<b>Dimensiunea capsulei</b>
<b>Copii sub 34 kg (sub 75 lbs)</b>	<b>Nu utilizați MMS2 pentru copii sub 75 lbs.</b>
<b>Copii 75-100 lbs (34- 45 kg) și mai mult</b>	<b>Utilizați o capsulă # 3 umplută la 1/8 plină la mai întâi, apoi lucrați în trepte la a 3/4 capsulă plină.</b>



## **Protocol 3000 pentru copii**

Aceasta este o adaptare a Protocolului original 3000 care poate fi utilizat pentru copii. Cantitățile de MMS1 și DMSO utilizate aici sunt aceleași ca în Protocolul 3000 pentru adulți. Cu toate acestea, metoda de aplicare a amestecului pe pielea unui copil este diferită. Metoda de mai jos este mai convenabilă. Vă rugăm să vă familiarizați cu DMSO și cum să îl utilizați corect înainte de a utiliza acest protocol. (Consultați Capitolul 4 pentru mai multe detalii despre cum să gestionați DMSO.)

## **Instrucțiuni pentru Protocolul 3000 pentru copii**

### **Pregătirea**

- q Veți avea nevoie de trei sticle de pulverizare, de preferință sticle de 2 sau 4 uncii / 60 sau 120 ml. Sticlele de pulverizare din sticlă, dacă le puteți obține, sunt cele mai bune pentru DMSO. Dacă sticla nu este disponibilă, asigurați-vă că primiți sticle de pulverizare din plastic care sunt compatibile cu DMSO. Căutați un # 1 sau # 2 în interiorul unui triunghi pe fundul sticlei. Acesta este fie plastic PETE, fie HDPE. (Dacă nu găsiți sticla de pulverizare compatibilă adecvată pentru DMSO, cel mai bine ar fi să nu pulverizați DMSO pe el, ci să loviți DMSO cu mâna.)
- q Asigurați-vă că sticlele de pulverizare sunt complet curate.
- q Etichetați în mod clar fiecare sticlă, astfel încât conținutul lor să nu fie greșit.
- q Pregătiți sticlele curate și uscate după cum urmează:

**Sticla nr. 1:** Flacon spray standard MMS1 — 10 picături de MMS1 pe uncie de apă (vezi pagina 76).

**Sticla nr. 2:** Umpleți sticla cu DMSO. Poate doriți să o diluați puțin cu apă purificată dacă copilul are pielea sensibilă. Dar cu cât DMSO este mai puternic, cu atât mai bine atât timp cât nu există absolut nicio problemă cu mâncărimea sau arsurile.

**Sticla nr. 3:** Umpleți o sticlă de pulverizare curată cu apă purificată (îmbuteliată, distilată sau osmoză inversă). Asigurați-vă că este clar marcată ca apă.

## **Aplicarea MMS1 / DMSO pe piele**

Înainte de a utiliza acest protocol, cel mai bine este să testați copilul pentru orice posibilă alergie la DMSO (a se vedea testul de alergie la pagina 59). Dacă nu există semne de alergie, înainte de a începe această procedură rugați-l pe copil să vă spună dacă doare, înțepă sau arde în minutul în care îl simte.

### **Pasul 1**

#### **Testează pielea**

- † Pe o porțiune goală a brațului copilului, pulverizați un singur spray de sticla nr. 3 (sticlă de apă) pe o zonă de dimensiunea mâinii dvs.
- † Apoi pulverizați un singur spray cu sticla nr. 1 (MMS1) chiar deasupra aceleiași zone.
- † Pulverizați imediat un singur spray cu sticla nr. 2 (DMSO), chiar deasupra aceleiași zone.
- † Apoi ia mâna goală și freacă ușor ingredientele printr-o mișcare circulară.
- † Acordați-i aproximativ cinci minute pentru a vedea dacă vor apărea vărsături, arsuri sau mâncărimi. Dacă există oricare dintre acestea, pulverizați puțină apă pe zonă și frecați-o ușor.

- † Dacă testul nu provoacă arsuri, înțepături sau mâncărimi, continuați cu Pasul 2.
- † Dacă persistă orice arsură, usturime sau mâncărime, clătiți bine zona de testare, adăugați până la 20% apă pură în sticla de pulverizare DMSO și repetați testul pe o zonă nouă a pielii.

- q Dacă iritația apare a doua oară, diluați DMSO în continuare. Repetați acest proces până când nu există iritații ale pielii.

## **Pasul 2**

### **Aplicarea MMS1 și DMSO**

- † Pulverizați un spray foarte ușor de apă pe unul dintre brațele copilului din partea superioară. Cu mâna întindeți ușor apa pentru a umezi zona. Nu folosiți multă apă, ci doar suficient pentru a face pielea umedă.
- † După aplicarea apei, pulverizați MMS1 pe aceeași zonă de pe partea superioară a brațului, apoi pulverizați DMSO deasupra. Întindeți ușor amestecul pe zonă cu mâna goală. (Nu folosiți mănuși de cauciuc sau latex.)
- † Dacă pielea pe care ați pulverizat pare prea uscată, puteți adăuga un spray suplimentar de MMS1 și DMSO și din nou frecați-l ușor.
- † După întinderea amestecului, lăsați-l să se usuce pe braț dacă nu există iritații. Lăsați-l pe piele câteva ore înainte de spălare.

## **Pasul 3**

q Într-o oră repetați aceiași pași pe celălalt braț.

## **Pasul 4**

† Continuați cu acești pași pe oră, acoperind de fiecare dată o zonă diferită a corpului. Mergeți la un picior, apoi la celălalt picior, și apoi, dacă totul este în regulă, mergeți la

înapoi, apoi stomacul. Fii blând și folosește multă apă dacă este necesar pentru a evita durerea, mâncărimea sau arsurile.

## **Măsuri de siguranță**

Vreau să subliniez următoarele, mai ales atunci când se folosește această procedură pentru copii, pentru a vă asigura că nu se face rău copilului:

- † Dacă amestecul MMS1 / DMSO arde sau irită pielea, acest lucru indică faptul că DMSO este prea puternic (diferite tipuri de piele pot suporta diferite puncte forte ale DMSO).
- † Dacă sticla DMSO este prea puternică, continuați să o diluați cu apă distilată sau purificată, până la un total de 50% apă până când nu există nicio problemă de arsură sau durere.
- † Dacă apare iritație, pulverizați rapid mai multă apă până când copilul spune că nu mai este rău.
- † În cazul arderii, clătiți DMSO cu multă apă plată (nu folosiți apă de la robinet pentru a clăti pielea, în acest caz, apa purificată este cea mai bună). Nu utilizați săpun până nu ați clătit zona foarte bine, deoarece DMSO poate transporta cantități mici de săpun în piele.
- † Clătiți bine mâinile cu apă purificată după aplicarea MMS1 și DMSO.



## **Protocolul 6 și 6 pentru copii**

Protocolul 6 și 6 constă din două doze de 6 picături de MMS1 luate separat, la o oră distanță. Acest protocol este deosebit de eficient pentru răceli, gripă, dureri, alergii și alte boli care par să înceapă. Este util pentru o gamă largă de lucruri. Consultați pagina 169 pentru mai multe detalii și

instrucțiuni complete privind Protocolul 6 și 6; cu toate acestea, ajustați doza pentru copii conform graficului de mai jos.

<b>Protocolul 6 și 6 pentru copii</b>	
<b>Greutate</b>	<b>MMS1 picături pe oră</b>
<b>Bebeluși de 12 kg (5,5 kg) și mai puțin</b>	<b>1 și 1 doză de picătură</b>
<b>Copii de 12-24 lbs (5,5-11 kg)</b>	<b>2 și 2 doze de picătură</b>
<b>Copii între 11 și 23 kg</b>	<b>Doza de 3 și 3 picături</b>
<b>Copii între 23 și 34 kg</b>	<b>Doza de 4 și 4 picături</b>
<b>Copii între 34 și 45 kg (75-100 lbs)</b>	<b>Doza de 5 și 5 picături</b>
<b>Oameni de peste 100 de lbs. (45 kg și mai mult)</b>	<b>Doza de 6 și 6 picături</b>

**Protocolul de patch-uri MMS1 / DMSO pentru bebeluși, copii și persoane cu piele sensibilă**

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți bine instrucțiunile pentru protocolul standard Patch MMS1 / DMSO la pagina 135. Aceasta este practic aceeași procedură, dar cantitățile de picături / apă MMS1 și calendarul pentru aplicarea patch-ului sunt ajustate la găzdui bebeluși, copii și persoane cu piele sensibilă.

- q Începeți cu 5 picături de MMS1 (MMS activat), adăugați 5 picături de DMSO și încă 10 picături de apă pentru a dilua soluția.
- q Pentru prima aplicație nu aplicați plasturele mai mult de cinci minute.
- q Când plasturele este îndepărtat, luați notă dacă există iritații. Dacă nu există iritații după cinci minute cu primul plasture, în două ore aplicați un alt plasture. De data aceasta îl puteți lăsa aprins timp de 15 minute.

- q Dacă nu există iritații ale pielii sau arsuri la următoarea aplicare de 15 minute, este OK să continuați cu aceste aplicații.
- q Dacă în orice moment există iritații ale pielii sau arsuri, atunci dublați cantitatea suplimentară de apă peste cea utilizată la ultima aplicare.

## **Doza zilnică de întreținere MMS1 pentru copii**

Copiii, de regulă, sunt expuși la o mare varietate de toxine pe tot parcursul zilei; se joacă pe podea sau în murdărie, își pun mâinile murdare în gură, etc. Acesta este unul dintre multele motive pentru care o doză zilnică de întreținere MMS1 poate fi importantă pentru copilul dumneavoastră. Pentru detalii complete despre doza de întreținere MMS1 (pentru adulți și copii), vă rugăm să consultați paginile 200-201.



**Copil liber de boli frecvente:** Fiul meu (4 ani) a suferit astm și alte probleme bronșice cronice, îmbolnăvindu-se în medie la fiecare

două săptămâni timp de peste doi ani. De când a descoperit MMS, el nu este doar liber de probleme respiratorii, dar atunci când alte lucruri „merg în jur”, el rămâne sănătos datorită unei doze zilnice de întreținere MMS1. -Veronica, Mexic

## **Cum se ajustează protocoalele de sprijin și protocoalele suplimentare pentru copii**

Următoarele diagrame explică modul de ajustare a tuturor celorlalte protocoale pentru copii.

<b>Bebeluși de 12 kg (5,5 kg) și mai puțin</b>	
<b>Protocol</b>	<b>Dozare</b>
<b>Tratamentul sacilor</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Băi și Băi pentru picioare</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b> <b>doză - pagina 143.</b>
<b>Mușcătura văduvei negre</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 217.</b>
<b>Mușcătură de păianjen Recluse Brown</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 213.</b>
<b>Arsuri</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 245.</b>
<b>Clismă</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b> <b>doză - pagina 148.</b>
<b>Ochi / urechi / nas</b>	<b>Folosiți 1/8 picătură de MMS1 pe uncie</b> <b>de apă distilată pentru ochi; și</b> <b>1/4 picătură pe uncie de distilat</b> <b>apă pentru urechi și nas -</b> <b>pagina 136.</b>

<b>Intoxicație alimentară</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult doză - pagina 223.</b>
<b>Mucegai / ciuperca</b>	<b>Utilizați 1/8 linguriță de doze de lut / ajustați MMS1 la greutate - pagina 99.</b>
<b>Atacuri de cord</b>	<b>Folosiți 1/8 picături și 1/8 DMSO pe care l-ar folosi un adult. De asemenea faceți 6 și 6 dar pentru copii din această greutate, care este de fapt 1 și 1 - pagina 236.</b>
<b>Ierbă indiană</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Gură și dinți</b>	<b>Folosiți 1 picătură de MMS1 pe uncie de apă - pagina 73.</b>
<b>Protocolul 4000</b>	<b>Nu utilizați pentru copii.</b>
<b>Sticla cu pulverizator</b>	<b>Utilizați 3 picături MMS1 pe uncie de apă — pagina 76.</b>
<b>Accidente vasculare cerebrale</b>	<b>Utilizați 1/8 cantitate de DMSO și faceți 6 și 6 (dar pentru bebeluși vezi doza de mai sus, ar fi de fapt fie 1 și 1) și urmați toate</b>

**instrucțiuni de la pagina  
227.**

---



<b>Copii de 12-24 lbs (5,5-11 kg)</b>	
<b>Protocol</b>	<b>Dozare</b>
<b>Tratamentul sacilor</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Băi și Băi pentru picioare</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b>  <b>doză - pagina 143.</b>
<b>Mușcătura văduvei negre</b>	
<b>Mușcătură de păianjen Recluse Brown</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 213.</b>
<b>Arsuri</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 245.</b>
<b>Clismă</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b>  <b>doză - pagina 148.</b>
<b>Ochi / urechi / nas</b>	
	<b>Folosiți 1/8 picătură de MMS1 pe uncie</b>  <b>de apă distilată pentru ochi și 1/2</b> <b>picătură de MMS1 pe uncie de</b> <b>apă distilată pentru urechi și nas</b>  <b>—Pagina 136.</b>

<b>Intoxicație alimentară</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b> <b>doză - pagina 223.</b>
<b>Mucegai / ciuperca</b>	<b>Folosiți 1/4 linguriță de doze de lut / ajustați</b> <b>MMS1 la greutate - pagina 99.</b>
<b>Atacuri de cord</b>	<b>Folosiți 1/8 picături și 1/8 DMSO pe care un adult l-ar folosi. De asemenea, faceți 6 și 6, dar pentru copiii acestui lucru greutate, care este de fapt 2 și 2</b> <b>—Pagina 236.</b>
<b>Ierbă indiană</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Gură și dinți</b>	<b>Folosiți 1 picătură de MMS1 pe uncie de apă - pagina 73.</b>
<b>Protocolul 4000</b>	<b>Nu utilizați pentru un copil de acest lucru greutate.</b>
<b>Sticla cu pulverizator</b>	<b>Utilizați 3 picături MMS1 pe uncie de apă — pagina 76.</b>
<b>Accidente vasculare cerebrale</b>	<b>Folosiți 1/8 picături și 1/8 DMSO pe care un adult l-ar folosi. De asemenea, faceți Protocolul 6 și 6, dar pentru copii din această greutate ar fi 2</b>

**și 2**

**—Pagina 227.**

---

<b>Copii între 11 și 23 kg</b>	
<b>Protocol</b>	<b>Dozare</b>
<b>Tratamentul sacilor</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Băi și Băi pentru picioare</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b> <b>doză - pagina 143.</b>
<b>Mușcătura văduvei negre</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 217.</b>
<b>Mușcătură de păianjen Recluse Brown</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 213.</b>
<b>Arsuri</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 245.</b>
<b>Clismă</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult</b> <b>doză - pagina 148.</b>
<b>Ochi / urechi / nas</b>	<b>Utilizați 1/4 picătură de MMS1 în fiecare</b> <b>uncie de apă pentru ochi și 1/2</b> <b>picătură de MMS1 pe</b> <b>uncie de apă</b> <b>pentru urechi și nas -</b> <b>pagina 136.</b>

<b>Intoxicație alimentară</b>	<b>Folosiți 1/4 de picături de adult doză - pagina 223.</b>
<b>Mucegai / ciuperca</b>	<b>Folosiți 1/2 linguriță de doze de lut / ajustați MMS1 la greutate - pagina 99.</b>
<b>Atacuri de cord</b>	<b>Folosiți 1/4 picături și 1/4 DMSO pe care l-ar folosi un adult.  De asemenea, faceți Protocolul 6 și 6, dar pentru  copiii cu această greutate este  de fapt 3 și 3 —pagina 236.</b>
<b>Ierbă indiană</b>	<b>Nu folosi.</b>
<b>Gură și dinți</b>	<b>Folosiți 1 picătură de MMS1 pe uncie de apă - pagina 73.</b>
<b>Protocolul 4000</b>	<b>Nu utilizați pentru un copil de acest lucru  greutate.</b>
<b>Sticla cu pulverizator</b>	<b>Utilizați 5 picături MMS1 pe uncie de apă — pagina 76.</b>
	<b>Folosiți 1/4 din picături și 1/4 din  DMSO pe care l-ar face un adult</b>

**Accidente vasculare  
cerebrale**

**utilizare. De asemenea,  
faceți Protocolul 6 și 6, dar  
pentru copiii de această  
dimensiune este  
de fapt 3 și 3 —pagina 227.**

---

<b>Copii între 23 și 34 kg</b>	
<b>Protocol</b>	<b>Dozare</b>
<b>Tratamentul sacilor</b>	<b>Folosiți 1/2 din numărul de picături an adult ar folosi - pagina 156.</b>
<b>Băi și Băi pentru picioare</b>	<b>Utilizați 1/2 număr de picături de adult doză - pagina 143.</b>
<b>Mușcătura văduvei negre</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 217.</b>
<b>Mușcătură de păianjen Recluse Brown</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 213.</b>
<b>Arsuri</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 245.</b>
<b>Clismă</b>	<b>Utilizați 1/2 număr de picături de adult doză - pagina 148.</b>
<b>Ochi / urechi / nas</b>	<b>Utilizați 1/4 picătură de MMS1 în fiecare uncie de apă pentru ochi și 1/2 picătură de MMS1 pe uncie de apă pentru urechi și nas -</b>

<b>Intoxicație alimentară</b>	<b>Utilizați 3/4 număr de picături de adult doză - pagina 223.</b>
<b>Mucegai / ciuperca</b>	<b>Utilizați 3/4 lingurițe de lut / ajustați MMS1 la greutate - pagina 99.</b>
<b>Atacuri de cord</b>	<b>Folosiți 1/2 picături și 1/2 picătură DMSO pe care l-ar folosi un adult. Faceți și Protocolul 6 și 6, dar pentru copiii cu această greutate este de fapt 4 și 4 vezi pagina 236.</b>
<b>Ierbă indiană</b>	<b>Urmați instrucțiunile care vin cu planta indiană - pagina 165.</b>
<b>Gură și dinți</b>	<b>Folosiți 2 picături de MMS1 pe uncie de apă - pagina 73.</b>
<b>Protocolul 4000</b>	<b>Nu utilizați pentru un copil de acest lucru greutate.</b>
<b>Sticla cu pulverizator</b>	<b>Utilizați 10 picături MMS1 pe uncie de apă — pagina 76.</b>



**Accidente vasculare  
cerebrale**

**Folosiți 1/2 picături și 1/2  
picătură**

**DMSO pe care l-ar folosi  
un adult.**

**Faceți și Protocolul 6 și 6,  
dar pentru**

**copiii cu această greutate  
este**

**de fapt 4 și 4 —pagina 227.**

---

<b>Copii între 34 și 45 kg (75-100 lbs) și peste</b>	
<b>Protocol</b>	<b>Dozare</b>
<b>Tratamentul sacilor</b>	<b>Folosiți 1/2 din numărul de picături an</b> <b>adult ar folosi - pagina 156.</b>
<b>Băi și Băi pentru picioare</b>	<b>Folosiți același număr de picături care</b> <b>un adult ar folosi - pagina 143.</b>
<b>Mușcătura văduvei negre</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 217.</b>
<b>Mușcătură de păianjen Recluse Brown</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 213.</b>
<b>Arsuri</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 245.</b>
<b>Clismă</b>	<b>Folosiți același număr de picături și</b> <b>adult ar folosi - pagina 148.</b>
<b>Ochi / urechi / nas</b>	<b>Utilizați 1/4 picătură de MMS1 pe uncie</b> <b>de apă pentru ochi și 1 picătură de</b> <b>MMS1 pe uncie de apă pentru urechi</b>

și nas - pagina 136.

<b>Intoxicație alimentară</b>	<b>La fel ca adulții — pagina 223.</b>
<b>Mucegai / ciuperca</b>	<b>Utilizați 1 linguriță de doze de lut / ajustați MMS1 la greutate - pagina 99.</b>
<b>Atacuri de cord</b>	<b>Utilizați MMS1 și DMSO la fel ca adulți. De asemenea, faceți Protocolul 6 și 6, dar pentru copiii cu această greutate este de fapt 5 și 5 —pagina 236.</b>
<b>Ierbă indiană</b>	<b>Urmați instrucțiunile care vin cu planta indiană. — pagina 165.</b>
<b>Gură și dinți</b>	<b>Utilizați 2,5 picături de MMS1 pe uncie de apă —pagina 73.</b>
<b>Protocolul 4000</b>	<b>Utilizați o capsulă de dimensiunea 4 umplută până la 1/4 la început și apoi lucrați până la 3/4 capsula plina in doua zile si după aceea - pagina 171.</b>
<b>Sticla cu pulverizator</b>	<b>Utilizați 10 picături MMS1 pe uncie de</b>

**apă — pagina 76.**

---

**Accidente vasculare  
cerebrale**

**Utilizați aceleași MMS1 și  
DMSO ca**

**adulți. De asemenea, faceți  
Protocolul 6 și 6,**

**dar pentru copiii cu această  
greutate este**

**de fapt 5 și 5 —pagina 227.**

---



**Fistula anală:** Scriu ... să spun că mi-ai salvat fratele. Anul acesta, în luna mai, fratele meu a suferit de fistula anală pentru a patra oară. Suferă de fistulă anală din 2001. A patra oară a fost anul acesta în luna mai și era foarte bolnav, nu putea merge, îi dureau picioarele, dureau picioarele și era foarte îngrijorat, a spus că nu s-a simțit niciodată atât de rău în toată viața lui. Am început să-l tratez cu protocolul 1000, adică 3 picături activate de MMS la fiecare oră și am pregătit o sticlă de pulverizare cu 40 de picături activate de MMS pentru a pulveriza continuu zona afectată de fiecare dată când s-a uscat. După ce a luat MMS pentru o zi, picioarele și picioarele sale au început să se simtă mai bine și putea să se ridice drept și să se plimbe încet. În ziua a treia, el nu a simțit deloc durere și am fost cu toții fericiți de asta. În ziua a patra a mers la cumpărături cu soția sa. Era chiar ok. În ziua a cincea s-a întors la muncă, a spus că se simte mai puternic ca niciodată, plin de energie. La fel ca mine, el ia acum 6 picături de picături activate de MMS în fiecare zi pentru întreținere.

Mi-a spus că acum face lucruri pe care nu le putea face înainte pentru că îi dureau spatele în timp ce se mișca sau ridica obiecte în jur. Acum este o persoană sănătoasă. —Vincent, Italia



**Diabet:** L-am adus pe prietenul meu cu diabet zaharat și l-am tratat la fiecare oră timp de cinci sau șase ore, deoarece zahărul din sânge era aproape de 500. Glicemia lui a scăzut la 91 în acele ore scurte. FAPT! —CP Statele Unite

# **Capitolul 14**

## **Important suplimentar**

### **informație**

#### **Biofilme**

Un biofilm este un strat subțire rezistent de microorganisme care se formează și acoperă suprafețe umede. Sunt colonii bine organizate de bacterii grupate împreună pentru a forma micro-colonii. Biofilmele pot fi formate dintr-o singură specie bacteriană, dar biofilmele constau mai des din multe specii de bacterii, precum și de ciuperci, alge, protozoare, resturi și produse de coroziune. În esență, se poate forma un biofilm pe orice suprafață expusă bacteriilor și unei cantități de apă. În industrie biofilmele se formează în multe locuri, cum ar fi în conductele de apă, rezervoarele de apă și turnurile de răcire. Biofilmele se pot forma, de asemenea, în sau pe corpul uman și, prin urmare, sunt responsabile de multe boli.

Când aceste colonii de bacterii se unesc, ele secretă un mucus special care le cimentează împreună într-un amestec de film. Când se întâmplă acest lucru, alți agenți

patogeni se pot ascunde în ele și sub ele. Biofilmele pot face vindecarea în organism mai dificilă sau adesea imposibilă. Sunt foarte rezistente la antibiotice. Medicamentele medicale par să aibă un efect redus, dacă este cazul, asupra lor. Cu toate acestea, MMS poate depăși biofilmul, atât în interiorul, cât și în exteriorul corpului.

Dacă ați luat MMS și vă îmbunătățiți, dar într-un ritm foarte lent, poate fi o indicație că aveți



biofilm undeva în sistemul dvs. Răspunsul este să continuați pur și simplu protocolul până când vă simțiți bine. Acest lucru ar putea fi de la câteva zile la câteva săptămâni și, în unele cazuri, la câteva luni, înainte ca biofilmul să fie complet ucis. Continuați până când vă simțiți bine.

Dacă ați luat MMS fără nicio problemă și dintr-o dată, la aceeași doză, aveți o reacție semnificativă Herxheimer, probabil că ați rupt un biofilm. Decesul agenților patogeni te lovește într-o singură explozie mare, ceea ce provoacă o reacție Herxheimer. Vestea bună este că poți scăpa de toxinele care ți-au provocat probleme și corpul tău se poate vindeca.

Biofilmele din exteriorul corpului se întâmplă în mod normal numai în răni sau răni unde există umiditate continuă. Când sunt prezenți în răni sau plăgi, deseori fac ca vindecarea să dureze mult mai mult sau să prevină vindecarea cu totul. Pentru aceasta, vă sugerăm să folosiți flaconul de pulverizare MMS1 conform instrucțiunilor de la paginile 76. În situațiile în care biofilmul pare să fie rezistent la flaconul de pulverizare cu rezistență normală de 10 picături de MMS1 la 30 ml de apă, cu alte cuvinte durerea sau rana nu se vindecă, vă sugerez să măriți cantitatea de picături din sticla de pulverizare. Mai întâi încercați să puneți 20 de picături de MMS1 la 30 ml de apă în sticlă. Dacă totuși nu vedeți rezultate bune cu 20 de picături pe uncie, creșteți picăturile din sticla de pulverizare în trepte. Puteți ridica până la 50 de picături MMS1 pe uncie (30 ml) de apă, dacă credeți că este nevoie.

## **MMS2 — Detalii**

MMS2, hipoclorit de calciu, este uneori cunoscut sub numele de Pool Shock. Se vinde în magazinele cu piscină și magazinele alimentare din întreaga lume. Atâta timp cât este pentru piscine, producătorii nu pot pune lucruri rele în bazine care ar răni înotătorii și, prin urmare, nu pot pune lucruri dăunătoare

în hipocloritul de calciu. Pachetul va spune că conține undeva între 45% și 85% clor disponibil. Nu este adevărat. Atâta timp cât aveți hipoclorit de calciu (nu hipoclorit de sodiu, care produce clorină), nu există clor disponibil. Când hipocloritul de calciu este dizolvat în apă, acesta se transformă în acid hipocloros (HOCl) și nu există clor disponibil. HOCl este același acid pe care corpul dvs. îl generează în mod natural pentru a ucide bolile și a distruge otrăvurile. Când luați MMS2, vă oferiți corpului mai mult din propria muniție împotriva bolilor. Microorganismele dintr-o piscină sunt ucise de hipocloritul de calciu care este transformat în HOCl. Producătorii spun doar că există „clor disponibil” pentru a face ca hipocloritul de calciu să se vândă, deoarece, din păcate, mulți din lume încă cred că clorul este un produs sigur și eficient pentru uciderea microorganismelor - și este o greșală obișnuită să amestecăm acești termeni. Clorul, care este hipocloritul de sodiu, va ucide microorganismele, dar este și dăunător organismului uman. Hipocloritul de calciu, care, adăugat la apă, produce acidul hipocloros, va ucide și microorganismele, dar nu este dăunător organismului uman și nu conține „clorul” chimic.

## **Instrucțiuni**

### **Pasul 1**

- q** Cumpărați hipoclorit de calciu de la furnizorii de MMS la: <http://waterpurificationsuppliers.is/> - Este, de asemenea, disponibil de la magazine de piscină, magazine alimentare și, uneori, magazine universale.

## **Pasul 2**

- † Cumpărați niște capsule goale sau vegetale goale, dimensiunea # 1 sau # 0. Dacă nu le puteți găsi, cumpărați un produs obișnuit

flacon cu un anumit tip de capsule de vitamine într-una din aceleași dimensiuni. Goliți capsulele trăgându-le. (Cel mai bine este să cumpărați capsule transparente / transparente. Unele capsule vin în culori, iar culoarea (vopseaua) poate fi uneori dăunătoare.)


### **Pasul 3**

- † Umpleți parțial capsulele cu granulele de hipoclorit de calciu. Nu încercați să măcinați granulele mai fine. Folosiți doar granulele așa cum sunt. Lăsați-i să cadă slab în capsule fără a le împacheta. Începeți întotdeauna cantitatea mică pe care o adăugați la capsulă și creșteți dozele treptat. Când capsulele sunt îndepărtate, o parte este întotdeauna mai mare decât cealaltă parte. Umpleți partea mai mare. Apoi puneți partea mai mică și asigurați-vă că o împingeți în siguranță în poziție.
- † Pentru capsulele de dimensiunea 1, începeți prin a umple o capsulă plină de 1/8. Apoi creșteți cantitatea încet pe parcursul mai multor zile, până când ajungeți la o capsulă de dimensiuni complete # 1.
- † Pentru capsulele de dimensiunea # 0 începeți prin umplerea unei capsule pline 1/16. Măriți cantitatea încet în câteva zile. Nu umpleți o capsulă de dimensiunea # 0 mai mult de 3/4.

### **Pasul 4**

6. Luați întotdeauna capsulele MMS2 la două ore distanță.
7. Beți întotdeauna prima capsulă MMS2 cu 1 cană plină (8 uncii / 240 ml) de apă. După fiecare capsulă, beți cel puțin 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă, dar beți mai mult dacă aveți nevoie de ea.
8. Când începeți să luați aceste capsule, începeți să luați o capsulă la cea mai mică doză. Două ore mai târziu, luați o altă capsulă și la cea mai mică doză.

9. Apoi, două ore mai târziu, pe a treia capsulă creșteți puțin cantitatea de MMS2 din capsulă și luați-o. Două ore mai târziu, luați a patra capsulă cu aceeași cantitate de MMS2 pe care ați pus-o în a treia capsulă.
10. Dacă nu există probleme după administrarea acestor 4 capsule, continuați să creșteți cantitatea de MMS2 din capsule până când ajungeți la doza maximă de dimensiune. Rămâneți cu aceasta ca doză standard de MMS2 pentru durata de timp în care luați MMS2. În caz de greață sau diaree, reduceți cantitatea de hipoclorit de calciu din fiecare capsulă cu 50%. Când aceste simptome scad, creșteți încet cantitatea la dozele sugerate date mai sus.



## Note

7. Dacă în orice moment, în timp ce creșteți cantitatea de MMS2 din aceste capsule, simțiți că apar semne de reacție Herxheimer, încetiniți viteza cu care creșteți

*cantitatea de pulbere din capsulă. Nu este o cursă. Dacă nu puteți crește la doza maximă de dimensiune, rămâneți cu doza de dimensiune cu care vă simțiți confortabil. Urmăriți cele trei reguli de aur.*

*8. Dacă ați achiziționat capsule MMS2 deja alcătuite, poate fi necesar să deschideți capsulele și să goliți o parte din pulbere pentru a urma instrucțiunile de mai sus.*



9. *Acestea sunt liniile directoare generale pentru fabricarea capsulelor MMS2. Consultați Protocolul 2000 sau Protocolul 4000 pentru instrucțiuni specifice despre dozarea cu MMS2.*

10. ***Este important să nu luați niciodată o doză care conține o capsulă MMS2 și DMSO în același timp.*** Consultați paginile 23-24 pentru avertizarea completă cu privire la aceasta.

## **Testarea pentru a vedea dacă sunt lichide**

### **sunt compatibile cu MMS1**

De fiecare dată când folosim un alt lichid decât apa pentru a ne face doza de MMS1, trebuie să știm că lichidul nu anulează eficacitatea MMS1. Aceasta înseamnă că lichidul este compatibil cu MMS1. Dacă MMS1 este distrus sau aproape distrus de lichid, atunci spunem că lichidul nu este compatibil cu MMS1. Puteți stabili dacă un lichid este compatibil cu MMS1, măsurând părțile per milion de MMS1 din lichid. Acest lucru trebuie făcut atât imediat după administrarea unei doze de MMS1, cât și din nou după o oră, măsurând aceeași doză. Dacă puterea nu sa deteriorat peste o anumită cantitate într-o oră, putem spune că lichidul este compatibil cu MMS1.

Părți pe milion este o modalitate de exprimare a concentrațiilor foarte diluate de substanțe. Așa cum procentul înseamnă dintr-o sută, tot așa părți pe milion sau ppm înseamnă dintr-un milion. Părțile pe milion descriu adesea concentrarea a ceva în apă sau lichid. Deci, dacă

aveți 25 ppm de MMS1 într-o jumătate de cană (4 uncii / 120 ml) de apă, aceasta înseamnă că dacă jumătatea de cană de apă ar fi împărțită într-un milion de părți, doar 25 din acele milioane de părți ar fi MMS1.

Ingredientul activ din MMS1 este dioxidul de clor. Există benzi de testare fabricate de LaMotte Company pe care le putem folosi în scopul determinării concentrației (ppm) a dioxidului de clor într-o doză MMS1. Fâșiile

sunt scufundate în soluție și culoarea pe care o transformă banda ne spune câte părți pe milion (ppm) de dioxid de clorină sunt în soluție. Dacă doriți să utilizați un alt lichid decât apa pentru doza MMS1, dar nu sunteți sigur dacă va anula eficacitatea MMS1, apoi urmați instrucțiunile de mai jos pentru a testa compatibilitatea.

Fâșiile de testare cu dioxid de clor LaMotte High Range citesc de la 0 la 500 ppm. Indicațiile de pe sticlă vă pot deruta puțin, deoarece menționează doar într-un singur loc că banda este în scopul testării ppm. În orice caz, urmați instrucțiunile de pe sticlă. Asigurați-vă că efectuați testarea acolo unde există multă lumină (nu în lumină slabă), astfel încât să puteți evalua culorile cu precizie.

## **Instrucțiuni**

### **Pasul 1**

13. Măsurați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) din orice lichid pe care doriți să-l testați pentru a vedea dacă puteți utiliza lichidul respectiv pentru a lua o doză de MMS1. Toate ceaiurile, sucurile, băuturile răcoritoare și alte lichide, altele decât cele menționate în această carte ca fiind compatibile cu MMS1, ar trebui testate.
14. Se amestecă o doză de 3 picături de MMS1 și se toarnă în 120 ml de lichid pe care tocmai l-ați pregătit. Se amestecă bine pentru a distribui uniform dioxidul de clor în lichid.

## **Pasul 2**

16. Scoateți o singură bandă de testare din recipientul LaMotte și înmuiați-o în cele 4 uncii de lichid care conțin doza de 3 picături pregătită corespunzător. (Nu mișcați banda în timp ce vă aflați în lichid.)

18. Numărați două secunde folosind metoda „o mie, două o mie”, apoi scoateți banda din lichid. (Nu scoateți niciun lichid de pe bandă când îl scoateți.) Faceți un număr similar până la zece și apoi verificați culoarea de pe bandă cu graficul de culori de pe partea laterală a containerului LaMotte. Când utilizați 3 picături MMS1 în 120 ml lichid, 4 uncii, numărul dvs. indicat de culoarea de pe bandă ar trebui să fie între 25 și 50.

### **Pasul 3**

24. Acoperiți și lăsați deoparte lichidul (din lumină) cu cele 3 picături de MMS1 și așteptați o oră.

### **Pasul 4**

24. După o oră, repetați același test cu același lichid, dar cu o bandă nouă de testare. Numărul indicat de culoarea de pe bandă în comparație cu diagrama de culori ar trebui să fie din nou între 25 și 50, iar dacă este, lichidul dvs. este compatibil cu MMS1.
25. Dacă citirea pe bandă scade după o oră, aceasta înseamnă într-o oră că MMS-ul din lichid a pierdut o anumită potență. Dacă nu a scăzut prea mult (banda nu ar trebui să citească mai puțin de aproximativ 20 în comparație cu graficul de culori), puteți utiliza în continuare acel tip de lichid oferind de fiecare dată când beți doza, o luați imediat după punere MMS1 în. (De regulă, trebuie să luați întotdeauna doza MMS1 în decurs de un minut de la amestecarea acesteia.)

### **Note**

*29. Este important să păstrați sticla de benzi de testare bine închise în orice moment când nu este utilizată. Acest lucru va împiedica umezeala, care poate afecta citirile.*

† *Puteți tăia benzile pe lungime pentru a obține 100 de benzi în loc de 50.*

† *Când tăiați sau manipulați benzile, asigurați-vă că nu atingeți tamponul benzii cu degetele, altfel citirile dvs. nu pot fi exacte.*

Benzile de testare cu dioxid de clor de gamă mare (cod # 3002) fabricate de LaMotte sunt disponibile pe piață cu două etichete diferite, deși ambele sunt același produs. (În orice caz, asigurați-vă că verificați numărul de cod.) Ambele etichete prezintă aceeași diagramă de culoare de măsurare pe exteriorul containerului.



Benzile de testare a dioxidului de clor

(cod # 3002) realizat de LaMotte sunt

disponibil pe piață cu două  
etichete diferite, deși ambele sunt

același produs. Ambele etichete arată

acceași diagramă de culoare de  
măsurare pe

exteriorul containerului.

Disponibil pe internet la:

q Compania LaMotte:

<http://www.lamotte.com/en/browse/3002.html>

(Accesați această pagină web, alegeți distribuitorul cel mai apropiat și verificați cu ei pentru a vă asigura că poartă benzile de testare.)



† Disponibil și la:

<http://waterpurificationsuppliers.com/>

sau

<https://www.amazon.com> (Căutați LaMotte 3002.)

## **Analgezic**

Durerea în corp poate fi din mai multe motive variate. Uneori se datorează acumulării de toxine depozitate în articulații. MMS s-a dovedit a elimina durerea într-un număr semnificativ de cazuri. Deși sună prea bine pentru a fi adevărat, avem multe rapoarte de la persoane care au suferit de durere de mulți ani și au găsit ușurare cu două doze simple de MMS (Protocolul 6 și 6). Cu toate acestea, există și alte dureri în spate, cap, gât și în articulațiile corpului care sunt adesea cauzate de mușchii care se trag unul împotriva celuilalt. Acest lucru poate provoca dureri extreme. În acest caz, este posibil ca MMS să nu amelioreze durerea și vă sugerez să verificați o carte numită Pain Free de Pete Egoscue. Pete are peste 30 de clinici la nivel mondial, iar metoda sa a ajutat mii de oameni să amelioreze durerea care nu este cauzată direct de boli.

Durerea în gât, spate, mâini, genunchi și alte articulații poate provoca probleme enorme. Când mușchii se trag unul de celălalt, pot face ca cartilajul să dispară din articulații. Medicii vă vor spune că nu poate fi reparat. Țin să te contrazic. Cartea Pain Free vă arată exerciții simple, pe care eu le numesc „relax-a-cisers”. Cu aceste poziții simple (dar posibil

incomode pentru începători), vă relaxați mușchii până la punctul în care se îndepărtează unul de celălalt. Se blochează și, prin urmare, această acțiune ameliorează durerea pe care o experimentați.

S-a raportat că milioane de oameni au evitat operațiile și înlocuirea articulațiilor doar urmând exercițiile predate de Pete Egoscue în clinicile și cărțile sale. Dacă suferiți de acest fel, va merita să obțineți aceste informații și să urmați procedurile. În mod normal, durerea dispare în câteva săptămâni sau mai puțin.

## Paraziți

Există o veche zicală care pare să se dovedească adevărată de cele mai multe ori, și anume „trebuie să avem un echilibru în toate lucrurile”. Deoarece cineva a descoperit niște paraziți în corpul lor nu este un motiv pentru a sări direct în tratamente otrăvitoare dure pentru a-i expulza pe toți. Lasă-mă să explic.

În primul rând, vreau să subliniez că acest lucru nu este în niciun caz menit să fie complet cuprinzător pe tema paraziților. Acesta este un subiect vast și poate exista o mare varietate de motive pentru care paraziții pot provoca probleme în corpul uman. Aceste informații sunt un element de gândire, precum și câteva indicații despre unde să începeți atunci când încercați să scăpați (sau să reduceți) corpul de paraziți nedoriti.

Există multe tipuri de paraziți și ar putea surprinde unii oameni să descopere că nu toți paraziții sunt răi, iar expulzarea lor din organism nu este întotdeauna cel mai bun lucru de făcut. Există destul de multe cărți disponibile astăzi care subliniază că corpul uman are nevoie de paraziți. Paraziții nu provin întotdeauna din mâncarea unui lucru

greșit, sau din mersul prin pădure sau prin iarbă sau mersul de-a lungul malului mării cu picioarele goale. Paraziții apar în diferite părți ale corpului atunci când este necesar din cauza unei stări proaste existente. Paraziții nu mănâncă carne sau țesuturi sănătoase. Mănâncă țesuturi moarte și putrezite și alte microorganisme care pot fi moarte. În mod normal, ei

nu sunt acolo pentru a răni zona, ci mai degrabă pentru a curăța mizeria. Ele sunt adesea una dintre ultimele poziții ale corpului împotriva unei probleme proaste care dăunează corpului.

Mulți paraziți sunt simbiotici. (Interacțiunea dintre două organisme diferite care trăiesc în strânsă asociere fizică, de obicei în avantajul ambelor.) Paraziții provin adesea din corpul nostru și, așa cum am menționat mai sus, nu întotdeauna din exteriorul corpului. Ne scăpăm de ele restabilind sănătatea corpului, nu folosind diferite otrăvuri pentru a-i ucide. Otrăvurile pentru paraziți sunt, de asemenea, otrăvuri pentru noi și produc o anumită cantitate de daune corpului nostru. Este oarecum ca folosind chimioterapie. Medicul cine alopă pledează pentru otrăvurile foarte dăunătoare pentru a încerca să omoare cancerul înainte ca acesta să omoare corpul. Cel puțin aceasta este teoria, iar utilizarea otrăvurilor pentru a ucide paraziții este similară. Cred că mai întâi utilizarea MMS1 pentru a ucide agenții patogeni și a elimina metalele grele și toxinele care cauzează boli este cea mai bună cale de urmat. MMS1 este capabil să corecteze cauza bolii și atunci corpul se poate repara singur, iar para-site-urile sunt probabil expulzate și în acest proces. Faceți cât de bine puteți cu MMS1 și apoi luați în considerare ceea ce este necesar pentru a face față paraziților, dacă este necesar.

Primul pas ar fi urmarea protocoalelor din această carte. Aceste protocoale au depășit mii de condiții nesănătoase. Începeți la început cu Procesul de pornire și urmați după cum indică Planul de recuperare a sănătății. Odată ce corpul tău s-a vindecat, atunci para-site-urile - neavând carne moartă sau toxine de care să se hrănească - vor dispărea, atunci corpul poate expulza viermi și paraziți în mod natural prin intestine dacă funcționează corect.

Acum, după ce am spus toate acestea, amintiți-vă ce am spus despre echilibru. Există momente în care o persoană poate avea prea mulți paraziți. Nu spun că nu este niciodată nevoie să-i expulzăm. Există multe motive, prea multe pentru a le numi aici, de ce paraziții pot scăpa de sub control. Dar pe scurt, ca și mine

spus, mulți paraziți sunt simbiotici - mulți provin din corpul nostru, dar nu toți. Nu există nicio îndoială că unii pătrund în organism în hrana noastră și prin alte căi. Din fericire, natura a oferit modalități de manipulare a acestor lucruri dacă totul funcționează corect în corp. De exemplu, atunci când acidul stomacului este normal, acesta distruge majoritatea paraziților și / sau ouălor parazite care intră în organism prin alimente. De asemenea, mișcările intestinale regulate mențin lucrurile în mișcare, iar larva parazită trece înainte de a avea șansa de a se agăța de colon și de a ecloza. Când cineva devine constipat în mod drastic și lucrurile se susțin, este o altă poveste. Unii sugerează că o dietă extrem de hrănitoare va ține la distanță paraziții. Deci, există multe de ce și de ce unii oameni au o cantitate mare de paraziți, iar alții nu.

În orice caz, dacă paraziții se dezechilibrează prea mult, cantitățile mari de paraziți trebuie abordate direct. Dacă o persoană și-a vindecat corpul de boli sau afecțiuni care au provocat paraziți pentru a curăța lucrurile, dar persistă un dezechilibru al paraziților, este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a scăpa corpul de paraziți. Sugerez modalități mai naturale de a realiza acest lucru, mai degrabă decât utilizarea medicamentelor farmaceutice.

Majoritatea magazinelor de produse naturiste au diferite remedii naturale pentru uciderea sau echilibrarea paraziților din organism. De asemenea, există multe plante și alimente în natură care îndeplinesc acest scop dacă sunt luate corect. Unii cercetători au arătat că paraziții sunt deosebit de vulnerabili la o varietate de plante care sunt letale doar pentru ei. Investigați și aflați ce este comun în țara și locația dvs.

Căutați curățarea de paraziți pe bază de plante a Dr. Hulda Clark pentru

*Începători* pe internet:

<http://www.drclark.net/cleanses/beginners/herbal-parasite-cleanse/parasite-chart-for-adults>



În plus, există și cei care folosesc frecvențe electrice pentru a ucide paraziții și asta uneori este benefic, fără a răni corpul. Cred că mașinile de frecvență a curentului electric funcționează bine, dar în mii de cazuri personal nu am găsit mulți oameni care să aibă cu adevărat nevoie să-și distrugă paraziții cu ajutorul mașinii de frecvență electrică. Dar, în cazul în care este nevoie, aș recomanda aparatul de zapper electronic al lui Pavel. Pentru informații, accesați:

<http://bestzapper.net/en/>

Ar trebui, de asemenea, să menționez că aparatul Pavel poate fi ajustat pentru a ucide agenții patogeni care provoacă o mare varietate de boli, altele decât paraziții, restabilind astfel sănătatea la fel ca MMS.

Natura oferă multe lucruri în interiorul corpului pe care nu am învățat să le folosim. Știința modernă în cea mai mare parte nu a încercat să învețe aceste lucruri. Când un corp moare dacă este introdus într-o cameră complet sterilă în care nu există germeni, agenți patogeni sau viermi, în câteva ore corpul va fi plin de viermi paraziți care, în câteva zile, vor distruge complet corpul, cu excepția schelet. Toți acești viermi au venit din interiorul corpului, nu din mersul prin pădure. Înșelăm natura muncii sale ducând un cadavru la mormânt și îmbălsămându-l cu o otravă care îl păstrează și ucide viermii care altfel l-ar readuce în praf. Natura asigură descompunerea corpului înapoi la natură odată ce moare și natura oferă paraziți (dintre care mulți sunt într-adevăr organisme simbiotice) care ajută corpul să depășească unele condiții extrem de proaste.

**Notă:** *Unii oameni sunt de părere că există un legătura dintre autism, paraziți și vaccinuri. Bănuiala mea este că vaccinurile confundă paraziții naturali și creează, de asemenea, un mediu mai toxic decât para-*

*site-urile încearcă să curețe. Acestea pot trece peste bord și se pot reproduce până la punctul de a provoca o problemă la persoana respectivă și astfel pot contribui la simptomele autismului. Prin detoxifierea organismului și reducerea populației de paraziți, mii de copii cu autism au demonstrat îmbunătățiri semnificative. Consultați cartea lui Kerri Rivera, Vindecarea simpaticilor, cunoscută sub numele de Autism. (A se vedea Link-uri de interes, pagina 319.)*

## Purificarea apei cu MMS

**MMS1 pentru purificarea apei:** Pentru a trata apa limpede și limpede despre care credeți că ar trebui purificată pentru a ucide agenții patogeni ai bolii, cum ar fi apa de la robinet de la robinet, vă sugerăm să adăugați 8 picături de MMS1 (MMS activat - utilizați 50% acid citric sau 4% HCl) per galon de apă sau 4 litri / 4 litri). Numărați 30 de secunde pentru ca picăturile să se activeze apoi puneți amestecul într-un galon de apă. Se amestecă bine, se acoperă și se așteaptă cel puțin o oră înainte de utilizare. Rețineți că MMS1 nu ucide clorul sau fluorul din apa dvs., dar va ucide bolile. Pentru cantități mai mici de apă, utilizați mai puține picături. Pentru 1 litru (sau litru) utilizați 2 picături de MMS1.

Apa tulbure (tulbure) necesită mai mult MMS1. Dacă aveți un pic de turbiditate, utilizați 12 picături de MMS1 activat pe galon. O cantitate mai mare de turbiditate necesită cantități mai mari de MMS. Utilizați 12 până la 24 de picături MMS1 sau chiar mai multe picături pentru apa râului. Acesta este un lucru pe care va trebui să îl evaluați și să faceți tot posibilul pentru a-l face corect. În acest caz, este întotdeauna cel mai bine să greșești din partea prea

multor picături decât suficient. Un gust ușor rău rezultat din MMS1 (dacă trebuie să mergi mai sus) nu te va răni.

**MMS2 pentru purificarea apei:** Apa poate fi purificată folosind MMS2 în mod egal, precum și MMS1. (La fel ca MMS1, MMS2 nu ucide clorul sau fluorul din apa dvs., dar va ucide bolile.) Atât MMS1, cât și MMS2 sunt utilizate în întreaga lume pentru a purifica apa din apa publică.

sisteme. O capsulă de dimensiunea 1 (vezi pagina 46 pentru dimensiunea capsulei) plină cu 1/2 de hipoclorit de calciu (MMS2) poate fi utilizată pentru a purifica un galon de apă limpede care apare normal. Am constatat că utilizarea gelatinei sau a capsulelor vegetale este o metodă foarte convenabilă de măsurare a unor cantități mici de pulbere de MMS2. Nu ambalați bine sau nu comprimați MMS2 în capsulă, ci umpleți capsula la 1/2. Deschideți capsula și turnați pulberea din capsulă în apă. Se amestecă bine până se dizolvă, se acoperă și se așteaptă două ore înainte de utilizare.

Apa tulbure (tulbure) necesită mai mult MMS2. Dacă aveți un pic de turbiditate, utilizați o capsulă de dimensiune # 1 completă de MMS2. În cazul unei turbidități mai mari, puteți utiliza până la 2 capsule de dimensiune completă # 1 de MMS2 pentru un galon de apă. Utilizați 1 până la 3 capsule pentru apa râului. Din nou, acest lucru va trebui să evaluezi. În acest caz de purificare a apei discutabile, este întotdeauna cel mai bine să greșiți din partea prea mult MMS2 decât să nu fiți suficient. Puteți modifica gustul apei cu 3 capsule, dar ar fi mult mai bine decât să vă îmbolnăviți de apă. Trei capsule de MMS2 într-un galon de apă nu vă vor face rău, chiar dacă are un gust puțin rău.



**Cura animalelor:** Câinele meu a avut o boală proastă a pielii care l-a lăsat fără păr doar cu pielea crudă. Având MMS în dulapul meu, am decis să-l încerc ... În două săptămâni, tot părul

îi crescuse iar el nu are mîncărime. Am început să-i dau trei picături de două ori pe zi și am crescut-o cu una, așa că a fost pe patru picături pentru a doua săptămână. El și-a revenit complet cu o sănătate deosebită. Am pus amestecul în carnea lui și el a mîncat totul. Am fost atît de copleșiți, soțul meu a spus că, dacă câinele meu va crește părul, de ce nu mi-ar crește părul. Așa că soțul meu se ocupă acum. — Didi, Australia

# **Capitolul 15**

## **Animale**

### **Protocol pentru animale**

Toate protocoalele din această carte pot fi aplicate majorității animalelor (există unele variații pentru rumegătoare, vezi pagina 290) de la câini și pisici, la cai, hamsteri și elefanți. Acest capitol despre animale nu trebuie să fie cuprinzător în niciun fel. Timpul și spațiul nu permit în momentul redactării acestui articol. Cu toate acestea, vreau să vă ofer câteva reguli generale și reguli pentru animale, care, dacă sunt respectate, ar trebui să vă permită să vă ocupați de majoritatea bolilor și problemelor de sănătate ale acestora.

Așa cum am menționat în prefața acestei cărți, cei dintre voi care au citit scrierile mele anterioare despre MMS pot observa aici unele variații ale celor publicate în trecut. Pentru animale, ca și în cazul oamenilor, prin utilizarea continuă a MMS am învățat lucruri noi. A devenit din ce în ce mai evident că animalele și oamenii reacționează la beneficiile vindecătoare ale MMS în moduri similare.

Practic, aceleași reguli se aplică animalelor ca și la oameni atunci când se utilizează MMS. Adică, dacă animalul pare să se îmbunătățească cu ceea ce faceți, țineți pasul cu ceea ce faceți. Nu schimbați nimic. Dacă animalul pare să se îmbolnăvească cu MMS, cum ar fi diareea sau vărsăturile, atunci reduceți doza pe care o administrați cu jumătate, dar nu vă opriți. Dacă nu vedeți rezultate pozitive de niciun fel în termen de trei până la patru zile, atunci veți merge la



următorul nivel de protocol. Cu animalele, sugerez mai puțin timp de așteptare decât cu oamenii înainte de a trece la următorul nivel al protocolului, deoarece în mod normal animalele răspund (se vindecă) mai rapid decât oamenii. În cea mai mare parte, puteți ajuta un animal cu MMS cam la fel ca un om. Dacă ați citit și ați studiat cu atenție această carte, se aplică aceleași reguli și principii, cu unele modificări minore.

† **Doza orală de MMS este diferită la animale decât la oameni** și depinde de greutatea lor.

† Rumegătoarele (de exemplu, vaci, oi, capre etc.) sunt diferite de oameni, pisici, câini etc., prin faptul că au stomacul cu patru compartimente. Nu am o mare experiență personală cu aceste animale, deși feedback-ul pe care l-am primit de la cei puternic implicați în rumegătoare sugerează următoarele:

Aceste animale pot lua doze orale de MMS1, atâta timp cât este activat cu HCl (acid clorhidric) și nu cu acid citric. Se știe că acidul citric cauzează probleme rumegătoarelor. Deci, dacă utilizați doze orale de MMS1 pentru un rumegător, utilizați HCl 4% ca activator sau dați doze orale de CDS. În plus, o variantă a CDS cunoscută sub numele de CDI (dioxid de clor injectabil) a fost, de asemenea, utilizată cu succes pe deplin cu aceste animale. (Pentru mai multe informații despre CDI, consultați cărțile de la Andreas Kalcker.) Atât dozarea orală cu MMS1 și CDS, cât și injecțiile cu CDS au avut succes. Vom învăța mai multe pe măsură ce timpul trece, dar acest lucru a funcționat până acum.

## **Dozarea orală a MMS pentru un animal**

**Notă:** *Trebuie calculate toate dozele orale de MMS pentru animale după greutatea animalului. Consultați diagramele de la paginile 300-301.*

## **General Malaise / Boală**

Dacă animalul dvs. nu este bine și animalul nu a fost diagnosticat cu nicio boală anume (de exemplu, cancer etc.), vă recomand să încercați mai întâi Protocolul 6 și 6.

### **Pasul 1**

- † Dați Protocolul 6 și 6, dar asigurați-vă că cantitatea de MMS este ajustată pentru greutatea animalului, conform graficului de la pagina 301.

### **Pasul 2**

- † Dacă animalul se simte bine după ce ați dat protocolul 6 și 6 (pasul 1 de mai sus), animalul poate continua doza zilnică de întreținere.

### **Pasul 3**

- Dacă totuși animalul a îmbunătățit unele, sau chiar multe, cu o singură procedură 6 și 6, dar nu este încă bine, atunci urmați regula care spune că dacă lucrurile se îmbunătățesc, nu schimbați nimic - continuați să faceți ceea ce faceți. Cu toate acestea, în acest caz, nu continuați cu doze de 6 picături la fiecare oră, dar după primele 6 și 6, așteptați patru ore și dați animalului încă 6 și 6 doze (amintiți-vă, aceste 2 doze sunt administrate cu o oră distanță și ajustate pentru greutatea animalului conform graficului de la pagina 301).

- Dacă animalul continuă să se amelioreze, dar nu este complet recuperat, dați 6 și 6 dimineața și 6 și 6 seara, atâta timp cât animalul se îmbunătățește, până la bine. Pe de altă parte, dacă animalul a renunțat să se îmbunătățească de la tratamentul 6 și 6 și este încă bolnav, atunci este timpul să îl începeți cu HRP începând cu procedura de pornire și dozele orare.

**Notă:** *Instrucțiunile de mai sus sunt o ușoară variație față de Protocolul 6 și 6 pentru oameni și trecerea în doze orare dacă două doze de 6 picături nu aduc recuperare. Uneori poate fi un efort destul de mare pentru a da unui animal o doză orară. Cel mai important lucru este să urmați cele Trei Reguli de Aur, dacă vedeți progrese continuați să faceți ceea ce funcționează și, dacă nu, treceți la Planul de recuperare a sănătății.*

## **Pasul 4**

- În cazul în care dați unui animal 6 și 6 o dată și nu prezintă semne de îmbunătățire, treceți direct la Procedura de pornire urmată de Protocolul 1000 și continuați cu Planul de recuperare a sănătății, dacă este necesar. Amintiți-vă din nou, toate dozele pentru animalul dvs. trebuie să fie ajustate în funcție de greutate, consultați diagramele de la paginile 300-301.

## **Dacă animalul a fost diagnosticat cu o boală specială**

### **Pasul 1**

- Dacă animalul dvs. a fost deja diagnosticat cu o boală specifică, cum ar fi pneumonia sau cancerul sau orice altă boală, va trebui să începeți procedura de pornire.

### **Pasul 2**

- † După finalizarea procedurii de pornire, treceți la Protocolul 1000 și avansați prin Protocolul 1000 Plus, 2000 și 3000 în conformitate cu Planul de recuperare a sănătății, așa cum este descris în această carte (a se vedea capitolul 5) și cele Trei reguli de aur pentru animale (pagina 305 ).

## **Calculul dozelor și explicația măsurătorilor pentru animale**

Mărimea dozei trebuie întotdeauna determinată de greutatea animalului. Următoarea este o diagramă pentru dozarea animalelor. Vă rugăm să citiți cu atenție această diagramă pe măsură ce diferitele picături, mililitri și miligrame se schimbă în diagramă. Fii atent la schimbări. Urmăți instrucțiunile de mai jos:

**Cupa 1 și Cupa 2:** Va trebui să pregătiți o soluție de MMS1 (MMS activat) în apă, din care veți măsura o anumită cantitate de picături sau mililitri de soluție pentru a da animalului dumneavoastră. După cum sa menționat mai sus, doza pentru animale este determinată de greutatea animalului. Cup1 este o soluție mai slabă de MMS1. Este pentru animale mici, deoarece au nevoie de o cantitate foarte mică. Prin urmare, soluția din care luați picături trebuie să fie mult mai slabă decât pentru animalele mai mari. Cup2 este o soluție mai puternică utilizată pentru animalele mai mari.

**Măsurare pentru Cupa 1:** Activați 1 picătură de MMS, numărați 30 de secunde, apoi adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Din această soluție veți măsura picături sau mililitri pentru a da animalului dvs., conform graficelor de la paginile 300-301.

**Măsurare pentru Cup2:** Activați 8 picături de MMS, numărați 30 de secunde, apoi adăugați 1/2 cană (4 uncii / 120 ml) de apă. Din această soluție veți

măsura picături sau mililitri pentru a da animalului dvs. conform graficelor de la paginile 300-301.

**Notă:** *Utilizați apă distilată, osmoză inversă sau apă îmbuteliată pentru aceste soluții. Amintiți-vă însă că unele ape îmbuteliate conțin fluor, clor sau alte substanțe nocive. Deci, verificați sursa de apă. Citiți etichetele și / sau consultați producătorii pentru a afla ce obțineți.*



	<b>Protocol pentru legenda animalelor</b>
<b>ml</b>	<b>mililitru</b>
<b>1000 ml</b>	<b>1 litru</b>
<b>mg</b>	<b>miligrame</b>
<b>kg</b>	<b>kilogram</b>
<b>lbs</b>	<b>lire sterline</b>
<b>Cupa1</b>	<b>1 picătură MMS 1 doză în 4 oz (120 ml) apă</b>
<b>Cupa2</b>	<b>8 picături doză MMS1 în 4 oz (120 ml) apă</b>
<b>d-C1</b>	<b>picături din Cupa 1</b>
<b>d-C2</b>	<b>picături din Cup2</b>
<b>ml-C1</b>	<b>ml din Cup1</b>
<b>ml-C2</b>	<b>ml din Cup2</b>
<b>MMS</b>	<b>Soluție de clorit de sodiu 22,4%</b>
<b>MMS1</b>	<b>MMS activat</b>
<b>d-MMS1</b>	<b>picături de MMS1</b>

**Explicația modului de utilizare a diagramelor de dozare pentru animale**

**Adăugarea de apă la doza animalului:** Nu dați niciodată unui animal MMS1 (MMS activat) fără a adăuga apă. Fiecare animal este diferit și va avea nevoie de o cantitate diferită de apă pentru dozele sale. Evaluează-ți animalul cu atenție. Determinați ce este o băutură normală de apă pentru acel animal. (Cu alte cuvinte, doriți să determinați care este cantitatea normală de apă pe care o bea animalul dvs. la un moment dat.) Adăugați cantitatea de MMS1 pe care ați stabilit-o ca fiind cantitatea potrivită pentru animalul dvs. (în funcție de greutate) din Cup1, Cup2, sau picături MMS1, până la cantitatea de apă pe care ați stabilit-o este o băutură normală de apă pentru animal și puneți-l animalul să o bea. Acest lucru poate fi mai ușor de spus decât de făcut la început. Am folosit o seringă mică pentru animalele mici, sau o seringă mare sau baster de curcan pentru animalele mai mari, pentru a stropi o doză pe gâtul animalului. S-ar putea să știți o metodă mai bună.

**Coloana marcată Greutatea animalului:** Pentru a utiliza diagrama de dozare pentru animale, (paginile 300-301), mergeți mai întâi la coloana marcată Greutatea animalului. Treceți degetul în jos pe coloană pentru a găsi greutatea animalului, apoi treceți la coloana protocolului dorit. Mai jos este o explicație completă a coloanelor de la 1 la 6 și a ceea ce reprezintă numerele din fiecare coloană.

**Coloana 1: Procedură de pornire** dozare pentru animale. Ca și în cazul oamenilor, începeți întotdeauna cu procedura de pornire pentru animale. Cele trei numere din această coloană reprezintă creșterea treptată a dozei. Primul număr este doza inițială, al doilea număr este doza medie și al treilea număr este doza maximă pe care ați da-o vreodată unui animal pentru acea greutate specificată în coloana pentru procedura de pornire.

**Coloana 2: Protocolul 1000 și 1000 Plus** dozare pentru animale. Când faceți Protocolul 1000 pentru oameni, lucrați treptat la doza de 3 picături; pentru animale echivalentul unei doze de 3 picături este a treia cifră din cele trei figuri din această coloană (coloana 2). Primul număr este doza inițială, al doilea număr este doza medie și al treilea număr este doza maximă pe care ați da-o vreodată unui animal pentru acea greutate specificată în coloana Protocolului 1000

† Începeți întotdeauna cu procedura de pornire, apoi treceți la Protocolul 1000, crescând doza încet la doza maximă pentru Protocolul 1000, dar nu mai mare decât doza listată în Coloana 2 (Protocolul 1000) din grafic pentru greutatea animalului dumneavoastră.

† Dacă în orice moment observați că animalul dumneavoastră se îmbolnăvește, i-ați crescut doza prea repede. Reduceți imediat doza cu 50%. Când boala trece, reveniți treptat la doza dorită.

† Dacă animalul nu prezintă semne de îmbunătățire după două zile, treceți la Protocolul 1000 Plus. Aceasta înseamnă adăugarea de DMSO la fiecare doză orală. Continuați să utilizați aceleași cantități de dozare pentru Protocolul 1000 și adăugați următoarele cantități de DMSO:

Cup1 - adăugați 3 picături de DMSO.

Cup2 - adăugați 24 de picături de DMSO.

Picături MMS1 - pentru fiecare 1 picătură de MMS1, adăugați 3 picături de DMSO.

Rețineți că, odată ce adăugați DMSO la amestecul MMS1 în Cup1 și Cup2, acesta va menține puterea maximă timp de două ore. „Cupele” cu DMSO adăugat vor trebui să fie preparate proaspete la fiecare a treia oră.

**Coloana 3: Protocolul 2000** dozare pentru animale. Deși Protocolul 2000 pentru oameni solicită luarea MMS1 și MMS2, această coloană este doar pentru MMS1. Acest lucru se datorează faptului că, în mod normal, nu ați oferi unui animal MMS2. Cu toate acestea, există rare excepții și am inclus detalii despre modul de administrare a MMS2 animalelor în coloana 5. Am dat doar două numere în această coloană. Acest lucru se datorează faptului că principiul Protocolului 2000 este că lucrați până la a lua cât mai multe picături de MMS1 pe oră, dar fără a vă îmbolnăvi (în acest caz fără ca animalul dvs. să se îmbolnăvească).

Deci, primul număr este suma pe care ai începe să o dai animalului tău. Aceasta presupunând că ați avut animalul

dvs. la Protocolul 1000 și ați lucrat până la doza maximă echivalentă cu 3 picături pentru greutatea animalului pe care îl solicita Protocolul 1000 (conform coloanei 2). În acel moment, începeți să măriți doza așa cum se solicită în Protocolul 2000. Dacă nu ați lucrat până la echivalentul cu 3 picături, apoi începeți de la orice doză la care vă aflați și

Începe creșterea treptată a picăturilor din doză. Al doilea număr din această coloană este cantitatea maximă de MMS1 pe care un animal este probabil să o poată lua în funcție de greutatea animalului - nu treceți niciodată peste a doua cifră listată.

- Începeți cu primul număr dat în această coloană, apoi creșteți cantitatea de MMS1 în trepte mici după fiecare două până la trei doze, deoarece se pare că animalul o poate lua. Sau, dacă observați o îmbunătățire, nu modificați doza din acel moment până când nu mai există îmbunătățire, atunci puteți crește încet, dar nu treceți peste a doua cifră.

- Dacă animalul are diaree, vărsături sau prezintă alte semne de boală crescută, reduceți doza cu 50%. Ultima cantitate pe care ați dat-o fără ca animalul să se îmbolnăvească este cel mai probabil doza corectă, deci rămâneți cu acea cantitate.

- Amintiți-vă, pe acest protocol continuați să dați DMSO împreună cu MMS1.

**Coloana 4: MMS2** dozare pentru animale. MMS2 este dificil la animale și în mod normal nu trebuie să utilizați MMS2, dar dacă animalul dvs. pare rezistent la îmbunătățire, poate doriți să îl încercați. În acest caz, acestea sunt cantitățile de care are nevoie animalul dvs. la fiecare două ore în timp ce faceți protocolul 2000 - la fel ca la oameni. (Citiți instrucțiunile pentru persoanele din Protocolul 2000 și adăugarea MMS2 la paginile 91-95.) Cantitățile de MMS2 date în coloana 4 din Diagrama de dozare a animalelor 2 (pagina 301) sunt sumele maxime de dat. Începeți animalul cu o doză mult mai mică decât cea indicată în grafic și apoi măriți până la cantitatea dată. Nu dați mai mult decât

această cantitate de 5 ori pe zi, ceea ce ar fi la fiecare două ore pe o perioadă de 10 ore.



- Pentru fiecare mg de MMS2 din capsulă (dacă animalul dumneavoastră va înghiți o capsulă), dați 1 ml de apă animalului pentru ao spăla. Dacă animalul vrea să bea mai multă apă, permiteți-i să bea cât dorește.

- Dacă nu puteți cobora capsula în gâtul animalului, puteți pune MMS2 (hipoclorit de calciu) în apa potabilă. Determinați câtă apă trebuie să bea zilnic animalul dumneavoastră. (Acesta este ceva ce puteți găsi pe internet.) Luați cantitatea totală de apă pe care animalul dvs. ar trebui să o bea într-o zi, adăugați de 1/2 până la 1 ori cantitatea de MMS2 mg pe care animalul dvs. ar trebui să o ia zilnic, așa cum este listat în coloana 6 — Întreținerea zilnică (în funcție de greutatea animalului dvs.) a apei potabile a animalului.

- Dacă sunteți serios, va trebui să cumpărați o scală de miligrame. Vă sugerez Gemini-20 Portable Milligram Scale. Are capacitatea de a cântări 1 miligram până la 20 de grame, ceea ce este suficient de precis cu capacitatea animalelor care cântăresc de la o kilogramă la o greutate mai mare decât un cal. Costul variază de la 24,00 USD la 60,00 USD și pot fi cumpărate de pe internet și expediate aproape oriunde în lume. În SUA le puteți cumpăra de la Walmart sau online. Accesați Google și puneți scara Gemini-20 Portable Milligram pentru o serie de companii care vând această scară uimitoare. Dacă nu aveți o cântare și nu o puteți obține, rețineți că o capsulă de dimensiunea # 0 conține aproximativ 300 mg de MMS2 pe care le puteți împărți de mai multe ori pentru a obține cantități mai mici.

**Coloana 5: Protocolul 6 și 6** dozare pentru animale. Este posibil să găsiți această coloană (protocol) cea mai importantă și utilă, deoarece

Protocolul 6 și 6 va depăși majoritatea problemelor animalelor, împreună cu sticla de pulverizare. Doar urmați instrucțiunile de la rubrica General Malaise / Sickness la pagina 291.

**Coloana 6: MMS1 Dozare de întreținere** sume pentru animale. O doză zilnică de întreținere de MMS1 vă poate menține animalul departe de toxine, agenți patogeni (microorganisme cauzatoare de boală) și paraziți. Această coloană indică cantitatea de MMS1 pe care animalul dvs. ar trebui să o aibă pentru întreținerea zilnică, în funcție de greutate. Amintiți-vă, trebuie să amestecați MMS1 cu apă înainte de a-l da animalului dumneavoastră.

3. Dacă nu i-ați dat animalului MMS1 și i-ați dat o doză de întreținere și îl îmbolnăvește, acesta este un indiciu că există toxine care trebuie eliminate. În acest caz, puneți animalul în Procedura de pornire, urmată de Protocolul 1000. După finalizarea Protocolului 1000, continuați cu o doză zilnică de întreținere.

### **Animal Protocol Diagramă de dozare Umbrire:**

† Zona albă a graficului reprezintă Cupa 1.

† Zona umbrită medie reprezintă Cup2.

† Zona întunecată reprezintă MMS1.



**Herpes pentru ochi de pisică:** Pisica mea avea tot timpul ochii crustați. Veterinarul i-ar prescrie unguent pentru ochi atunci când s-a înrăutățit, dar

În afară de asta a spus că nu ar putea face nimic. Era o formă de herpes în ochii pisicii, transmisă probabil de la pisica mamă. A trebuit să-i șterg ochii cu o cârpă umedă în fiecare zi. Am amestecat o picătură de MMS activat cu apă și i-am stropit-o zilnic în gură. Nu i-a plăcut, dar nici nu a aruncat-o. În decurs de două săptămâni, ochii i s-au limpezit și au rămas limpezi ... Mă bucur că nu mai avea ochii plini de crustă și plâns! - Sunni, Statele Unite

<b>Doze de protocol animal: Diagrama 1</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Greutatea animalului</b>	<b>Pornire Procedură</b>	<b>Protocol 1000</b>	<b>Protocol 2000</b>
<b>1 - 2 lbs. (0,45 - 0,9 kg)</b>	<b>4.5-9-14 d-C1</b>	<b>1.0-2.0-3.0 ml-C1</b>	<b>4.0-8.0 ml-C1</b>
<b>2 - 4 lbs (0,9 - 1,8 kg)</b>	<b>9-18-27 d-C1</b>	<b>2.0-3.0-4.0 ml-C1</b>	<b>5.0-10 ml-C1</b>
<b>4 - 6 lbs (1,8 - 2,7 kg)</b>	<b>1.0-2.0-3.0 ml-C1</b>	<b>3.0-4.0-5.0 ml-C1</b>	<b>7.0-14.0 ml-C1</b>
<b>6 - 8 lbs (2,7 - 3,6 kg)</b>	<b>3.5-7-10.5 d-C2</b>	<b>1.0-2.0-3.0 ml-C2</b>	<b>3.0-7.0 ml-C2</b>
<b>8 - 12 lbs (3,6 - 5,5 kg)</b>	<b>4.5-9-13 d-C2</b>	<b>1-2,5-3,5 ml-C2</b>	<b>3.5-7.5 ml-C2</b>
<b>12 - 16 lbs (5,5 - 7,2 kg)</b>	<b>7-14-21 d-C2</b>	<b>1,5-2,5-4,0 ml-C2</b>	<b>4.0-8.0 ml-C2</b>
<b>16 - 22 lbs (5,7 - 10 kg)</b>	<b>9,5-19-28 d-C2</b>	<b>1,5-2,5-2,0 ml-C2</b>	<b>3.0-10.0 ml-C2</b>
<b>22 - 30 lbs (10 - 13,6 kg)</b>	<b>13-26-38 d-C2</b>	<b>2.0-3.5-4.5 ml-C2</b>	<b>4-11 ml-C2</b>
<b>30 - 40 lbs (13,6 - 18 kg)</b>	<b>17-34-50 d-C2</b>	<b>3.0-5.0-8.0 ml-C2</b>	<b>8.0-16 ml-C2</b>
<b>40 - 55 lbs (18,1 - 25 kg)</b>	<b>23-45-65 d-C2</b>	<b>4-7-11 ml-C2</b>	<b>11-18 ml-C2</b>
<b>55 - 75 lbs</b>	<b>1,5-3,0-4,5</b>	<b>6.0-12-18</b>	<b>18-36</b>

<b>(25 - 34 kg)</b>	<b>ml-C2</b>	<b>ml-C2</b>	<b>ml-C2</b>
<b>75 - 100 lbs</b>	<b>2.0-4.0-6.0</b>	<b>8.0-16-24</b>	<b>30-50</b>
<b>(34 - 45,4 kg)</b>	<b>ml-C2</b>	<b>ml-C2</b>	<b>ml-C2</b>
<b>100 - 150 lbs</b>	<b>3.5-7-10</b>	<b>14-28-42</b>	<b>2,5-6</b>
<b>(45,4 - 68 kg)</b>	<b>ml-C2</b>	<b>ml-C2</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>150 - 200 lbs</b>	<b>4.5-9-13</b>	<b>1,5-2.5-3</b>	<b>3-8</b>
<b>(68 - 91 kg)</b>	<b>ml-C2</b>	<b>D-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>200 - 300 lbs</b>	<b>7-14-21</b>	<b>2-4-6</b>	<b>6-16</b>
<b>(91 - 136 kg)</b>	<b>ml-C2</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>300 - 500 lbs</b>	<b>11-22-33</b>	<b>3-6-9</b>	<b>9-24</b>
<b>(136 - 227 kg)</b>	<b>ml C2</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>500 - 1000 lbs</b>	<b>1,5-3-4,5</b>	<b>6-12-18</b>	<b>18-48</b>
<b>(227 - 454 kg)</b>	<b>d MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>1000 - 1500 lbs</b>	<b>2,5-5-7,5</b>	<b>10-20-30</b>	<b>30-80</b>
<b>(454 - 681 kg)</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>
<b>1500 - 2300 lbs</b>	<b>3-7-10</b>	<b>14-28-42</b>	<b>42-112</b>
<b>(681 - 1045 kg)</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>	<b>d-MMS1</b>

**Adăugarea DMSO la Protocolul 1000:** Pentru fiecare picătură din Cup1 adăugați 1/2 picătură de DMSO.

Pentru fiecare picătură din Cup2 adăugați 1 picătură de DMSO. Pentru fiecare picătură MMS1 adăugați 3 picături de DMSO.

<b>Doze de protocol animal: Diagrama 2</b>			
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Greutatea animalului</b>	<b>MMS2  Maxim  Dozare</b>	<b>6 și 6</b>	<b>MMS1 zilnic  întreținere</b>
<b>1 - 2 lbs. (0,45 - 0,9 kg)</b>	<b>2 mg</b>	<b>.7&amp; .7 ml-C2</b>	<b>.7 ml-C2</b>
<b>2 - 4 lbs (0,9 - 1,8 kg)</b>	<b>4 mg</b>	<b>1.5&amp; 1.5 ml-C2</b>	<b>1,5 ml-C2</b>
<b>4 - 6 lbs (1,8 - 2,7 kg)</b>	<b>12 mg</b>	<b>2.5 și 2.5 ml-C2</b>	<b>2,5 ml-C2</b>
<b>6 - 8 lbs (2,7 - 3,6 kg)</b>	<b>16 mg</b>	<b>4.0&amp; 4.0 ml-C2</b>	<b>4,0 ml-C2</b>
<b>8 - 12 lbs (3,6 - 5,5 kg)</b>	<b>24 mg</b>	<b>5.5&amp; 5.5 ml-C2</b>	<b>5,5 ml-C2</b>
<b>12 - 16 lbs (5,5 - 7,2 kg)</b>	<b>32 mg</b>	<b>8.5&amp; 8.5 ml-C2</b>	<b>8,5 ml-C2</b>
<b>16 - 22 lbs (5,7 - 10 kg)</b>	<b>44 mg</b>	<b>12 &amp; 12 ml-C2</b>	<b>12 ml-C2</b>
<b>22 - 30 lbs (10 - 13,6 kg)</b>	<b>60 mg</b>	<b>18&amp; 18 ml-C2</b>	<b>18 ml-C2</b>
<b>30 - 40 lbs</b>	<b>80 mg</b>	<b>21 &amp; 21</b>	<b>21 ml-C2</b>

(13,6 - 18 kg)		ml-C2	
40 - 55 lbs	110 mg	2& 2	2
(18,1 - 25 kg)		d-MMS1	d-MMS1
55 - 75 lbs	150 mg	3& 3	3
(25 - 34 kg)		d-MMS1	d-MMS1
75 - 100 lbs	200 mg	4& 4	4
(34 - 45,4 kg)		d-MMS1	d-MMS1
100 - 150 lbs	300 mg	6& 6	6
(45,4 - 68 kg)		d-MMS1	d-MMS1
150 - 200 lbs	400 mg	7& 7	7
(68 - 91 kg)		d-MMS1	d-MMS1
200 - 300 lbs	600 mg	12& 12	12
(91 - 136 kg)		d-MMS1	d-MMS1
300 - 500 lbs	1 gram	18& 18	18
(136 - 227 kg)		d-MMS1	d-MMS1
500 - 1000 lbs	2 grame	36& 36	36
(227 - 454 kg)		d-MMS1	d-MMS1
1000 - 1500 lbs	3 grame	56& 56	56
(454 - 681 kg)		d-MMS1	d-MMS1
1500 - 2300 lbs	5 grame	86& 86	86
(681 - 1045 kg)		d-MMS1	d-MMS1



**Măsurare:** Este util să aveți la îndemână o seringă de 10 mililitri pentru animalele mai mici sau o seringă mai mare de 50 de mililitri pentru animalele mai mari, pentru a măsura mililitri (ml) pentru animalul dumneavoastră. Acest lucru poate fi cumpărat de obicei online, de la un magazin de hrană pentru animale sau de la medicul veterinar.

## **Apă potabilă pentru animale**

În mod normal, apa potabilă a animalului trebuie menținută la 1 ppm de dioxid de clor. Aceasta ar fi 4 picături MMS1 (MMS activate) pentru fiecare galon de apă curată. (Unii oameni au mai mult de un animal și ar folosi atât de multă apă într-o zi, este posibil ca unii să aibă un singur animal și să aibă nevoie de mai puțină apă. Dacă aveți nevoie de mai puțină apă, calculați 1 picătură de MMS1, pe litru / litru de apă.)

Pentru cei din zonele rurale sau de la o fermă, apa ușor tulbure va avea nevoie de mai mult MMS1 pe galon, utilizați 6 până la 12 picături pentru apă ușor tulbure pe galon. Cu cât este mai mare turbiditate, cu atât sunt necesare mai multe picături. În mod normal, 4 picături de MMS 1 pe galon sunt suficiente.

Dacă introduceți MMS1 în apa de băut zilnică a animalului, acest lucru nu este suficient pentru a servi ca doză de întreținere a MMS1. Urmăriți graficul pentru dozele zilnice de întreținere pentru animalul dvs., fie punând doza în apa lor, fie oferindu-le altfel.

**Notă:** Vă sugerez să folosiți sticlă sau apă din plastic de bună calitate boluri pentru animalele dvs. dacă puneți MMS în apa lor de băut. Pe de altă parte, dacă activați MMS mai întâi într-un recipient din sticlă sau plastic, făcându-l MMS1 și adăugați apă, atunci după ce este activat și amestecat cu apă, este OK să introduceți în recipiente metalice care sunt adesea folosite pentru animale. Nu amestecați MMS neactivat (clorit de sodiu) și activ-tor direct într-un castron sau cupă metalică. Mai întâi activați și adăugați apă într-un pahar sau pahar de plastic, apoi puneți-l în castron.

## **Informații suplimentare suplimentare despre modul de administrare a anumitor protocoale la animale**

### **Protocol 3000 pentru animale**

Protocolul 3000 necesită două sticle de pulverizare, la fel ca la oameni, una pentru MMS1 și una pentru DMSO. Pentru început, spălați zona de pe animal pe care urmează să aplicați MMS1 și DMSO. De fapt, este simplu; doar pulverizați un picior sau o zonă cu cantitatea de MMS1 necesară pentru ca lichidul să ajungă în piele prin păr. Apoi pulverizați DMSO deasupra. Vedeți mai jos idei despre cum să utilizați o sticlă de pulverizare pentru animale. Este OK să amestecați cele două - MMS1 și DMSO - pe corp pulverizând mai întâi unul și apoi pulverizându-l pe celălalt deasupra. Dar nu amestecați MMS1 și DMSO în aceeași sticlă de pulverizare, deoarece acestea se vor anula reciproc.

### **Ochi pentru animale**

Vă rugăm să rețineți, unele sume din această carte - cum ar fi utilizarea MMS1 în ochi - au fost actualizate de când am scris ultima mea carte. Pentru ochi, sugerez acum utilizarea unei doze mult mai slabe pentru ochii animalelor (același protocol ca și pentru hu-mans). Consultați paginile 136-139 pentru explicații suplimentare și pentru instrucțiuni despre amestecarea unei soluții MMS1 pentru ochi.)

### **Gură și dinți pentru animale**

Folosiți aceleași măsurători și proces pentru spălarea dinților animalului ca și pentru oameni. Acest lucru nu numai că vă va ajuta să mențineți gura proaspătă a animalului, dar se aplică aceleași principii ca și pentru oameni. Amintiți-vă, aproape toate bolile sunt influențate într-o oarecare măsură, fie ele mari sau mici, de starea gurii. (Vezi paginile 73-76.) Este OK să folosești sticla de pulverizare standard (vezi paginile 76-77) în gura animalului tău.

## **Probleme de piele pentru animale (sticla de pulverizare MMS)**

Numărul de picături pe care le puneți într-o sticlă de pulverizare pentru un animal este același ca și pentru oameni. Cu toate acestea, pulverizarea unui animal păros poate fi dificilă (pentru unele animale mai mult decât altele, în funcție de lungimea, grosimea și cantitatea de păr). Dacă doriți ca lichidul să ajungă efectiv la piele, acesta este obiectivul, puteți realiza acest lucru despărțind părul, pulverizați și apoi folosiți degetele, dacă este necesar, pentru a bate ușor și a ajuta lichidul să ajungă la piele. Apoi deplasați-vă peste încă 1/2 inch sau cam așa, împărțiți din nou părul, pulverizați și așa mai departe, până când ați acoperit întreaga zonă care are nevoie de spray.

**Notă:** *Este posibil să trebuiască să radeți zona problemei, dacă este necesar, pentru a aplica în mod adecvat MMS.*

## **Protocoale suplimentare și de sprijin pentru animale**

Pentru animale, nu este întotdeauna ușor, dar puteți utiliza aproape toate celelalte protocoale pe animale dacă trebuie să le utilizați. Utilizarea protocoalelor MMS1 pentru ochi, urechi, nas, probleme ale pielii (sticla cu spray), plasurele și orice altceva, cu excepția dozelor orale, ar trebui să aibă aceeași concentrație pentru animale ca și pentru oameni, conform instrucțiunilor din această carte.

**Notă:** caii și alte animale nu pot voma, așa că aveți grijă să nu dați animalului dvs., în special calului, prea mult MMS deoarece îmbolnăvirea unui cal este mai periculoasă decât îmbolnăvirea cuiva care poate voma (pentru că vărsătura este modalitatea prin care organismul scapă de lucruri nedorite, otrăvuri etc.). Cu toate acestea, caii răspund la MMS rapid, de obicei mai repede decât oamenii și am văzut un cal înfrângând răceala folosind MMS1 în jumătate de oră. Așteptați-vă ca majoritatea animalelor să răspundă rapid.

### **Trei reguli de aur pentru animale**

**1.** Dacă animalul îmbunătățește doza pe care o dați și / sau ceea ce faceți, nu modificați ceea ce faceți - atâta timp cât vedeți o îmbunătățire, continuați-l.

**2.** Aceeași regulă se aplică animalelor ca și persoanelor: dacă animalul dumneavoastră pare să se îmbolnăvească în orice moment cu MMS, reduceți doza pe care o dați cu 50%. Odată ce boala trece și animalul este OK cu doza mai mică, puteți încerca să lucrați încet înapoi, dar aveți grijă să nu faceți animalul mai bolnav.

**3.** Dacă animalul nu se îmbunătățește și nici nu se înrăutățește în ceea ce privește doza pe care o administrați, după două sau trei zile, mergeți la următorul protocol superior.



**Câine - Creșterea și infecția gingiei:** Câinele meu în vârstă de 12 ani a fost operat pentru a îndepărta o creștere uriașă a gingiei (epilis) care i-a crescut dinții. După operație, site-ul nu s-a vindecat după operație și a arătat grav inflammat. După un timp, o altă creștere se forma în același loc. În loc să o duc înapoi la veterinar, am decis să încerc MMS. Am aplicat MMS pe zona ei afectată cu o periută de dinți moale timp de câteva zile și am fost surprins să constat că nu numai că inflamarea dispăruse, dar noua creștere dispăruse complet. Când te uiți în gura ei nu există niciun semn că ar fi ceva în neregulă. Este complet normal. - Elizabeth



## **In concluzie**

În final, amintiți-vă, aproape toate bolile și problemele de sănătate pot fi remediate cu MMS urmând instrucțiunile din această carte. Vreau să mai spun o dată că MMS nu vindecă bolile. MMS ucide agenții patogeni și oxidează otrăvurile oriunde s-ar putea afla, inclusiv în apa corpului. Odată ce agenții patogeni sunt șterși și otrăvurile sunt oxidate, prin procesul normal de eliminare, corpul le spală și apoi corpul este capabil să se vindece și să fie readus la sănătate deplină.

Dacă urmați aceste instrucțiuni, vă puteți recăpăta sănătatea într-un timp rezonabil. Vă încurajăm să continuați să aflați mai multe despre cum să utilizați MMS. Introduceți dozele de întreținere MMS în rutina zilnică, încercați să mâncați alimente integrale reale, naturale, precum și să încorporați alte practici sănătoase în viața dvs., astfel încât să puteți ajunge și să mențineți o sănătate optimă și să preveniți bolile în viitor.

Vorbind despre practici sănătoase, vreau să vă las, probabil, două dintre cele mai importante practici sănătoase din toate timpurile. Ei sunt - întotdeauna să faci ceea ce trebuie și se ajută reciproc. De-a lungul veacurilor, aceste două concepte au fost exprimate în moduri diferite de aproape fiecare grup etnic sau religie pe care îl puteți numi. Numai asta ar trebui să vă ofere un indiciu - poate există un merit de a trăi conform acestor standarde. Din păcate, în lumea de

astăzi, ele sunt uneori neglijate. Dar vă încurajez să adoptați aceste practici ca parte integrantă a stilului dvs. de viață. S-ar putea să descoperiți că face o mare diferență în fericirea voastră și în sănătatea și bunăstarea voastră. Dacă veți face întotdeauna lucrurile corecte și vă veți ajuta reciproc, veți obține beneficii pozitive.

## Anexa A

### CDS, CDH Informații de bază

În această carte am ales să nu intru în detalii nici pe CDS (soluție de dioxid de clor), nici pe CDH (Clor dioxid dioxid). Acestea sunt ambele variante ale MMS1, fiecare necesitând un preparat diferit, deși toate cele trei sunt realizate din aceleași două ingrediente; MMS și un activator acid.

**Scopul principal al acestei cărți este de a oferi o bază solidă a Planului de recuperare a sănătății folosind MMS1 și MMS2.** Odată ce ați înțeles principiile din această carte, le puteți aplica pe CDS și CDH, ambele putând fi utilizate cu multe protocoale MMS.

Descoperim tot timpul lucruri noi despre MMS și despre CDS și CDH, care există mai puțin timp decât MMS1. Am predat despre CDS în cartea mea anterioară, precum și despre videoclipuri instructive de pe YouTube și despre CDS și CDH în seminarii. Cu toate acestea, de atunci, unele informații s-au schimbat. (Deci, unele documente și videoclipuri anterioare sunt acum depășite.) Este un proces continuu. Datorită timpului și spațiului, nu este posibil să acoperiți corect sau temeinic CDS și CDH în această carte și, așa cum am menționat mai sus, este important să înțelegeți mai întâi principiile generale de bază ale MMS și ale Planului de recuperare a sănătății. Dar pentru cei interesați, consultați secțiunea CDS / CDH (care

se actualizează în timp) pe [mmswiki.is](http://mmswiki.is) pentru mai multe informații. Amintiți-vă, ca și în cazul MMS1,

Acestea fiind spuse, iată câteva informații cu privire la unele dintre diferențele dintre CDS, CDH și MMS1.

De-a lungul anilor, am primit o mulțime de feedback atât de la miniștrii sănătății din întreaga lume, care sunt foarte activi în a-i ajuta pe ceilalți să-și recupereze sănătatea, cât și de la indivizi înșiși, cu privire la cele trei forme de MMS (MMS1, CDS și CDH) și modul în care acestea am lucrat pentru ei.

Vreau să clarific faptul că am văzut că toate formele de MMS ajută oamenii să-și recupereze sănătatea. Cu toate acestea, există diferențe semnificative cu fiecare. Deoarece MMS1 a fost deja acoperit pe larg în această carte, mai jos este un scurt sinopsis al CDS și CDH.

## **CDS**

CDS a fost dezvoltat de un fermier cu sprijin direct și cooperarea lui Andreas Kalcker. (A fost inițial dezvoltat pentru utilizare cu animale.) CDS este dioxid de clor gazos în apă distilată și nu conține clorit de sodiu sau activator. Trebuie să fie alcătuit din timp printr-unul din mai multe procese de distilare și ideal depozitat în frigider. Un amestec prefabricat poate fi convenabil. În funcție de modul de manipulare a CDS, poate dura câteva săptămâni sau chiar mai mult.

În timp ce CDS este relativ ușor de realizat, există multe variabile care pot avea un efect asupra produsului final. Lucruri precum temperatura, clima, altitudinea, umiditatea, presiunea aerului și tipul de echipament utilizat pot face o mare diferență în CDS rezultate. De exemplu, dacă există prea mult aer în sticlă sau borcan în care este depozitat, poate pierde potența. De fiecare dată

când deschideți sticla, are loc o degajare care va reduce puterea și așa mai departe. Învățarea tehnicilor de realizare și manipulare a CDS nu este atât de dificilă dacă cineva este dedicat acestui lucru - dar trebuie acordată o atenție deosebită detaliilor.

CDS este complet activat - nu rămâne clorit de sodiu rezidual în soluție - ceea ce este considerat de unii un avantaj. Poate fi mai ușor pe stomac și mulți consideră că are puțin gust în comparație cu MMS1. La doze mici acest lucru este adevărat. Cu toate acestea, pentru a recupera sănătatea după boala gravă, este de obicei necesar să luați doze la nivel înalt de CDS. Când se întâmplă acest lucru, gustul și / sau arsurile în gât pot intra în ecuație și, uneori, o reacție Herxheimer.

CDS poate fi util pentru persoanele sensibile, care dintr-un motiv sau altul nu pot tolera MMS1. Am văzut că pentru unii oameni pornirea pe CDS poate fi benefică pentru a ne ajuta să ne obișnuim să luăm MMS1. Procedura de pornire cu MMS1 a eliminat necesitatea acestui lucru în majoritatea cazurilor. Observațiile enunțate mai sus se referă la administrarea CDS intern. Unii oameni consideră că CDS funcționează cel mai bine în tratarea afecțiunilor externe și mulți au avut succes în acest sens.

Principala observație importantă pe care am observat-o eu și alți utilizatori extensivi de CDS (care au lucrat îndeaproape cu mine) este ceva pe care îl numesc phenomena platoului. Cei care lucrează cu copii cu autism au folosit CDS exclusiv timp de un an. La început a fost ușor să vezi că copiii se îmbunătățesc, dar pe măsură ce timpul a trecut și copiii au continuat să ia CDS, majoritatea părea să lovească un platou în care nu se îmbunătățeau. Au ajuns la un impas. Dar când acești copii au fost repetați să ia MMS1, au început din nou să se îmbunătățească.

Mai mulți miniștri ai sănătății și alții, atunci când utilizează CDS pentru o varietate de boli, inclusiv cancerul, au raportat, de asemenea, acest fenomen. Se pare că există un moment în care individul lovește un impas (acest lucru

nu se întâmplă întotdeauna, dar se întâmplă adesea), dar atunci când este pus pe MMS1, începe să se îmbunătățească din nou. Deci, dacă utilizați CDS, sfatul meu ar fi



fii conștient de fenomenele de platou și, dacă ți se întâmplă, treci la MMS1.

Un alt cuvânt despre CDS: Au existat diferențe de opinie de-a lungul anilor cu privire la cantitățile de dozare de CDS și echivalentul CDS la MMS1 pentru utilizare în protocoalele noastre. În trecut, am publicat un raport de 1 ml de CDS la 3000 ppm egal cu o doză de 3 picături de MMS1. Am ajuns să cred că este o doză foarte mică pentru CDS. În același timp, am ajuns să realizez, din mai multe motive prea detaliate pentru a explica aici, că un echivalent exact între CDS și MMS1 nu este posibil să se descurajeze.

Acest lucru se datorează parțial motivelor menționate mai sus, pregătirea și manipularea CDS include multe variabile. De exemplu, puteți începe cu o soluție de CDS de 3000 ppm, dar peste câteva săptămâni, din cauza degazării de fiecare dată când sticla este deschisă și a altor factori, soluția dvs. poate fi din ce în ce mai slabă. Un alt motiv pentru care echivalentele exacte sunt dificil de determinat se datorează cantității de acid stomacal al unei persoane. Echivalenții pot fi determinați pe baza testelor cu acid stomacal „normal” simulat. Există, totuși, multe lucruri de luat în considerare, unul fiind dacă individul are într-adevăr acid stomac „normal” (majoritatea persoanelor care au o stare de sănătate precară și care au nevoie de recuperare a sănătății nu au acid normal la stomac). După cum am spus în repetate rânduri pe parcursul acestei cărți, dacă cineva respectă cele trei reguli de aur ale MMS,

Probabil cel mai important motiv pentru care nu putem echivala cantități de MMS1 și CDS este că, după trecerea

prin stomac, MMS1 are încă aproximativ 50% clorit de sodiu inactivat care trece în sistemul uman. Deoarece cloritul de sodiu a fost luat de mai bine de 80 de ani de sute de mii de oameni, dintre care mulți

jurăm pe el, trebuie să presupunem că cloritul de sodiu inactivat trebuie să aibă un anumit beneficiu pentru sistem, pe lângă dioxidul de clor. (Mai multe despre acest lucru mai jos.) Deoarece CDS nu are clorit de sodiu, nu există nicio modalitate de a face o evaluare una față de cealaltă.

## **CDH**

CDH a fost dezvoltat de Scott McRae și Charlotte Lackney. CDH este, de asemenea, „pre-fabricat” și mult mai ușor de realizat decât CDS. De asemenea, trebuie refrigerat. Durează câteva săptămâni până la o lună la frigider, în funcție de rețeta folosită. CDH, la fel ca MMS1, nu este activat în totalitate, lăsând astfel niște clorit de sodiu liber pentru a continua prin stomac în sistem. Nu am avut o experiență vastă cu CDH, prin urmare nu pot spune să-l folosesc sau să nu-l folosesc. Am primit rapoarte că a produs rezultate bune pentru unii utilizatori.

## **Concluzia mea personală privind MMS1, CDS și CDH**

După cum sa menționat mai sus, CDS este complet activat și nu conține clorit de sodiu rezidual în soluție. CDH și MMS1 conțin niște clorit de sodiu gratuit care își face drum prin stomac în sistem. Acum, deși unii oameni cred că avantajul pentru CDS este că nu conține clorit de sodiu inactivat, am o părere diferită. Cred exact opusul.

Cloritul de sodiu inactivat singur, de asemenea, distruge otrăvurile și ucide agenții patogeni. A fost vândut în magazinele de produse naturiste din SUA de 80 de ani și multe mii de oameni au avut unele rezultate bune de la administrarea acestuia. Există cei care îl folosesc acum fără activare prealabilă, deoarece consideră că acidul din stomac este cel care îl activează și obțin o anumită cantitate de rezultate bune.

Când am descoperit MMS pentru prima dată, numai MMS (cloritul de sodiu) a vindecat primii bărbați din jungla malariei. Pe măsură ce am călătorit prin junglă, ajutând mult mai mulți oameni să-și recupereze sănătatea (mai ales din malarie și febra tifoidă), cloritul de sodiu a fost cel care a ajutat. Dar rata de succes a fost de aproximativ 60%. Prin multe experimente, abia după ce am dezvoltat formula în continuare și am început să activez MMS, rata de succes a malariei sa dovedit a fi de aproximativ 98% și de aproximativ 92-94% pentru alte boli.

După părerea mea, cloritul de sodiu inactivat pătrunde mai adânc în țesuturile corpului decât chiar MMS1, conform datelor pe care le-am extras din brevetele emise în secolul trecut. Cloritul de sodiu inactivat pătrunde în țesuturi într-un mod diferit de cel al MMS1 și, prin urmare, cele două împreună par a fi mai eficiente decât oricare dintre ele. Pentru mulți dintre noi a fost foarte evident că MMS1 (dioxid de clor) împreună cu cloritul de sodiu neactivat este cel care obține cele mai bune rezultate. Aceasta este o dovadă anecdotică, dar cu multe mii de oameni recuperați, chiar și oamenii de știință trebuie să admită că servesc drept dovezi legitime.

Un alt punct de reținut este faptul că, din păcate, furnizorii de CDS și CDH oferă uneori informații inexacte despre modul de utilizare a acestora. Dacă utilizați CDS și CDH, accesați site-ul nostru [mmswiki.is](http://mmswiki.is) pentru cele mai recente informații.

În concluzie, vreau să spun că MMS în toate formele continuă să fie uneori un mister. Important este să

găsești ce funcționează cel mai bine pentru tine. Nu uitați să utilizați întotdeauna cele Trei Reguli de Aur ale MMS (paginile 83-84). Dacă utilizați CDS sau CDH și nu vedeți rezultatele dorite, studiați cu atenție capitolul 8 din această carte și / sau luați în considerare trecerea la MMS1.

## **Anexa B**

# **Genesis II Biserica din Sănătate și vindecare**

Biserica Genesis II pentru sănătate și vindecare a fost formată pentru a sluji omenirii. Din câte știm, Biserica Geneza II este prima biserică înființată vreodată cu acest scop. Biserica are acum (la 31 octombrie 2016) peste 1700 de miniștri sau sănătate instruiți în peste 120 de țări. Multe mii de vieți au fost salvate până în prezent, iar suferința a milioane a fost oprită sau făcută publicitate.

Cuvântul geneza din numele Bisericii semnifică începutul. Numărul II înseamnă aducerea la un (nou) al doilea început - intenția Bisericii este de a ajuta la crearea unei lumi mai bune. Cuvintele sănătate și vindecare înseamnă că Biserica lucrează pentru a aduce sănătate în lume. Cuvântul biserică indică un grup de oameni cu aceleași credințe și scop cu privire la slujirea omenirii.

Scopul Bisericii este de a ajuta oamenii să rămână sănătoși și, dacă nu sunt, atunci oferă informații pe care le pot folosi pentru ei înșiși și familiile lor, dacă doresc, pentru a se face sănătoși.

Biserica Genesis II of Health and Healing este o Biserică neconfesională și întâmpină oameni din toate categoriile sociale, religii și sisteme de credință din toate celelalte religii non-violente de pe Pământ. Biserica nu solicită ca cineva să-și schimbe credințele și practicile spirituale, dar toți membrii sunt uniți în scopul comun și în dorința de a ajuta omenirea. Singura premisă pentru a deveni



membru al Bisericii Sănătății Genesis II și

Vindecarea este susținerea următoarelor credințe:

- Făcând fapte bune
- Multă sănătate pentru întreaga omenire
- Făcând ceea ce este corect
- Libertate pentru întreaga omenire
- Luminând pe alții cu adevărul
- Ajutându-ne reciproc
- Trăind cu integritate

Oricine susține aceste credințe este binevenit să devină membru al Bisericii.

## **Anexa C**

### **Dieta acido-alkalină**

Există mulți astăzi care promovează o dietă alcalină. Conceptul de bază este că toate bolile trăiesc în medii acide și vor muri când se află într-un mediu alcalin. Astfel, ideea este că, făcându-ți corpul alcalin, poți ucide orice boală pe care o ai prezentă în corpul tău și poți duce o viață sănătoasă. Exact exact opusul este adevărat. Această teorie nu are fapte științifice în spatele ei. Cea mai importantă premisă de bază este total falsă și poate fi verificată de oricine dorește să deschidă ochii.

Cu excepția sistemului digestiv, întregul corp uman este alcalin. Majoritatea tuturor bolilor umane există în zonele alcaline ale corpului, cu excepția sistemului digestiv. Majoritatea bolilor umane, cu excepția câtorva rare din sistemul digestiv, sunt alcaline, nu acide. Consultați referințele enumerate mai jos.

Alcalinitatea și aciditatea din întregul corp uman nu sunt create de nivelul pH-ului alimentelor pe care le consumăm. Corpul folosește chimia pentru a regla nivelul pH-ului. Aciditatea descrie cantitatea de ioni hidrogen din orice soluție a corpului, iar alcalinitatea descrie cantitatea de ioni hidrogen-oxigen din orice soluție din corp. Corpul are capacitatea totală de a regla nivelul ionilor de hidrogen (aciditate), sau nivelul ionilor de hidrogen-oxigen (alcalinitate), oriunde în corp, care trebuie să se adapteze. Mâncarea pe care o mănânci sau apa pe care o bei nu are

niciun efect asupra acestor niveluri, adică până nu le exagerezi atât de mult încât să te îmbolnăvești.

Probabil că există mai mult de 100 de site-uri web care promovează dieta alcalină. Mulți dintre ei vând apă alcalină. Corpul tău trebuie să mențină pretutindeni o stare alcalină scăzută

cu excepția sistemului digestiv. Fiecare organ al corpului are un nivel alcalin diferit pentru ca organismul să funcționeze corect. Sângele dvs. este menținut la 7,41 pH pentru artere și 7,3 pH pentru vene. Este alcalin, nu acid și nu poate fi schimbat. Nicăieri în corp nu puteți schimba exact aceste niveluri alcaline sau de pH. Consumul de apă alcalină cu pH 9,5 doar face corpul să lucreze mai mult pentru a scăpa de alcalinitatea suplimentară, pe care o face în mod natural corpul. Când urina devine alcalină, acest lucru înseamnă doar că organismul descarcă alcalinitatea de care nu are nevoie. Nu înseamnă că ești sănătos.

Site-urile web despre teoria alcalinei [dietai] spun că trebuie să mâncați fructe și legume alcaline, dar aproape toate fructele și legumele sunt acide. Când puneți fructe și legume acide în stomac, stomacul crește aciditatea prin adăugarea de acid clorhidric, dar atunci când acele fructe și legume trec de la stomac la intestin, corpul eliberează o enzimă care le face pe toate alcaline. Nimic nu scapă acestei funcții a corpului. Nici un aliment alcalin sau apă alcalină nu poate schimba acest lucru.

Iată o listă publicată de FDA a mai mult de 200 de legume, fructe, carne și alte alimente - care arată că toate aceste alimente sunt acide. Nu uitați, orice sub pH 7 este acid și peste 7 pH este alcalin. Verifică:

*<http://www.fda.gov/Food/FoodbornellnessContaminant s / CausesOfllnessBadBugBook / ucm122561.htm>*

Nu pot dezbate toate diferitele tratamente împotriva cancerului care nu funcționează și nici nu pot enumera toate cele despre care se știe că funcționează. Dar menționez teoria alcalinei,

deoarece multe mii de oameni primesc date greșite de la zeci, poate chiar de la 100 de site-uri web.

Link-urile de mai jos sunt site-uri web care spun fapte pe care le puteți verifica, spunând adevărul despre teoria acid-alcalină a bolilor.

pH-ul sângelui. Pe internet, accesați Google sau orice motor de căutare și introduceți căutarea „pH-ul sângelui”. Veți primi multe răspunsuri, dar toate vor fi la fel.

**<https://sciencebasedpharmacy.wordpress.com/2009/11/13/> / [urina-dvs.-nu-este-o-fereastră-către-corpul-dvs.-ph-echilibrare-o-ipoteză eșuată](#) /**

Aceasta este o explicație completă a motivului pentru care nu vă puteți schimba pH-ul corpului. Fiecare zonă de pH este solidă și nu se echilibrează cu alte pH-uri ale corpului. Foarte bună explicație.

**<http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials/Buffer/Buffer.html>**

Acid-Base Equilibria Experiment, de Rachel Casiday și Regina Frey, Departamentul de Chimie, Washington, Universitatea St. Louis, MO 63130.

**<http://wikipedia.org/wiki/blood>**

Sânge - Wikipedia, enciclopedia liberă.

**<http://curezone.com/forums/fm.asp?i=840037>**

Sistemul digestiv și nivelul pH-ului. Acest articol este bine documentat, oferind 24 de lucrări de cercetare care arată nivelul pH-ului întregului sistem digestiv și arată că

stomacul este foarte acid și intestinul superior subțire este alcalin.

**<http://en.wikipedia.org/wiki/PH>**

pH-ul fluidelor corporale și al organelor este strâns reglat într-un proces numit homeostazie acid-bazică. Nu puteți schimba pH-ul corpului.

**<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1627797>**

Homeostazie cu pH alcalin în bacterii: noi perspective. Arată că bacteriile patogene (cauzatoare de boli) supraviețuiesc în mediul alcalin.

**[http://textbookofbacteriology.net/nutgro\\_4.html](http://textbookofbacteriology.net/nutgro_4.html)**

Vă rugăm să rețineți că neutrofilele sunt greu de găsit deoarece ortografia adaugă doar un „e” la sfârșitul cuvântului neutrofil, dar acesta este linkul către unul dintre numeroasele site-uri web care explică neutropilii ca microbi cauzatori de boli. Există 210 neutropile care cauzează boli care trăiesc la un pH alcalin.

**[http://en.wikipedia.org/wiki/Dieta\\_alcalină](http://en.wikipedia.org/wiki/Dieta_alcalină)**

Mai multă teorie acid-alcalină.

**<http://www.clinchem.org/content/41/10/1522.full.pdf>**

Compoziția lichidului interstițial. Reglarea pH-ului la 7,3 la 7,4.

**<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/09/11/alkaline-water-interview.aspx>**

Articol: Apă alcalină: dacă cadeți pentru această „modă de apă”, ați putea face unele daune majore.



## Link-uri de interes

Această carte este cea mai recentă informație oficială de la Jim Humble despre MMS din octombrie 2016.

Există site-uri web care depășesc ceea ce am prezentat în această carte. Le-am putea enumera aici, dar odată cu trecerea timpului, legăturile se vor schimba. Vor apărea site-uri noi care ar fi trebuit să fie aici. Având în vedere natura dinamică a internetului, plasarea unei liste stagnante de site-uri în această carte ar fi rapid depășită.

Așadar, am decis să vă oferim un link care va conține site-uri pe care ați putea dori să le consultați. Accesați aici, de asemenea, pentru o listă completă de linkuri pentru rețelele sociale, buletine informative, mărturii și informații suplimentare de la Jim Humble:

[http://mmswiki.is/index.php/Links\\_of\\_Interest](http://mmswiki.is/index.php/Links_of_Interest)

Vom face un efort pentru a menține această listă actualizată.

**Pentru mai multe informatii:**

<http://www.mmswiki.is>

<http://www.jimhumble.is>

**A lua legatura:**

[healthrecovery@jimhumble.is](mailto:healthrecovery@jimhumble.is)

**Librăria Jim Humble:**

<http://jhbooks.org>

**Furnizori de MMS din întreaga lume:**

<http://waterpurificationsuppliers.is>



**Oboseala cronică:** Am luat MMS vreo două săptămâni și jumătate și trebuie să spun că sunt foarte intrigat. M-am confruntat cu oboseala cronică de mulți ani și am încercat o mulțime de lucruri diferite, dar am simțit că acest lucru a început să aibă unele efecte pozitive foarte repede. Aveam nasul blocat de luni de zile și în câteva zile de la administrarea picăturilor, nasul meu era limpede și simțeam că am mai multă energie. Concentrația mea este, de asemenea, îmbunătățită semnificativ. În ansamblu, mă simt mult mai bine decât ceea ce am făcut înainte ... Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acordat timp pentru a oferi aceste „lucruri” celor care au nevoie de ceva eficient pentru a-i ajuta cu problemele lor de sănătate. —Richie



**Cancer de plamani:** Am propria mea mărturie pentru tratamentul cancerului pulmonar. Am propriul meu diagnostic medical „Inter DiaCor”. Având probleme cu transpirația, tuse uscată, oboseală, nervozitate, durere severă la mijlocul spatelui, greu de dormit și durere când stăteam pe partea stângă, am decis să fac o analiză completă a organismului. Am găsit o mare contaminare a bacteriilor și a virusilor în fiecare plămân, dar mai ales în stânga. De asemenea, s-a găsit un schimb de gaz alveolar slab și

mic. Am început să folosesc MMS Protocol 1000. Analiza controlului: Am lucrat 15 zile și rezultatul a fost cu 50% mai puțin microorganism, totuși am continuat cu MMS. Am făcut analiza după 30 de zile și rezultatul a fost 100% plămâni curate. Am continuat să beau MMS timp de 20 de zile din cauza paraziților din cortexul cerebral, creier și până la final am reușit să repar toate problemele în 52 de zile. Inițial, încărcătura virală a fost de 86,1% și, în cele din urmă, de 4,6%. Am toate imaginile unor astfel de dovezi. Am alte persoane cu can-cer de os, toxemie severă, depresie și altele asemenea. Succesul pentru acestea a venit în 30 de zile. Acest lucru este cu adevărat uimitor! —BT, Croația



**MMS mi-a ajutat Herpesul / Vaginoza / Infecția cu drojdie:** Am fost diagnosticat cu herpes în urmă cu aproximativ patru luni și probabil că asta a fost cea mai grea veste pe care am auzit-o ... Știam că tatăl meu ia MMS din alte motive de sănătate, dar nu am avut nici o idee despre ce toate lucrurile uimitoare pe care MMS le-ar putea ajuta corpul lupta împotriva. Tatăl meu mi-a cumpărat cartea și câteva sticle de MMS pentru a mă începe. Sunt fericit și mândru să spun că am făcut un test de sânge două luni mai târziu și am testat negativ. Nu l-am luat timp de două luni, am urmat protocolul, dar mi-au trebuit vreo două luni să am curajul să văd dacă ceea ce făcusem a funcționat. Sunt uimit de MMS și de problemele cu care vă ajută corpul. Când am avut de-a face cu herpes, am avut, de asemenea, vaginoză bacteriană și o infecție cu drojdie, care s-a lămurit. —Gage, Statele Unite



**Alzheimer dispărut:** Sunt familiarizat cu Alzheimer, așa că atunci când am avut simptome, mi-au fost familiare. Am observat că nu fac față social și începusem să am lacune totale în memorie (și astfel să mă retrag). Deoarece auzisem că MMS este folosit pentru a vindeca demența, am decis că nu am nimic de pierdut. Am urmat protocolul timp de o lună, crescând încet până la doza completă de

3 picături la fiecare oră timp de 8 ore și rămânând în regim, pentru întreaga perioadă (este important să rețineți că dacă doza vă face să vă simțiți rău, reduceți dozele pe zi și mențineți-o scăzută timp de 2 zile, apoi începeți să creșteți la nivelul pe care îl puteți tolera, dar nu vă opriți împreună). La sfârșitul tratamentului, am observat o schimbare remarcabilă a cunoașterii și, pe măsură ce trece timpul, starea mea continuă să se îmbunătățească. Mă simt ca o persoană nouă, sunt din nou social, fericit, și aștept cu nerăbdare fiecare zi nouă. — Sam



**Infectie a sinusurilor:** Am o stare sinusală de ani de zile. Sinusurile mele erau întotdeauna blocate, mai ales dimineața. De asemenea, am primit sânge în țesuturi destul de des când mi-am suflat nasul pentru a ameliora blocajele. Inițial luam MMS pentru că îmi era mereu foame și din cauza asta supraponderală. Aceasta a fost doar o simplă lovitură în întuneric după ce am citit povești de succes ale altor oameni. Rezultatele administrării MMS au fost că foamea mea persistentă a dispărut și, spre surprinderea mea, starea sinusală a dispărut. Am afecțiunea sinusală atât de mult, încât mi s-a părut normal. În retrospectivă, cred că ambele au fost cauzate de candida. —Chris, Statele Unite



**Etapa 4 Cancer:** În martie, un bărbat de 80 de ani a fost diagnosticat cu stadiul de cancer 4. Am asistat la consultația medicală și i s-a spus bărbatului că mai are doar două / trei luni de trăit. I-am spus omului că îl pot ajuta și am început protocolul MMS1 pentru stadiul de cancer 4. După două săptămâni luând MMS1 s-a simțit mult mai bine și a început să se îngrășe din nou. De asemenea, a început să ia MMS2 de patru ori pe zi. Astăzi, 30 aprilie, se simte mai bine ca oricând și a luat în greutate peste 10 kilograme! Ar trebui să fie mort până acum, dar în niciun caz datorită MMS1 și MMS2. —Robert



**Hepatita C:** Acum doi ani am fost diagnosticat cu Hep C. Am folosit MMS pentru puțin peste o lună și citirile mele sunt acum în regulă. Ca un beneficiu suplimentar, plămânii mei au devenit clari, mai multe afecțiuni ale pielii și virusuri suplimentare au dispărut, dinții căprui au devenit albi și părul alb a devenit brun. Dumnezeu să te binecuvânteze, Jim. —JM, Statele Unite





**Artrita la încheietura mâinii:** Știu despre MMS de ani de zile, dar nu despre protocolul pentru cancer. Am început să folosesc protocolul cancerului pentru o tumoare de sân malignă în vârstă de 21 de ani, fără să știu despre protocolul pentru artrită. Spre uimirea mea, artrita din încheietura mâinii și mâinii stângi a dispărut. Am intrat pe site și iată că alții îl foloseau cu succes și pentru artrită. Unul dintre punctele pe care aș dori să le fac aici este că nu am fost influențat în niciun fel de rapoartele altor persoane. Este posibil ca durerea artritei să nu pună viața în pericol, dar cu siguranță îndepărtează plăcerea vieții. Mulțumesc Jim Humble. —Judith E., Statele Unite



**Boala Crohn:** Am Crohn de patru ani. Am luat MMS timp de o săptămână, iar simptomele mele s-au diminuat. Am renunțat să-mi iau medicamentele pentru a vedea ce se va întâmpla. De atunci mă simt bine. — RW, Statele Unite



**Candida sistemică:** De ani de zile am avut probleme cu senzația de rău după un exercițiu intens. S-a înrăutățit progresiv în timp. Am bănuț Candida sistemică, dar nu am fost diagnosticată niciodată. Am încercat Protocolul 1000 și am adăugat DMSO. Trei săptămâni mai târziu am fost gata să testez eficacitatea acestui tratament. M-am antrenat extrem de greu în ultimele două săptămâni, cu pauze adecvate și mă simt grozav! Nu am avut nicio indicație despre problemele mele anterioare. Apropo, am 72 de ani, dar acum simt că am 20 de ani. MMS chiar a funcționat pentru mine. —Richard

# NOTE



## Despre autor

Jim Humble și-a început activitatea în domeniul sănătății la începutul anilor 20, când a devenit managerul unui magazin de produse naturiste din Los Angeles, California. El a scris o întrebare cu 200 de întrebări „Test de evaluare nutrițională”, care a determinat vitaminele, mineralele, proteinele și grăsimile în care corpul unei persoane ar putea fi deficitar. timpul. De-a lungul anilor, Jim a avut-o



și-a menținut interesul pentru sănătatea alternativă și a lucrat cu numeroase modalități de vindecare, inclusiv vindecarea propriului gât rupt în timp record folosind magneți. El a scris multe cărți de succes, iar evoluțiile sale actuale sunt prezentate în acest ghid de instrucțiuni.

Jim și-a început cariera în industria aerospațială, unde a devenit rapid inginer de cercetare. A lucrat la prima rachetă intercontinentală, a scris manuale de instrucțiuni pentru primele computere cu tuburi de vid, a lucrat la electronice secrete de control radio și la alte zeci de proiecte electronice „de ultimă generație” la Hughes Aircraft Company, Northrop Aircraft, General Motors Research Laboratories , si altii.

După 20 de ani în industria aerospațială, Jim a intrat în exploatarea aurului, unde a dezvoltat metode de recuperare a aurului care înlocuiesc utilizarea mercurului pentru a ajuta la depășirea problemelor de sănătate ale micilor mineri. A scris 5 cărți pe tema recuperării aurului din minereurile sale. În 1996, în timp ce cerceta aur în America de Sud, a descoperit ceea ce a devenit cunoscut sub numele de MMS, o formulă simplă de sănătate care eradică malaria. În anii care au urmat, a lucrat pentru a îmbunătăți în continuare formula. În

cele din urmă, un grup misionar l-a invitat în Africa, unde a ajutat cu succes peste 5.000 de cazuri de malarie și victimele altor boli și-au recuperat sănătatea. De atunci, sute de mii de oameni au folosit MMS pentru a-și recupera sănătatea dintr-o gamă largă de boli.

**Pentru mai multe informatii:**

*[www.mmswiki.is](http://www.mmswiki.is)*

*[www.jimhumble.is](http://www.jimhumble.is)*

**A lua legatura:** *[healthrecovery@jimhumble.is](mailto:healthrecovery@jimhumble.is)*



I have had multiple health problems and they are all finally clearing up due to MMS. I had a 27-year-old leg ulcer which was several inches long and is now gone. It took 1 month to clear up. My sinuses are finally clear so I no longer cough until I vomit. My arthritis is MUCH better. Fungus on my feet is gone. My gums no longer hurt. My vision is actually improving so that I am able to drive again. This product is incredible. Even the neuropathy in my feet is less painful. I had been taking up to 22 pills, 3 times a day, for all my health issues. Now I just take supplements. God bless you Jim Humble! —Joshua J.



MMS has been the most effective treatment for Lyme disease. Almost 6 years of agonizing symptoms after numerous tick bites, thousands of dollars on doctors and natural remedies and now this little bottle of MMS which cost me about 12 and lasted 3 months, has given huge relief of Lyme disease symptoms. —Dianne E., Australia



Cured 3 dogs (all terminal), first had lymphoma, was hours away from death, 1 drop of MMS revived her (a miracle). Second dog had lung cancer, cured her. Third dog had liver failure, cured her. Also recommended MMS to a friend with fibromyalgia, he was disabled; no longer...he is now better and healthy. Thank God for MMS. —R.B.



Have been taking MMS1 & 2 to treat my stage 3 ovarian cancer. It's been wonderful. Recently my blood tests revealed that my tumor markers were now in the normal range so I went onto a maintenance dose. —Vanessa



The benefits of MMS are amazing. I was told that I had prostate cancer...after just 6 weeks of MMS my P.S.A. reading had gone down and my doctor was amazed at the improvement. —K.C.W., Spain



I have been using MMS about 7 years now. I am nearly 77 years old and in pretty good health. Thanks to MMS, I have not been sick for more than 1 day in the last 7 years as at the first sign of sickness of any kind I take MMS. I think Jim Humble deserves a Humanitarian Award for his selfless work with MMS. —Len B., Canada

**For more testimonials:**

[www.mmstestimonials.is](http://www.mmstestimonials.is)

**For more information:**

[www.mmswiki.is](http://www.mmswiki.is)  
[www.jimhumble.is](http://www.jimhumble.is)

**Contact:**

[healthrecovery@jimhumble.is](mailto:healthrecovery@jimhumble.is)

ISBN 978-0-9908945-2-0

\$22.50  
5 2 2 5 0 >



9 780990 894520